

2022 中级主管护师专业知识题库

1.治疗休克首要和最基本的措施是 [单选题] *

- A.积极处理原发病
- B.纠正酸碱平衡失调
- C.应用血管活性药物
- D.纠正微循环障碍
- E.尽快恢复有效血容量(正确答案)

答案解析：扩容是治疗休克首要而基本的措施。

2.局麻药加肾上腺素的主要目的是 [单选题] *

- A.延缓药物吸收，避免或减轻中毒(正确答案)
- B.延缓药物吸收，缩短作用时间
- C.使局部血管收缩，减少出血
- D.预防术中血压过低
- E.预防术中心率减慢

答案解析：肾上腺素可以延缓药物吸收速度，从而预防药物中毒。

3.下列全肠外营养液中最应由大静脉输入的是 [单选题] *

- A.10%脂肪乳剂
- B.林格液
- C.20%葡萄糖液(正确答案)
- D.5%葡萄糖液

E.5%氨基酸溶液

答案解析：高渗液体应该由中心静脉输入。

4.破伤风治疗的中心环节是 [单选题] *

A.彻底清创

B.使用抗生素

C.控制痉挛(正确答案)

D.纠正水、电解质紊乱

E.使用 TAT

5.烧伤局部有水疱，基底潮红并有剧痛，其烧伤程度为 [单选题] *

A.一度

B.浅二度(正确答案)

C.深二度

D.三度

E.一度至二度

答案解析：浅二度和深二度烧伤都有水疱，但浅二度烧伤的创面颜色鲜红，深二度创面苍白。

6.下列肿瘤中对放疗高度敏感的是 [单选题] *

A.肺癌

B.淋巴造血系统和某些胚胎组织的恶性肿瘤(正确答案)

C.软组织恶性肿瘤

D.胃肠道恶性肿瘤

E.骨肉瘤

7.关于胃肠减压的目的叙述不正确的是 [单选题] *

- A.改善肠壁的血液循环
- B.减少缝线张力，减轻疼痛
- C.维持正常体液平衡(正确答案)
- D.减轻肠梗阻症状
- E.减轻腹胀

答案解析：胃肠减压会导致体液丢失。

8.左半结肠癌的主要表现应除外 [单选题] *

- A.腹泻、便秘
- B.腹胀
- C.腹痛
- D.肠梗阻
- E.腹部肿块(正确答案)

答案解析：腹部肿块是右半结肠癌的表现。

9.关于左侧小脑幕切迹疝的临床表现描述正确的是 [单选题] *

- A.昏迷、右侧瞳孔散大右侧肢体瘫痪
- B.昏迷、左侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪
- C.昏迷、左侧瞳孔散大右侧肢体瘫痪(正确答案)
- D.昏迷、双侧瞳孔散大，双侧肢体瘫痪
- E.昏迷、双侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪

答案解析：小脑幕切迹疝的表现是同侧瞳孔变化，对侧肢体瘫痪

10. 颅底骨折类型为 [单选题] *

A. 闭合性骨折

B. 开放性骨折(正确答案)

C. 完全性骨折

D. 压缩性骨折

E. 粉碎性骨折

答案解析：由于颅底骨骼与硬脑膜连接紧密，颅底骨折常伴随硬脑膜撕裂，引起脑脊液漏，为开放性骨折。

11. 牵引复位的适应证是 [单选题] *

A. 跟骨压缩骨折

B. 桡骨裂缝骨折

C. 胫骨青枝骨折

D. 股骨干斜形骨折(正确答案)

E. 骨盆骨折

答案解析：B、C 属于稳定性骨折，不需要牵引复位；跟骨压缩骨折一般石膏固定；骨盆骨折采用外固定架固定。

12. 颈椎骨折脱位合并颈髓横贯伤的早期会出现 [单选题] *

A. 心动过速

B. 呼吸运动减弱(正确答案)

C. 胸部以下感觉障碍

D. 大、小便失禁

E. 上肢肌肉无力

答案解析：颈髓内有呼吸中枢。

13.急性化脓性骨髓炎早期手术旨在 [单选题] *

- A.防止疾病转为慢性
- B.减轻疼痛
- C.预防败血症
- D.预防病理性骨折
- E.减压和引流(正确答案)

答案解析：早期治疗的目的是引流脓液。

14.成年人全关节结核并有窦道形成，最佳的治疗措施是 [单选题] *

- A.全身抗结核治疗
- B.石膏固定，开窗换药
- C.加强支持，开窗换药
- D.病灶清除，关节融合(正确答案)
- E.病灶清除，关节滑膜切除

15.椎动脉型颈椎病的典型症状是 [单选题] *

- A.上肢麻木、活动不灵
- B.颈部僵硬
- C.心律失常
- D.眩晕(正确答案)
- E.低热

16.骨巨细胞瘤最好发于 [单选题] *

- A.股骨上端

B.胫骨上端(正确答案)

C.肱骨近端

D.腓骨上端

E.尺骨远端

答案解析：骨巨细胞瘤好发于股骨下端和胫骨上端。

17.预防气性坏疽的关键是 [单选题] *

A.尽快彻底清创(正确答案)

B.注射多价气性坏疽抗毒素

C.使用大剂量青霉素

D.全身支持疗法

E.高压氧治疗

18.急性乳腺炎的基本预防措施是 [单选题] *

A.经常按摩乳房

B.小量多次哺乳

C.排空剩余乳汁(正确答案)

D.乳头出现破损应及时回乳

E.每次哺乳后清洁乳房

19.用于判断小儿营养状况最重要的指标是 [单选题] *

A.身高

B.体重(正确答案)

C.头围

D.腹围

E.皮下脂肪厚度

答案解析：评价小儿营养状况的指标有多种，但最重要的指标是体重。

20.呼吸系统疾病最常见的症状是 [单选题] *

A.咳嗽(正确答案)

B.咳痰

C.痰中带血

D.呼吸困难

E.发热

答案解析：咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一。

21.女性，检查为念珠菌阴道炎。护士指导其选用阴道清洗液为 [单选题] *

A.呋喃西林

B.1%乳酸

C.氯己定

D.1:5000 高锰酸钾

E.2%~4%碳酸氢钠(正确答案)

答案解析：念珠菌在酸性环境适于其生长，因此阴道灌洗应用2%~4%碳酸氢钠灌洗或坐浴，消灭其生长环境。

22.以下最迟发育的系统是 [单选题] *

A.神经系统

B.生殖系统(正确答案)

C.心血管系统

D.淋巴系统

E.造血系统

答案解析：生殖系统的发育是先慢而后快，通常于青春期时发育并逐渐成熟。

23.肺气肿患者，双肺叩诊音呈 [单选题] *

A.鼓音

B.实音

C.浊音

D.过清音(正确答案)

E.清音

答案解析：肺气肿叩诊为过清音。

24.初产妇，28岁，宫口已开全2.5小时后，胎儿还未娩出。该产妇发生了 [单选题]

*

A.第二产程延长(正确答案)

B.潜伏期延长

C.胎盘滞留

D.胎盘嵌顿

E.活跃期停滞

答案解析：第二产程初产妇超过2小时，经产妇超过1小时尚未分娩，为第二产程延长。

25.我国将新生儿期定义为 [单选题] *

A.自出生脐带结扎至生后28天内(正确答案)

B.从受孕至生后脐带结扎

C.自出生脐带结扎至生后7天

D.自出生脐带结扎至产后 14 天

E.自受孕至产后满 1 个月

答案解析：从出生脐带结扎至出生后 28 天内为新生儿期。

26.肺性脑病病人出现昏迷，一侧瞳孔扩大，首选的急救措施是 [单选题] *

A.20%甘露醇静脉推注(正确答案)

B.5%碳酸氢钠静脉推注

C.加大抗生素用量

D.静脉应用呋塞米

E.吸氧

答案解析：肺性脑病病人出现昏迷、一侧瞳孔散大，提示出现脑水肿，首要措施是静脉快速输注 20%甘露醇以降低颅内压。

27.宫颈癌早期临床典型症状是 [单选题] *

A.不规则阴道出血

B.接触性出血(正确答案)

C.白带有异味

D.阴道排液

E.恶病质

答案解析：阴道出血的早期表现为接触性出血，性交后或妇科检查后出血，怀疑宫颈癌。

28.青春期生长发育特点不包括 [单选题] *

A.生殖系统迅速发育

B.进入第二个生长发育高峰

- C.男女第二性征出现
- D.神经内分泌调节功能稳定(正确答案)
- E.女孩出现月经, 男孩有排精

答案解析：该期以成熟的认知能力, 自我认同感的建立为显著特征, 这一阶段环境影响较大, 常引起心理、行为、精神方面的不稳定。

29.以下属于中毒性肺炎的典型表现是 [单选题] *

- A.高热持续不退
- B.合并胃肠道症状
- C.出现神经系统症状
- D.出现休克(正确答案)
- E.血象异常

30.双胎妊娠的并发症不包括 [单选题] *

- A.容易并发妊娠高血压综合征
- B.容易发生胎位异常
- C.容易发生产后出血
- D.容易合并胎膜早破
- E.容易发生过期妊娠(正确答案)

答案解析：过期妊娠相关因素:内源性前列腺素和雌二醇分泌不足而孕酮水平增高, 使得子宫不收缩, 延迟分娩发动;头盆不称时胎先露部对宫颈内口和子宫下段的刺激不强;无脑儿畸胎又没有发生羊水过多时;遗传因素。

31.乙肝疫苗第 1 次接种时间是 [单选题] *

- A.出生后 1~2 天(正确答案)
- B.出生 1 个月以上

C.出生 4 个月以上

D.出生 8 个月以上

E.1 岁以上

答案解析：乙肝疫苗接种第 1 次为出生后 24 小时内，第 2 次为第 1 个月时，第 3 次为第 6 个月时。

32.肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有 [单选题] *

A.肺部遗留纤维化

B.形成空洞，迁延不愈

C.肺组织完全恢复正常(正确答案)

D.造成胸膜粘连、增厚

E.以上都不是

答案解析：因肺炎球菌不产生毒素，故不引起原发性组织坏死和形成空洞，炎症消散后肺组织结构多无破坏，不留瘢痕。

33.对于臀位阴道分娩不正确的说法是 [单选题] *

A.临产发动后卧床保持体力

B.严密监测胎心

C.勿灌肠

D.少做肛门检查

E.阴道口见胎足，为子宫颈口开全(正确答案)

答案解析：阴道口见胎足，不能作为子宫颈口开全的标志。

34.正常 6 月龄小儿异常表现为 [单选题] *

A.前囟未闭

- B.不能保持坐位
- C.乳牙萌出
- D.俯卧时不能抬胸(正确答案)
- E.两手不会传递玩具

答案解析：小儿6个月如在俯卧时仍不能抬胸提示发育异常。

35.正式临产的标志是 [单选题] *

- A.见红
- B.胎膜早破
- C.下腹隐痛
- D.有规律的子宫收缩(正确答案)
- E.先露入盆

答案解析：临产诊断是有规律且逐渐增强的子宫收缩，同时伴有进行性子宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

36.新生儿保健的关键时期是 [单选题] *

- A.出生后24小时
- B.出生后3天内
- C.出生后7天内(正确答案)
- D.出生后10天内
- E.出生后14天内

答案解析：生后1周是新生儿发病率和死亡率最高时期，故应将此期作为保健重点。

37.新生儿 Apgar 评分指标不包括 [单选题] *

- A.心率
- B.体温(正确答案)
- C.呼吸
- D.皮肤颜色
- E.喉反射

答案解析： Apgar 评分包括心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。

38.佝偻病激期临床典型表现是 [单选题] *

- A.易激惹
- B.枕秃
- C.骨骼改变(正确答案)
- D.肌肉松弛、肌张力低下
- E.多动

答案解析： 佝偻病分初期、激期、恢复期和后遗症四期，其中激期最突出表现是骨骼改变，初期最突出表现是神经精神症状。

39.产妇进入产房后，护士不正确的处理是 [单选题] *

- A.再次清洁、消毒外阴
- B.铺无菌巾
- C.给予产妇精神支持
- D.当胎头着冠时，指导病人开始向下屏气(正确答案)
- E.严密监测胎心

答案解析： 宫缩时产妇会不由自主地向下屏气用力，主动增加腹压。

40.区分轻型与重型腹泻的依据是 [单选题] *

- A.呕吐、腹泻的次数
- B.有无水、电解质紊乱(正确答案)
- C.大便镜检可见脂肪球
- D.酸中毒程度
- E.患者精神状态

答案解析：重型与轻型腹泻的区别不仅参考腹泻次数及量，最主要是有无水电和酸碱平衡紊乱。

41.急性呼吸性酸中毒的主要治疗措施是 [单选题] *

- A.应用 5%碳酸氢钠溶液
- B.增加通气量(正确答案)
- C.积极补充液体
- D.限制摄入高钾食物
- E.利尿增加酸从肾排出

答案解析：呼吸性酸中毒的主要治疗措施是改善肺泡通气量，一般不宜补碱。

42.孕妇 24 岁，妊娠 6 周，早孕表现不包括 [单选题] *

- A.停经
- B.尿频
- C.晨起呕吐
- D.腹泻(正确答案)
- E.乳头刺痛

答案解析：停经是妊娠最早、最重要的症状。在妊娠 6 周左右出现恶心、晨起呕吐等早孕反应，12 周左右消失。尿频是因增大的子宫压迫膀胱而引起；在雌、孕激素的影响下，乳房逐渐增大，孕妇自觉乳房轻度胀痛及乳头刺痛。

43.现将 2 份生理盐水配上 1 份 1.4%碳酸氢钠液体，护士计算其张力为 [单选题] *

- A.等张(正确答案)
- B.2/3 张
- C.1/2 张
- D.1/4 张
- E.2/5 张

答案解析：2 份生理盐水:1 份 1.4%碳酸氢钠液体的张力为 $(2+1) / (2+1)$ ，即等张。

44.支气管肺炎常见的并发症应除外 [单选题] *

- A.脓胸
- B.肺脓肿
- C.肾炎(正确答案)
- D.肺大疱
- E.心力衰竭

45.三度房室传导阻滞伴阿斯综合征的首选治疗是 [单选题] *

- A.阿托品
- B.异丙肾上腺素
- C.安装人工心脏起搏器(正确答案)
- D.去甲肾上腺素
- E.呼吸兴奋药

答案解析：二度 II 型房室传导阻滞和完全性房室传导阻滞病人，心室率缓慢，伴有血流动力学障碍，出现阿斯综合征时，应立即按心搏骤停处理。反复发作者应及时安装人工心脏起搏器。

46.法洛四联症患儿，男，2岁，今晨突然晕厥、抽搐最可能的原因是 [单选题] *

- A.合并脑血栓
- B.合并脑肿瘤
- C.合并脑膜炎
- D.高热
- E.肺动脉漏斗部肌肉痉挛(正确答案)

答案解析：法洛四联症脑缺氧发作机制。

47.病态窦房结综合征病人最理想的治疗方法是 [单选题] *

- A.静脉注射肾上腺素
- B.同步电复律
- C.静脉滴注异丙肾上腺素
- D.安装永久心脏起搏器(正确答案)
- E.静脉滴注洋地黄类药

答案解析：病态窦房结综合征是由于窦房结或其周围组织的器质性病变导致功能障碍，从而产生多种心律失常的综合表现。主要特征为心动过缓，伴有窦性停搏、窦房阻滞、房室传导阻滞等。其治疗原则:无症状者应密切临床观察，有症状者应选择起搏治疗。

48.患儿，女，3天，生后持续性发绀，最可能的情况 [单选题] *

- A.肺透明膜病变
- B.室间隔缺损
- C.法洛四联症(正确答案)
- D.动脉导管未闭
- E.主动脉狭窄

答案解析：因心脏结构的异常，静脉血流入右心后不能全部流入肺循环达到氧合作用，有一部分或大部分自右心或肺动脉流入左心或主动脉，直接进入体循环，出现持续性发绀。常见有法洛四联症、大动脉错位等。

49.缓解急性心肌梗死胸部疼痛宜用 [单选题] *

- A.吗啡(正确答案)
- B.休息和吸氧
- C.索米痛片（去痛片）
- D.硝酸甘油
- E.非甾体类抗炎药

答案解析：解除疼痛用哌替啶 50~100mg 肌内注射或吗啡 5~10mg 皮下注射，或罂粟碱 30~90mg 肌内注射。

50.有关小儿急性肾小球肾炎的描述正确的是 [单选题] *

- A.秋冬季多发，2岁以下常见
- B.常有链球菌感染前驱史(正确答案)
- C.最先出现的症状为水肿，凹陷性
- D.镜下血尿持续较短
- E.预后较差

答案解析：急性肾小球肾炎是小儿泌尿系统最多见的疾病。秋、冬季呼吸道感染是急性肾炎主要的前驱病，其中多数发生于急性溶血性链球菌感染后。发病年龄以 5-10 岁为多见，<2 岁者少见。

51.预防缺铁性贫血，早产儿补充铁剂的时间是 [单选题] *

- A.1 月龄
- B.3 月龄

C.6月龄

D.2月龄(正确答案)

E.8月龄

答案解析：早产儿补充铁剂从2个月开始，足月儿从4个月开始，及时添加含铁丰富的辅食。

52.急性下壁心肌梗死易发生的心律失常为 [单选题] *

A.室上性心动过速

B.心室颤动

C.房性期前收缩

D.病窦综合征(正确答案)

E.心房纤颤

答案解析：下壁心肌梗死常易发生慢性心律失常，如房室传导阻滞等，并伴有血压下降。

53.患儿，男，7岁，诊断为“急性淋巴细胞白血病”。以下症状提示有中枢神经系统受累的是 [单选题] *

A.关节疼痛明显

B.发热

C.头痛呕吐、嗜睡(正确答案)

D.皮肤出血点

E.肝、脾大及淋巴结肿大

答案解析：发生脑膜白血病时可出现头痛、呕吐、嗜睡、惊厥等。

54.在新生儿期，先天性甲状腺功能减退症患儿最早出现的症状是 [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978112051042006035>