

2022 年江苏省成考（专升本）大学医学综合考试原题

一、单选题

1、输血应遵循的原则是()

- (A)受血者红细胞不被供血者血清凝集
- (B)供血者和受血者的凝集素含量应相等
- (C)受血者红细胞不发生叠连
- (D)供血者红细胞不被受血者血清凝集

2、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

- (A)房性期前收缩
- (B)室上性心动过速
- (C)心房颤动
- (D)心室颤动
- (E)室性期前收缩

3、某患者的检验报告如下，导致其发生猝死最可能的原因是（）

- (A)血磷 0.8mmol/L
- (B)血钾 7.0mmol/L
- (C)血钠 158mmol/L
- (D)血氨 87 μ mol/L
- (E)血钙 19mmol/L

4、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

- (A)双眼视野鼻侧半偏盲
- (B)患侧视野鼻侧半偏盲

(C) 双眼视野对侧半同向性偏盲

(D) 双眼视野颞侧半偏盲

(E) 患侧眼全盲

5、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

(A) 交感神经兴奋

(B) 迷走神经兴奋

(C) 血管紧张素 II 分泌增多

(D) 心肌代谢增强

(E) 血管升压素分泌增多

6、清创术的目的是【】

(A) 冲洗伤腔

(B) 清除伤口内异物

(C) 修剪伤口边缘

(D) 清除血肿

(E) 将污染伤口变为清洁伤口

7、无尿的定义是（）

(A) 24 小时尿量少于 100mL

(B) 12 小时尿量少于 200mL

(C) 24 小时尿量少于 500mL

(D) 每小时尿量少于 50mL

(E) 每小时尿量少于 17mL

8、急性肾衰竭少尿期或无尿期，需紧急处理的电解质紊乱是()

(A) 高钾血症

(B)高钠血症

(C)低氯血症

(D)低镁血症

9、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

10、横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（）

(A)嗜睡

(B)昏迷

(C)去大脑僵直

(D)柔软性麻痹

(E)意向性震颤

11、舌的味觉障碍可能受损的神经是【】

(A)面神经

(B)三叉神经

(C)迷走神经

(D)舌下神经

(E)副神经

12、不属于丹毒临床表现的是（）

- (A)多见于下肢
- (B)畏寒、发热
- (C)皮肤和淋巴结多见化脓破溃
- (D)头痛、全身不适
- (E)局部烧灼样疼痛

13、男，70岁。近1周间断排黑便，近期体重下降4kg。为明确诊断应首选的检查方法是

【】

- (A)腹部B超
 - (B)胃镜+活组织病理
 - (C)消化道钡剂造影
 - (D)粪便常规
 - (E)腹部CT
- 14、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）
- (A)结核性腹膜炎
 - (B)化脓性腹膜炎
 - (C)肝硬化腹水
 - (D)恶性腹水
 - (E)自发性细菌性腹膜炎
- 15、手术中识别输卵管的标志是（）
- (A)输卵管漏斗
 - (B)输卵管峡
 - (C)输卵管伞

(D) 输卵管壶腹

(E) 输卵管腹腔口

16、光期引起视杆细胞膜发生的变化是 ()

(A) 超极化

(B) 极化

(C) 反极化

(D) 去极化

(E) 复极化

17、下列属于腺垂体激素的是 【】

(A) 生长激素

(B) 甲状腺素

(C) 缩宫素

(D) 血管升压素

(E) 生长抑素

18、女，54岁。急性胰腺炎行胆囊造瘘、胰腺引流术后，仍禁食、胃肠减压、输液及抗感染治疗，并吸入高浓度氧。动脉血气分析为 pH7.46，PaO₂55mmHg，PaCO₂32mmHg。

胸片示两肺有较广泛的点、片状阴影，心电图示窦性心动过速。最可能的诊断是 【】

(A) 急性心力衰竭

(B) 慢性阻塞性肺病

(C) 术后肺不张

(D) 急性呼吸窘迫综合征

(E) 肺部感染

19、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是 ()

- (A) 双眼视野鼻侧半偏盲
- (B) 患侧视野鼻侧半偏盲
- (C) 双眼视野对侧半同向性偏盲
- (D) 双眼视野颞侧半偏盲
- (E) 患侧眼全盲

20、出现血容量不足的症状时，提示在短时期内体液丧失至少达体重的百分数是【】

- (A) 5%
- (B) 3%
- (C) 10%
- (D) 15%
- (E) 20%

21、刺激缩胆囊素释放的最强因素是【】

- (A) 脂肪酸
- (B) 促胃液素
- (C) 乙酰胆碱
- (D) 葡萄糖
- (E) 蛋白质分解产物

22、有关输尿管的正确描述是（）

- (A) 属于腹膜间位器官
- (B) 属于腹膜内位器官
- (C) 开口于膀胱尖
- (D) 第二狭窄位于跨过髂血管处
- (E) 可分为腹段和盆段两部分

23、注射破伤风抗毒素(TAT)的目的是【】

- (A) 中和游离毒素
- (B) 对易感人群进行预防接种
- (C) 杀灭伤口中繁殖的破伤风梭菌
- (D) 简化伤口处理程序
- (E) 中和与神经细胞结合的毒素

24、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是（）

- (A)右心衰竭
- (B)下腔静脉阻塞
- (C)门脉高压症
- (D)左侧胸腔积液
- (E)肝功能衰竭

25、动作电位跳跃式传导的部位是（）

- (A)有髓纤维
- (B)无髓纤维
- (C)终板膜
- (D)缝隙连接
- (E)肌节

26、Brudzinski 征阳性的表现是（）

- (A)趾背伸四趾屈曲
- (B)颈部抵抗增强
- (C)股四头肌收缩
- (D)伸膝受阻伴疼痛

(E)髋关节及膝关节屈曲

27、女，70岁。上腹痛伴黄疸。触诊胆囊时，患者深吸气因疼痛而终止的征象提示()

(A)腹膜刺激征阳性

(B)Murphy 征阳性

(C)肝颈静脉回流征阳性

(D)Courvoisier 征阳性

28、可做向前和向后运动的关节是（）

(A)踝关节

(B)肘关节

(C)桡腕关节

(D)肩关节

(E)颞下颌关节

29、静脉补钾速度一般每小时不宜超过()

(A)70mmol

(B)60mmol

(C)50mmol

(D)20mmol

30、女，80岁。头晕、心悸就诊。心电图如下。最可能的诊断是【】(A)窦性心动过缓

(B)二度I型房室传导阻滞

(C)三度房室传导阻滞

(D)二度II型房室传导阻滞

(E)窦房传导阻滞

31、不属于肝门静脉属支的是（）

- (A)肝静脉
- (B)肠系膜上静脉
- (C)胆囊静脉
- (D)脾静脉
- (E)附脐静脉

32、胆汁淤积性黄疸典型的临床表现是()

- (A)尿呈酱油色
- (B)腰背疼痛
- (C)贫血、脾大
- (D)陶土样粪便

33、不属于肝门静脉属支的是（）

- (A)肝静脉
- (B)肠系膜上静脉
- (C)胆囊静脉
- (D)脾静脉
- (E)附脐静脉

34、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

- (A)患侧闻及胸膜摩擦音
- (B)气管向健侧移位
- (C)患侧语音震颤减弱
- (D)患侧胸廓扩张度减弱
- (E)患侧肋间隙增宽

35、激素经血液循环被运行后作用于靶细胞的作用方式是（）

- (A) 远距分泌
- (B) 内在分泌
- (C) 自分泌
- (D) 旁分泌
- (E) 神经分泌

36、舌前 2/3 味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是 ()

- (A) 动眼神经
- (B) 面神经
- (C) 三叉神经
- (D) 上颌神经
- (E) 舌下神经

37、有关测量血压的叙述，正确的选项是 【】

- (A) 听诊器胸件置于袖袋下
- (B) 血压计置于肘关节水平
- (C) 袖袋充气至日常血压水平放气
- (D) 取两次测得血压的高值
- (E) 检查前需休息 5 分钟以上

38、某患者因上腹痛就诊。查体：按压右肋弓与腹直肌外缘交界处，患者深呼气因疼痛而受限。最可能的诊断是 【】

- (A) 十二指肠溃疡
- (B) 下尿路感染
- (C) 急性胆囊炎

(D) 急性胰腺炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978125126051006050>