







SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

外科护理考前练习题含答案

1、男, 60 岁, 寒战发烧, 自感头痛, 2 天后右小腿内侧皮肤发红, 呈鲜红色, 中央淡, 周围深, 与正常皮肤分界清楚, 肿胀不明显, 局部有烧灼样痛, 应诊断为 ()

- A、 疔
- B、 丹毒
- C、 急性蜂窝织炎
- D、 急性淋巴管炎
- E、 痈

答案: B

2、反映休克患者组织灌流量最简单而有效的指标是 ()

- A、 血压
- B、 脉搏
- C、 尿量
- D、 神志
- E、 肢端温度

答案: C

3、胸腔引流采用的引流物是 ()

- A、 胶片引流
- B、 胶管引流
- C、 卷烟引流
- D、 双管引流
- E、 凡士林纱布引流

答案: B

4、下列哪种不溶液属于平衡液 ()

- A、 0.9% 氯化钠溶液
- B、 5% 葡萄糖盐水
- C、 5% 葡萄糖液
- D、 乳酸钠林格氏溶液
- E、 复方氯化钠溶液

答案: C

5、一女性成年患者, 拟行阑尾切除术, 术前常规禁饮时间不得少于 ()

- A、 4~6 小时
- B、 7~9 小时
- C、 10~12 小时
- D、 12~14 小时

E、 14~16 小时

答案: A

6、 在伤口的近侧出现“红线”, 硬而有压痛, 通常是()

- A、 网状淋巴管炎
- B、 浅部静脉炎
- C、 浅部淋巴管炎
- D、 深部淋巴管炎
- E、 急性蜂窝组织炎

答案: C

7、 严重高渗性脱水病人首选的补液液体是()

- A、 生理盐水
- B、 平衡盐溶液
- C、 5%葡萄糖溶液
- D、 5%NaHCO₃ 溶液
- E、 5%葡萄糖盐水

答案: C

8、 面部呈蜂窝状的软组织感染是()

- A、 疔
- B、 痈
- C、 蜂窝织炎
- D、 丹毒
- E、 急性淋巴炎

答案: B

9、 发生破伤风芽胞梭菌感染是由于:()

- A、 吃了破伤风芽胞梭菌污染食物
- B、 劳动时皮肤污染了污泥
- C、 破伤风病人污染的空气传播
- D、 受伤后破伤风杆菌侵入到伤口内
- E、 经昆虫媒介的传染

答案: D

10、 为了增加血浆渗透压和循环血量, 应选用的溶液是()

- A、 5%葡萄糖溶液
- B、 0.9%氯化钠溶液
- C、 低分子右旋糖酐
- D、 10%葡萄糖液

E、5%碳酸氢钠

答案：C

11、手部化脓性感染的主要致病菌是()

- A、大肠杆菌
- B、绿脓杆菌
- C、白色念珠菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、破伤风杆菌

答案：D

12、男,50岁,阑尾切除手术后5天,局部伤口发炎,触之有波动,穿刺抽到脓液,其最佳处理是()

- A、伤口用酒精纱布湿敷
- B、局部理疗
- C、全身应用抗生素
- D、拆去缝线,伤口敞开引流
- E、以上都不是

答案：D

13、为炭疽杆菌感染病人换药后,物品不宜用燃烧法灭菌的是()

- A、弯盘
- B、换药碗
- C、镊子
- D、止血钳
- E、剪刀

答案：E

14、正常人每日不自觉失水量(包括皮肤蒸发和呼吸)为()

- A、200毫升
- B、400毫升
- C、800毫升
- D、1000毫升
- E、1500毫升

答案：C

15、外科感染最严重的症状是()

- A、局部红、肿、热、痛、功能障碍
- B、周围淋巴细胞肿大
- C、脉快、乏力、食欲不振

- D、 感染性休克
- E、 毒血症

答案: D

16、硬膜外麻醉最严重的并发症是: ()

- A、 血压下降
- B、 血管扩张
- C、 尿潴留
- D、 呼吸变慢
- E、 全脊髓麻醉

答案: E

17、中度高渗性脱水失水量约为体重的 ()

- A、 1%—2%
- B、 2%~4%
- C、 4%~6%
- D、 6%~8%
- E、 8%~10%

答案: C

18、为休克病人补充血容量应首选 ()

- A、 全血
- B、 血浆
- C、 低分子右旋糖酐
- D、 平衡盐溶液
- E、 5%葡萄糖溶液

答案: D

19、治疗代谢性酸中毒的最根本方法是 ()

- A、 输入 5%碳酸氢钠
- B、 输入 11.2%乳酸钠
- C、 输入三羟甲基氨基甲烷 THAM
- D、 吸氧
- E、 去除产生酸中毒病因

答案: A

20、普鲁卡因局麻时,一般可在 100 毫升麻药中加 0.1%肾上腺素 ()

- A、 1~2 滴
- B、 3~5 滴
- C、 1 毫升

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978135140014006070>