

北京住院医师儿内科 I 阶段《儿童保健考点巩固》模拟练习卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：营养不良病儿皮下脂肪逐渐减少或消失，首先见于（ ）。A. 面颊部
B. 躯干
C. 腹部
D. 臀部
E. 四肢
- 2、单项选择题：初次接种麻疹减毒活疫苗的时间为（ ）A. 4 个月以上易感儿
B. 5 个月以上易感儿
C. 6 个月以上易感儿
D. 7 个月以上易感儿
E. 8 个月以上易感儿
- 3、单项选择题：佝偻病的最主要病因是（ ）A. 缺铁
B. 缺乏维生素 D
C. 甲状旁腺功能不全
D. 缺钙
E. 婴儿生长速度快
- 4、单项选择题：母乳特点中不包括（ ）A. 酪蛋白与乳清蛋白比例 1：4
B. 乙型乳糖含量丰富
C. 电解质浓度低
D. 维生素 D 含量较低
E. 维生素 K 含量较高
- 5、单项选择题：佝偻病激期的表现是（ ）A. 临时钙化带重新出现
B. 颅骨软化
C. 骨骺 X 线检查正常
D. 血钙浓度正常
E. 肌张力增强
- 6、单项选择题：1 岁以内婴儿总能量的需要约是（ ）A. 70kcal / (kg · D.
B. 90kcal / (kg · D.
C. 110kcal / (kg · D.
D. 130kcal / (kg · D.

E. 150kcal/ (kg · D.

7、单项选择题：低出生体重儿补充维生素 D 的方法是 () A. 生后 1 周补充维生素 D400IU/d

B. 生后 2 周补充维生素 D400IU/d

C. 生后 1 个月补充维生素 D400IU/d

D. 生后 1 周补充维生素 D800IU/d

E. 生后 2 周补充维生素 D800IU/d

8、单项选择题：病儿，女，13 个月。多汗，夜寐不安。查体：方颅发稀，鸡胸明显。血钙及血磷均降低，碱性磷酸酶升高。首先考虑的诊断是 ()。A. 佝偻病激期

B. 佝偻病初期

C. 佝偻病恢复期

D. 佝偻病活动期

E. 佝偻病后遗症期

9、单项选择题：5~6 个月小儿可添加的辅食为 () A. 稀粥、蛋黄、碎肉

B. 维生素 AD 制剂、豆制品

C. 馒头片、熟土豆、水果汁

D. 米汤、鱼肉汤、豆腐

E. 烂面条、带馅食品、碎菜

10、单项选择题：体重 9.2kg，身高 76cm，头围 46cm，胸围 46cm，牙齿 8 颗，最可能的月龄是 () A. 10 个月

B. 12 个月

C. 15 个月

D. 16 个月

E. 18 个月

11、单项选择题：小儿佝偻病的主要病因是 ()。A. 缺钙

B. 缺乏维生素

C. 甲状旁腺功能不全

D. 食物中热量和蛋白质不足

E. 食物中钙磷比例不当

12、单项选择题：下列维生素 D 中 I C. 青春期生长加速能量消耗也增多

D. 能量供应不足可使生长发育速度减少或停滞

E. 每增加 1g 体重约需能量 100kcal

15、单项选择题：正常小儿每日每公斤体重所需热卡的简单计算方法是 () A. 1 岁以内 110kcal，以后每增加 3 岁减去 10kcal

B. 1 岁以内 100kcal，以后每增加 2 岁减去 15kcal

C. 1 岁以内 100kcal，以后每增加 3 岁减去 10kcal

D. 1 岁以内 120kcal，以后每增加 2 岁减去 15kcal

E. 1 岁以内 115kcal，以后每增加 4 岁减去 25kcal

16、单项选择题：3 日龄新生儿血电解质的特点下列哪项除外 () A. 血钾偏高

B. 血钠偏高

C. 血氯偏高

D. 血磷偏高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/985004133023011201>