

2024 年安徽省岳西县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题内部题库（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率 $\leq$ 5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 34ml/min

B: 30ml/min

C: 40ml/min

D: 25.5ml/min

答案：D

2. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 氯苯那敏

B: 对乙酰氨基酚

C: 右美沙芬

D: 伪麻黄碱

答案：B

3. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 有利诊断特殊疾患
- B: 列为行政决策的依据
- C: 改变降脂治疗观念
- D: 有助个体化给药

答案：B

4. 以下联合用药中，依据“作用相加或增加疗效”机制的是

- A: 阿托品联用普萘洛尔
- B: 氢溴酸山莨菪碱联用哌替啶
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 磺胺甲噁唑（SMZ）联用甲氧苄啶（TMP）

答案：D

5. 结核病、水痘、麻疹、百日咳、流行性腮腺炎等传染病可呈现

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 单核细胞增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：C

6. 抗高血压的药是（）。

- A: 卡托普利
- B: 法莫替丁
- C: 二甲双胍

D: 多粘菌素

答案：A

7. 药师发现严重滥用药品的处方，应该

A: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预

B: 调配处方并发药

C: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告

D: 拒绝调配处方

答案：C

8. 亚硝酸盐中毒的解救药物是

A: 青霉胺

B: 纳洛酮

C: 氯解磷定

D: 亚甲蓝

答案：D

9. (2019 年真题) 患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

A: 格列齐特

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 吡格列酮

答案：C

10. 蒽环类抗生素容易引起心脏毒性，可以采用的预防药物是

A: 糖皮质激素

B: 抗组胺药

C: 肾上腺素

D: 维生素. 辅酶 Q

答案: D

11. 为提高叶酸治疗营养性巨幼细胞贫血的疗效，应同时用

A: 维生素 B1

B: 维生素 K

C: 维生素 B12

D: 维生素 D

答案: C

12. (2019 年真题) 配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

A: 依托泊苷

B: 环磷酰胺

C: 博来霉素

D: 奥沙利铂

答案: D

13. 引起"苯妥英钠半衰期为 30~40h，羟化酶缺乏者一半剂量即出现神经毒性"是

A: 遗传因素

B: 性别

C: 基础疾病

D: 年龄

答案: A

14. 在治疗蛔虫病的药物中，可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

- A: 甲苯咪唑
- B: 枸橼酸哌嗪
- C: 三苯双脒
- D: 噻嘧啶

答案：A

15. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：A

16. 药物治疗结核病的原则不可随意中断用药、停药、换药

- A: 联合
- B: 适量
- C: 早期
- D: 规律

答案：D

17. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μgqd 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是()

- A: 早餐前半小时，顿服
- B: 睡前顿服

C: 晚餐后顿服

D: 早餐后半小时, 顿服

答案: A

18. 对口腔黏膜有麻醉作用, 产生麻木感, 需整片吞服, 不可咀嚼的镇咳药是

A: 可待因

B: 右美沙芬

C: 色甘酸钠

D: 苯丙哌林

答案: D

19. 交代患者药品未开启包装时应置于 2℃~8℃ 保存, 开始使用后不要存放于冰箱中, 可在室温下 (不超过 25℃) 存放 4 周的是

A: 米索前列醇

B: 胰岛素注射剂

C: 枸橼酸铋钾

D: 氟西汀

答案: B

20. 描述是否充分、详细、准确是评价

A: 摘要

B: 讨论

C: 结果

D: 前言

答案: C

21. 苯二氮类中毒血压下降时可给予 ()

- A: 有机硫类
- B: 阿托品
- C: 苯妥英钠
- D: 去甲肾上腺素

答案：D

22. 肾功能重度损害时，抗菌药每日剂量分别减低至正常剂量的

- A: $1/2 \sim 1/5$
- B: $2/3 \sim 1/2$
- C: $1/10 \sim 1/15$
- D: $1/5 \sim 1/10$

答案：D

23. S-兰索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP2C8
- B: CYP1A2
- C: CYP2C19
- D: CYP2C9

答案：C

24. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 愈创木酚甘油醚
- B: 苯海拉明
- C: 伪麻黄碱
- D: 右美沙芬

答案：A

25. 注射氟马西尼，用于

- A: 解救硝西泮中毒
- B: 解救可待因中毒
- C: 解救乙醇中毒
- D: 解救丙咪嗪中毒

答案：A

26. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- B: 合理用药信息
- C: 注射剂配制溶媒、浓度
- D: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效

答案：B

27. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是

- A: 依他尼酸
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 布美他尼

答案：B

28. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

- A: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性
- B: 有效性是选择药物的首要标准
- C: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本
- D: 用药安全是药物治疗的前提

答案：C

29. 治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

- A: 麦角胺咖啡因
- B: 谷维素
- C: 苯妥英钠
- D: 阿司匹林

答案：A

30. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: LDL-C 升高
- B: HDL-C 降低
- C: 糖耐量异常
- D: 三酰甘油降低

答案：C

31. 博来霉素的主要毒副作用是（）

- A: 出血性膀胱炎
- B: 心脏毒性
- C: 溶血性尿毒症
- D: 肺纤维化

答案：D

32. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 药动学相互作用

D: 药理作用

答案：B

33. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是

A: 停药后血压增高再服

B: 可以停药降压药

C: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量

D: 为避免血压下降过低，应停药

答案：C

34. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

A: 格列喹酮

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 格列苯脲

答案：B

35. 患者男，78 岁实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是（）

A: 氯吡格雷

B: 依诺肝素

C: 血凝酶

D: 阿司匹林

答案：B

36. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

- A: 甲硝唑
- B: 曲古霉素
- C: 制霉菌素
- D: 硝酸咪康唑

答案：B

37. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

- A: 冰硼散
- B: 甲硝唑含漱剂
- C: 维生素 C
- D: 地塞米松黏贴片

答案：D

38. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

- A: 含有马兜铃酸的中药
- B: 异烟肼
- C: 吡罗昔康
- D: 三环类抗抑郁药

答案：A

39. 蛋白酶抑制剂

- A: 依非韦伦
- B: 利托那韦
- C: 齐多夫定
- D: 利巴韦林

答案：B

40. 应用铁剂的影响因素预防铁负荷过重，表现为铁的吸收与体内储存量有关，缺铁性贫血者的吸收率为

- A: 0.3
- B: 10%~30%
- C: 0.4
- D: 10%~20%

答案：A

41. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

- A: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等
- B: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果
- C: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据
- D: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

42. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对药品调配环节防范措施中的

- A: 及时沟通
- B: 规范操作、坚持核对
- C: 环境整齐、安静
- D: 保证足够的人力配备

答案：B

43. 适用于 1-dopa 治疗伴疗效减退、症状波动患者的是

- A: 苯海索
- B: 左旋多巴
- C: 司来吉兰

D: 恩托卡朋

答案: D

44. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A: 烟酸

B: 贝特类

C: 他汀类

D: ω -3 脂肪酸

答案: C

45. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，一天前发热，体温 39.8℃，全身乏力，四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低，中性粒细胞比例低，该者最适宜选用的药物是

A: 阿昔洛韦片

B: 金刚烷胺片

C: 奥司他韦胶囊

D: 利巴韦林片

答案: C

46. 乳母服用红霉素，乳汁中红霉素的量高于总用药量 1% 的机制是其

A: 呈弱碱性

B: 解离度大

C: 在母体血浆中处于结合状态

D: 呈弱酸性

答案: A

47. 氯霉素的禁用范围是

- A: 新生儿
- B: 1 岁以下婴儿
- C: 3 岁以下幼儿
- D: 婴幼儿

答案：A

48. 哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

- A: 卡托普利
- B: 四环素
- C: 含雌、孕激素的避孕药
- D: 喹诺酮类药物

答案：C

49. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

- A: RBC
- B: INR
- C: ALT
- D: APTT

答案：D

50. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

- A: 对氨基水杨酸钠
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：C

51. 对购药患者讲授安全用药常识是

- A: 主动方式
- B: 指令方式
- C: 被动方式
- D: 质问方式

答案：A

52. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 黏液便
- C: 米泔水样便
- D: 冻状便

答案：D

53. 在血液透析患者中每次给予元素铁

- A: 100mg/次
- B: 60mg tid
- C: 60mg bid
- D: 60mg qd

答案：A

54. 痛经症状严重者可选用的处方药为

- A: 贝诺酯
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 可待因
- D: 布洛芬

答案：C

55. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

- A: 氯苯那敏
- B: 氨茶碱
- C: 可待因
- D: 地高辛

答案：A

56. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的药物信息来源是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《马丁代尔药物大典》
- C: 《医师案头参考》
- D: 《英国国家处方集》

答案：B

57. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 拉贝洛尔
- B: 福辛普利
- C: 卡托普利
- D: 缬沙坦

答案：A

58. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 米索前列醇
- C: 胰岛素注射剂
- D: 氟西汀

答案：A

59. 应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

- A: 卡培他滨
- B: 顺铂
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：D

60. 患者，男，60 岁，呈典型的"面具脸"，"慌张步态"及"小字症"表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是()

- A: 普拉克索
- B: 多奈哌齐
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：D

61. 处方中“溶液”的规范书写是

- A: Liq
- B: Dos
- C: Mist
- D: Dil

答案：A

62. 对于妊娠期用药，下述治疗措施错误的是

- A: 能单独用药就避免联合用药
- B: 可使用 A 级药物

C: 禁止在孕期给予试验性用药

D: 可使用 D 级药物

答案：D

63. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

A: 亚硝酸盐中毒

B: 瘦肉精中毒

C: 麦角胺中毒

D: 异烟肼中毒

答案：B

64. (2018 年真题) 患者, 女, 48 岁, 因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

A: 多潘立酮片

B: 甲氧氯普胺片

C: 乳酶生片

D: 酵母片

答案：C

65. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

A: 生活和饮食习惯

B: 药物制剂因素

C: 药物的使用

D: 生理因素

答案：B

66. 艾滋病的传播途径不包括

A: 性途径传播

B: 经血传播

C: 消化道传播

D: 经血制品传播

答案：C

67. 妊娠早期初始，受精后半个月以内，患者用药不当的影响是

A: 女性生殖系统发育迟缓

B: 几乎见不到药物的致畸作用

C: 中枢神经系统发育迟缓

D: 可导致颅面部畸形、腭裂等

答案：B

68. 自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

A: 3 天

B: 1 天

C: 7 天

D: 5 天

答案：C

69. 在药物信息(MI)源中，文献资料的数量最大的是

A: 互联网站

B: 二级信息源

C: 数据库

D: 一级信息源

答案：D

70. 我国育龄妇女的主要避孕措施为

- A: 阴茎套
- B: 口服避孕药
- C: 宫内节育器
- D: 男性绝育术

答案：C

71. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是 ()

- A: 多替拉韦
- B: 奈韦拉平
- C: 洛匹那韦
- D: 阿巴卡韦

答案：B

72. 冠心病患者入不能耐受 ACEI，可考虑给予 ()

- A: α 受体拮抗剂
- B: AR
- C: 地高辛
- D: β 受体激动剂

答案：B

73. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周
- B: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周
- C: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周
- D: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

答案：B

74. 慢性沙眼患者禁用的药品是

- A: 利福平滴眼剂
- B: 酞丁安滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 醋酸可的松滴眼剂

答案：D

75. 饮食对粪外观的影响，肉食

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 黑褐色

B: 暗绿色

C: 酱色

D: 红色

答案：A

76. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

A: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用

B: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类

C: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨曲南预防感染

D: 对于清洁手术（I 类切口），通常不需预防用抗菌药物

答案：C

77. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、稍有气促，心率 95 次/分，律齐，体温 39.1℃，血压 110/70mmHg；心肺听诊：双肺呼吸音粗，未闻及明显啰音；发病以来纳差、精神欠佳、二便可、睡眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，以缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

B: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

C: 右美沙芬可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

D: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多的咳嗽应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

答案：B

78. 告知“培高利特存在致心脏瓣膜病风险，已经撤市”，咨询内容属于

A: 合理用药信息

B: 药物不良反应事件

C: 禁忌证

D: 药物相互作用

答案：B

79. 患者男 62 岁无吸烟饮酒史患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示 AST145U/L, ALT134/L, 排除了其他疾病因素后停用阿托伐他汀肝功能逐步恢复正常。二个月后，改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为 ()

- A: 肯定
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 可能

答案：A

80. 受精后 3 周至 3 个月（12 周末之前）

- A: 可产生形态或功能的异常而造成畸形
- B: 几乎见不到药物的致畸作用
- C: 中枢神经系统发育迟缓
- D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：A

81. 以下有关项目中，可作为药品外观质量检查的主要内容是

- A: 药品中包装
- B: 药品外包装
- C: 药品性状
- D: 药品内包装

答案：C

82. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

- A: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用
- B: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿
- C: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强
- D: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性

答案：B

83. 起效较慢，需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻，减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 特拉唑嗪
- B: 阿夫唑嗪
- C: 氟伏沙明
- D: 非那雄胺

答案：D

84. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

- A: 可能
- B: 很可能
- C: 肯定
- D: 可能无关

答案：C

85. 痛风缓解期，在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

- A: 呋塞米
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 阿司匹林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/985024330123012033>