

1. 单选 儿童给药剂量的计算方法有多种，下列方法中相对更为准确的是

- A. 根据年龄计算
- B. 根据体重计算
- C. 按体表面积计算
- D. 按成人剂量折算
- E. 根据血浆蛋白含量计算

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：按体表面积计算较按年龄、体重计算更为准确，因体表面积与基础代谢、肾小球滤过率等生理活动的关系更为密切。

2. 单选 下列不属于卡马西平适应症的是

- A. 躁狂抑郁症
- B. 三叉神经疼痛
- C. 镇静催眠
- D. 中枢神经性尿崩症

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：卡马西平的适应症主要包括：抗癫痫、三叉神经疼痛、中枢性尿崩症。

3. 单选 药品零售企业在销售处方药时，发现有配伍禁忌的处方做法正确的是（）

- A. 经执业药师修改处方后可以调配
- B. 拒绝调配
- C. 报给店长，如店长同意可以销售
- D. 跟顾客说明情况，如顾客执意购买可以销售

正确答案：B 你的答案：B

4. 单选 非甾体抗炎药阿司匹林导致的过敏性哮喘应用的治疗药物是

- A. 孟鲁司特钠
- B. 色甘酸钠
- C. 西替利嗪
- D. 噻托溴铵

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：阿司匹林导致的哮喘常用药物是白三烯受体的拮抗剂：孟鲁司特、扎鲁司特等。

5. 单选 抗癫痫药物可以导致对乙酰氨基酚肝脏毒性增加的药物是

- A. 卡马西平
- B. 丙戊酸钠
- C. 拉莫三嗪
- D. 加巴喷丁

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：卡马西平是肝药酶的诱导，与对乙酰氨基酚合用会导致对乙酰氨基酚的代谢产物增加，肝毒性增加。

6. 单选 分娩前应用氯霉素可以导致新生儿出现

- A. 肺炎
- B. 腹泻
- C. 核黄疸
- D. 灰婴综合征
- E. 呼吸窘迫综合征

正确答案：D 你的答案：D

答案解析：分娩前应用氯霉素可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征。

7. 单选 下列不属于中效利尿剂的不良反应的是

- A. 血钾降低
- B. 血钙升高
- C. 尿酸降低
- D. 血糖升高

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：中效利尿剂会引起血钾降低、血钙升高、尿酸升高、血脂升高、血氨升高、血糖升高、血钠降低、血镁降低、低氯性碱中毒等不良反应。

8. 单选 在药品零售企业销售处方药时，药品处方审核的第一责任人是（）

- A. 店长
- B. 营业员
- C. 药师
- D. 质量管理人员

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：

9. 单选 患者，女，65岁，诊断为2型糖尿病，长期使用二甲双胍与伏格列波糖联合治疗，应注意可能导致

- A. 维生素A缺乏
- B. 维生素B6缺乏
- C. 维生素B12缺乏

D. 维生素 D 缺乏

E. 维生素 K 缺乏

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：长期使用二甲双胍者应注意维生素 B12 缺乏的可能性。

10. 单选 下列那种维生素缺乏会导致患者出现角膜软化和夜盲症的是

A. 维生素 A

B. 维生素 B2

C. 维生素 D

D. 维生素 E

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：维生素 A 缺乏症会导致患者出现角膜软化、干眼症、夜盲症、皮肤角质粗糙等。

11. 单选 用于治疗 and 预防肝昏迷或昏迷前状态的渗透性泻药是

A. 乳果糖

B. 聚乙二醇

C. 硫酸镁

D. 酚酞

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：乳果糖用于肝昏迷及昏迷前期，药物用量起始剂量，30-50ml，一日3次。

12. 单选 下列降压药物中会导致患者出现踝关节水肿的药物是

A. 氨氯地平

- B. 卡托普利
- C. 利血平
- D. 硝普钠

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：钙通道阻滞剂地平类药物主要的典型不良反应主要包括，心跳加快、足踝部水肿、面部潮红、牙龈增生。

13. 单选 不仅降低外周血管阻力，还可以抑制组织中肾素血管紧张素系统，降低肾小球出球小动脉张力，改善肾小球内血流动力学改变的作用的药物是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）
- B. 钙通道阻滞剂（CCB）
- C. 利尿剂
- D. β 受体阻断剂
- E. β 受体激动剂

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）：不仅降低外周血管阻力，尚可抑制组织中肾素血管紧张素系统，降低肾小球出球小动脉张力，改善肾小球内血流动力学改变的作用。

14. 单选 患者，男，48岁，患有青光眼3年。近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗。该患者应慎用

- A. 多索茶碱注射液
- B. 布地奈德混悬液
- C. 沙丁胺醇气雾剂

D. 孟鲁司特钠咀嚼片

E. 异丙托溴铵气雾剂

正确答案：E 你的答案：E

答案解析：异丙托溴铵属于抗胆碱药，妊娠早期妇女、青光眼与前列腺肥大的患者应慎用。

15. 单选 不属于噻嗪类利尿剂不良反应的是

A. 高钾血症

B. 尿酸升高

C. 血糖升高

D. 磺胺样过敏反应

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：噻嗪类的利尿剂引起血钾降低、血钙升高、尿酸升高、肌酐升高、血脂升高、血氨升高、血糖升高、血钠降低、血镁降低，磺胺样过敏反应。

16. 单选 氟西汀不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用，至少应在停用氟西汀几周后才可使用单胺氧化酶抑制剂

A. 1 周

B. 2 周

C. 4 周

D. 5 周

正确答案：D 你的答案：D

答案解析：.氟西汀不宜与 MAOI（单胺氧化酶抑制剂：吗氯贝胺）合并使用。同样，至少应在停用本药 5 周后，方可开始使用 MAOI

17. 单选 对高血压合并糖尿病伴有微量白蛋白尿的患者，首选的降压药是

- A. 钙通道阻滞剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 噻嗪类利尿剂
- D. α 受体阻断剂
- E. β 受体阻断剂

正确答案：B 你的答案：B

答案解析：血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）：①ACEI对糖、脂代谢无不良影响，限盐或加用利尿剂可增加ACEI的降压效应。②ACEI尤其适用于伴慢性心力衰竭、心肌梗死后心功能不全、心房颤动、糖尿病肾病、慢性肾脏病、代谢综合征、蛋白尿或微量白蛋白尿的患者。③禁用于双侧肾动脉狭窄、高钾血症及妊娠期。

18. 单选 不宜与抗菌药物联合应用的祛痰药物是

- A. 乙酰半胱氨酸
- B. 氨溴索
- C. 桉柠蒎
- D. 厄多司坦

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：乙酰半胱氨酸能够减弱头孢菌素、青霉素类、四环素类药物的抗菌活性，所以在应用时避免一起合用，间隔四小时以上在应用，或者是交替用药。

19. 单选 下列药品零售企业的销售行为中，符合法定要求的是（）

- A. 销售甲类非处方药时主动为顾客提用药指导

- B. 以买药品赠药品等方式向个人消费者销售处方药
- C. 以中药材及初加工产品冒充中药饮片销售
- D. 诱导个人消费者超出治疗需求购买药品

正确答案：A 你的答案： A

答案解析：

20. 单选 急性肾小球肾炎的疾病及并发症治疗时，下列药物中不建议使用的药物是

- A. 伴感染灶的治疗用青霉素
- B. 利尿剂应用呋塞米
- C. 伴高血压用卡托普利
- D. 无尿时用肾上腺皮质激素
- E. 减轻心脏前后负荷用硝普钠

正确答案：D 你的答案： D

答案解析：一般不用肾上腺皮质激素。对内科治疗无效的严重少尿或无尿、高度循环充血状态及不能控制的高血压可用透析治疗。

21. 单选 属于第一代头孢菌素的药物是

- A. 头孢唑林
- B. 头孢呋辛
- C. 头孢曲松
- D. 头孢他啶

正确答案：A 你的答案： A

答案解析：第一代头孢主要包括头孢唑林、头孢拉定、头孢硫脒、头孢噻吩、头孢氨苄、头孢羟氨苄。

22. 单选 不属于维生素 K 适应症的是

- A. 低凝血酶原血症
- B. 预防新生儿出血
- C. 肝素导致的出血
- D. 长期大剂量应用抗菌药物导致的出血

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：肝素导致的出血用硫酸鱼精蛋白进行解救。

23. 单选 关于双膦酸盐类药物描述错误的是

- A. 口服阿仑膦酸钠宜在早餐前空腹用 200ml 温开水送服
- B. 服后 30min 内不宜进食和卧床，持续活动 30min 后才可以躺卧
- C. 可以同牛奶、咖啡、茶、矿泉水、果汁和含钙的饮料一起服用
- D. 可用于治疗绝经后妇女的骨质疏松症，以预防髌部和脊柱骨折

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：服用双膦酸盐类药物不宜喝牛奶、咖啡、茶、矿泉水、果汁和含钙的饮料

24. 单选 下列药物中不属于三环类抗抑郁药物的是

- A. 多赛平
- B. 氯米帕米
- C. 丙米嗪
- D. 吗氯贝胺

你的答案： D

答案解析：三环类抗抑郁药主要包括：阿米替林、丙米嗪、氯米帕明、多塞平、具有抗焦虑和抗抑郁的作用。吗氯贝胺属于单胺氧化酶的抑制剂。

25. 单选 低效利尿剂当中容易导致男乳女化，性欲减退的药物是

- A. 螺内酯
- B. 阿米洛利
- C. 氨苯蝶啶
- D. 依普利酮

正确答案： A 你的答案： A

答案解析：螺内酯与雄激素受体亲和力强，引起男乳女化，性欲减退。

26. 单选 下列降压药物中患者应用后会致干咳的是

- A. 福辛普利
- B. 硝苯地平
- C. 坎地沙坦
- D. 普萘洛尔

正确答案： A 你的答案： A

答案解析：普利类降压药物应用时注意会导致患者出现干咳。心悸和皮疹可能伴有瘙痒和发热。

27. 单选 不宜与氯吡格雷联用的质子泵抑制剂是

- A. 泮托拉唑
- B. 雷贝拉唑
- C. 奥美拉唑

正确答案：A 你的答案： C

答案解析：氯吡格雷与 CYP2C19 抑制剂（如奥美拉唑、艾司奥美拉唑、吗氯贝胺、伏立康唑、氟康唑、卡马西平、奥卡西平、氯霉素、环丙沙星、西咪替丁、氟伏沙明、氟西汀等）合用，降低其临床有效性

28. 单选 下列属于合法的药品广告的是（）

- A. 使用医师、患者等的名义或者形象作推荐、证明
- B. 含有“安全”“安全无毒副作用”等保证性内容
- C. 非药品涉及药品的宣传
- D. 非处方药按批准的内容在大众媒介发布广告

正确答案：D 你的答案： D

答案解析：

29. 单选 不属于苯海索不良反应的是

- A. 口干
- B. 便秘
- C. 尿潴留
- D. 降低心律

正确答案：D 你的答案： D

答案解析：抗胆碱效应主要包括常见口干、视物模糊等，偶见心动过速、恶心、呕吐、尿潴留、便秘等。

30. 单选 会导致患者出现胰岛素自身免疫综合征的药物是

- A. 甲巯咪唑

C. 卡比马唑

D. 普萘洛尔

正确答案：A 你的答案：A

答案解析：甲巯咪唑可引起胰岛素自身免疫综合征诱发产生胰岛素自身抗体，诱发低血糖

31. 单选 类风湿关节炎一经确诊，应尽早使用改善病情的抗风湿药（DMARDs）治疗。首选的药物是

A. 柳氮磺吡啶

B. 来氟米特

C. 甲氨蝶呤

D. 环磷酰胺

E. 环孢素

正确答案：C 你的答案：C

答案解析：类风湿关节炎（RA）一经确诊，应尽早使用改善病情的抗风湿药

（DMARDs）治疗。该类药物较非甾体抗炎药（NSAIDs）发挥作用慢，明显改善症状需要1~6个月，故又称慢作用药。虽不具备即刻止痛和抗炎作用，但有改善和延缓病情进展的疗效。推荐首选甲氨蝶呤（MTX），并将它作为联合治疗的基本药物。也可选用柳氮磺吡啶或羟氯喹；存在MTX禁忌时，考虑单用来氟米特或柳氮磺吡啶。

32. 单选 下列药物中患有支气管哮喘的患者慎用的是

A. 硝苯地平

C. 氢氯噻嗪

D. 吲达帕胺

正确答案：B 你的答案：B

答案解析：普萘洛尔会导致支气管痉挛、心脏功能抑制。可能会导致糖脂代谢。

患有支气管哮喘的患者禁止应用普萘洛尔。

33. 单选 容易导致暖气便秘的抗骨质疏松药物是

A. 碳酸钙

B. 降钙素

C. 雷洛昔芬

D. 阿法骨化醇

正确答案：B 你的答案：A

答案解析：钙剂容易导致暖气和便秘，引起高钙血症等不良反应。

34. 单选 在受精后 18 天左右若服用有致畸作用的药物，可能对胚胎造成的影响是

A. 骨骼发育异常

B. 指趾畸形

C. 牙齿色素沉着

D. 颅面部异常

E. 胚胎死亡、流产或存活而发育成正常个体

正确答案：E 你的答案：E

天左右，此阶段期间胚胎的所有细胞尚未进行分化，细胞的功能活力也相等，对药物无选择性的表现，致畸作用无特异性地影响细胞，其结果为胚胎死亡、流产或存活发育成正常个体，因此在受精后半个月以内几乎见不到药物的致畸作用。

35. 单选 急性哮喘发作的首选药物是

- A. 沙丁胺醇
- B. 沙美特罗
- C. 茶碱
- D. 孟鲁司特

正确答案：A 你的答案： A

答案解析：沙丁胺醇可以快速扩张支气管，用于哮喘急性发作。

36. 单选 下列抗帕金森疾病药物属于单胺氧化酶抑制剂的是

- A. 司来吉兰
- B. 苄丝肼
- C. 左旋多巴
- D. 苯海索

正确答案：A 你的答案： A

答案解析：单胺氧化酶抑制剂的代表药物是司来吉兰、雷沙吉兰。

37. 单选 关于抗癫痫药物下列说法错误的是

- A. 妊娠去女性应用丙戊酸钠会导致神经管缺陷类的致畸效应
- B. 育龄女性应用抗癫痫药物治疗期间需每日补充叶酸 0.4mg 每天
- C. 预防抗癫痫药物相关的新生儿出血需要在妊娠后期 3 个月补充维生素 K

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/985114030203011340>