

2024 甘肃省民乐县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题真题题库【有一套】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

- A: 软膏剂
- B: 含漱剂
- C: 滴眼剂
- D: 直肠栓剂

答案：D

2. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

- A: 15%~20%
- B: 20%~40%
- C: 20%~60%
- D: 10%~20%

答案：C

3. 常用的抗肿瘤药给药途径有：动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于癌性胸水

- A: 动脉注射
- B: 静脉注射
- C: 腔内注射
- D: 肌内注射

答案：C

4. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择()

- A: 2~3 个半衰期给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案：B

5. IV 期临床试验是在广泛使用的条件下考察药品疗效和不良反应，样本数常见病不少于

- A: 2000 例
- B: 1000 例
- C: 100 例
- D: 300 例

答案：A

6. 急性期

- A: 1 个月内
- B: 2 周
- C: 1~3 个月
- D: 1~6 个月

答案：A

7. 淋巴细胞正常参考区间是

- A: 0.01~0.05
- B: 0~0.01

C: 0.20~0.40

D: 0.03~0.08

答案：C

8. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

A: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

B: 需要终身服药

C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

D: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶

答案：D

9. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: B 级

B: A 级

C: D 级

D: C 级

答案：C

10. 门诊处方药品用量一般不宜超过

A: 7 日用量

B: 15 日用量

C: 3 日用量

D: 1 日用量

答案：A

11. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 支气管炎
- B: 哮喘
- C: 肺结核
- D: 社区获得性肺炎

答案：D

12. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

- A: 急性心肌梗死
- B: 十二指肠溃疡
- C: 输尿管结石
- D: 横纹肌溶解

答案：D

13. 上市前药物临床评价阶段的临床试验分为

- A: 1 期
- B: 4 期
- C: 2 期
- D: 3 期

答案：D

14. 患者，男，34 岁，既往有胃溃疡病史现因反复关节疼痛、肿大就诊，诊断为骨关节炎，应选用的药物是（）

- A: 布洛芬
- B: 萘普生
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案：C

15. 考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于

- A: I 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: IV 期临床试验

答案：D

16. 说明书中没有儿童用药剂量时，可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法错误的是()

- A: 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m²)
- B: Fried 公式, 婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150
- C: 儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70
- D: 儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m²)/1.73(m²)

答案：A

17. 属于妊娠 X 级毒性药品的是

- A: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦
- B: 辛伐他汀
- C: 氧氟沙星
- D: 水溶性维生素

答案：B

18. 经检查，某患者 A/G（白蛋白/球蛋白）<1，提示患者可能患有

- A: 胃肠炎
- B: 慢性肝炎
- C: 胆囊炎
- D: 胰腺炎

答案：B

19. 贫血患者常出现()

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血小板计数增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：A

20. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 2.0g
- B: 3.0g
- C: 4.5g
- D: 2.5g

答案：A

21. 受精后 3 周至 3 个月（12 周末之前）

- A: 几乎见不到药物的致畸作用
- B: 中枢神经系统发育迟缓
- C: 可产生形态或功能的异常而造成畸形
- D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：C

22. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 奥利司他
- B: 二甲双胍
- C: 替米沙坦

D: 别嘌醇

答案：B

23. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

A: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

B: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

D: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

答案：A

24. 亚硝酸盐中毒的解救药物是

A: 氯解磷定

B: 青霉胺

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案：D

25. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 如原方案中已应用甲硝唑，且日剂量达到 1600mg/d，重复应用时剂量加倍
- B: 如原方案中已应用左氧氟沙星，重复应用时剂量加倍
- C: 应重复原方案治疗 2 周
- D: 如原方案中已应用克拉霉素，应避免再次使用

答案：D

26. 原发性高血压临床表现中错误的是

- A: 可出现靶器官损害的临床表现
- B: 诊断标准是血压高于 140/90mmHg
- C: 绝大多数原发性高血压属于缓进型
- D: 初期即有明显症状

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

27. 药品外观质量检查时，下列哪种药品需要进行澄明度检查

- A: 注射剂
- B: 糖浆剂
- C: 片剂
- D: 口服液

答案：A

28. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 过量维生素 D

- A: 导致新生儿血钙过高
- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- D: 可能致胎儿畸形

答案：A

29. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

- A: 别嘌醇
- B: 地西泮
- C: 利血平
- D: 苯妥英钠

答案：B

30. 美金刚的主要不良反应是

- A: 呼吸抑制
- B: 血脂升高
- C: 心律不齐
- D: 幻觉

答案：D

31. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

- A: 饮食
- B: 被投毒
- C: 环境污染
- D: 长期吸入汞蒸气

答案：D

32. 两种药物配伍之后效价降低的是（）

- A: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液
- B: 青霉素与 5%葡萄糖注射液
- C: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液
- D: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

答案：B

33. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

- A: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿
- B: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用
- C: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性
- D: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强

答案：A

34. 洋地黄中毒的特征性表现为

- A: 恶心
- B: 视力模糊
- C: 黄视、绿视
- D: 快速房性心律失常伴传导阻滞

答案：D

35. （2015 年真题）患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药
- B: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- C: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

D: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

答案：A

36. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

A: 辛伐他汀

B: 左旋多巴

C: 硫酸亚铁

D: 磺胺类药物

答案：B

37. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

A: 碳酸镁

B: 米索前列醇

C: 雷贝拉唑

D: 硫糖铝

答案：B

38. (2018 年真题) 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后,出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是 ()

A: 多巴胺和呋塞米发生反应

B: 酚妥拉明和呋塞米发生反应

C: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

D: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

答案：A

39. 氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为. ()。

- A: 阿米卡星>新霉素>妥布霉素>链霉素
- B: 新霉素>阿米卡星>链霉素>妥布霉素
- C: 庆大霉素>新霉素>妥布霉素>链霉素
- D: 新霉素>阿米卡星>妥布霉素>链霉素

答案：D

40. 高血压合并消化性溃疡者宜不用

- A: 甲基多巴
- B: 酚妥拉明
- C: 利血平
- D: 硝苯地平

答案：C

41. 关于尿路感染的说法，不正确的是

- A: 由细菌感染引起
- B: 多见于育龄期和绝经后女性
- C: 大肠杆菌感染最为常见
- D: 男性发病率稍高

答案：D

42. 患者，男，67 岁，主诉腰背疼痛、乏力，负荷增加时疼痛加重，严重时翻身、起坐及行走困难，疑似老年性骨质疏松症。经双能 X 线吸收测定，T 值 ≤ -2.5 ，确诊。药师应告知患者在服用维生素 D 软胶囊、碳酸钙片基础上，可加服

- A: 泼尼松龙
- B: 艾司奥美拉唑
- C: 苯妥英钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：D

43. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A: 10 天之后

B: 15 天之内

C: 20 天之内

D: 15 天之后

答案：B

44. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂？

B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂？

C: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮？

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁？

答案：A

45. 热程持续 4 周以上，体温持续在 37.5-38℃ 间波动，其属于

A: 长期低热

B: 不明原因发热

C: 超高热

D: 中低等度热

答案：A

46. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

A: 三餐前 30min

B: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前

C: 早餐前 30min

D: 餐后、睡前

答案: C

47. 患者溃疡治愈后,因膝关节痛,需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡发生风险,首选的预防药物是 ()

A: 多潘立酮

B: 枸橼酸铋钾

C: 奥美拉唑

D: 替普瑞酮

答案: C

48. 以下毒物中毒,清醒者适宜口服吐根糖浆催吐的是

A: 苯巴比妥

B: 氯硝西泮

C: 阿米替林

D: 磷化锌

答案: C

49. 是前药,其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂,通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

A: 奥司他韦

B: 更昔洛韦

C: 氟胞嘧啶

D: 干扰素

答案: A

50. 药师应具备的素质中,开展药学服务工作的关键是 ()。

A: 药历制订、修改

- B: 交流沟通能力
- C: 良好的教育背景
- D: 高尚的职业道德

答案：B

51. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

- A: 西沙必利
- B: 奥美拉唑
- C: 碳酸氢钠
- D: 莫沙必利

答案：D

52. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 临床治疗方案
- B: 涂片、培养鉴定
- C: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）
- D: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

答案：A

53. 不宜选静滴 5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

- A: 苯巴比妥中毒
- B: 司可巴比妥中毒
- C: 异戊巴比妥中毒
- D: 苯妥英钠中毒

答案：C

54. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 胰酶片
- B: 莫沙必利
- C: 胃蛋白酶合剂
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：C

55. “记录患者用药问题、药学干预内容、药学监测计划”的技能是

- A: 药品警戒技能
- B: 沟通技能
- C: 药历书写技能
- D: 自主学习能力

答案：C

56. 有关药历含义的叙述如下，其中最正确的是

- A: 药师为患者建立的用药档案
- B: 供患者报销药费的依据
- C: 与病历相同，由药师填写
- D: 患者病危抢救时的用药记录

答案：A

57. 属于肠道促分泌剂，增加肠液分泌而保持血清电解质水平，促进肠道运动，可显著增加 IBS 患者自主排便频率并改善腹痛症状，美国 FDA 批准用于 18 岁以上女性便秘型 IBS 患者的药物是

- A: 西托溴铵
- B: 洛哌丁胺
- C: 鲁比前列酮
- D: 曲美布汀

答案：C

58. 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

- A: 每晚睡前口服
- B: 每日早晚与食物同服
- C: 每日早晚空腹口服
- D: 每日清晨空腹口服

答案：B

59. 大剂量或连续使用顺铂可导致

- A: 直接肾毒性
- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 肾小管阻塞
- D: 肾间质纤维化

答案：B

60. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5%葡萄糖注射液 350ml 中，临床要求给药速度是 60mg/h，输注速度是

- A: 60ml/h
- B: 36ml/h
- C: 15ml/h
- D: 42ml/h

答案：D

61. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 氟伏沙明
- B: 非那雄胺

C: 阿夫唑嗪

D: 特拉唑嗪

答案: B

62. 服用药物对粪外观的影响, 水杨酸钠

A: 黄色

B: 红至黑色

C: 橘红至红色

D: 变红或黑色

答案: B

63. 治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘, 可选择的药物是

A: 乳果糖

B: 硫酸镁

C: 比沙可啶

D: 东莨菪碱

答案: A

64. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

A: 服药时避免与钙片同服, 以免影响药物的作用

B: 服药期间及停药一周内, 避免饮用含酒精饮品

C: 服药期间, 可能会发生便秘

D: 用牛奶服药, 减少对胃肠道的刺激

答案: D

65. 属于苯二氮革类药物的是

- A: 丁螺环酮
- B: 舍曲林
- C: 阿米替林
- D: 艾司唑仑

答案：D

66. 患者李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160 / 100mmHg。

- A: β 受体阻断剂
- B: ACEI
- C: AR
- D: 利尿剂

答案：B

67. 异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

- A: 肺纤维化
- B: 溶血性尿毒症
- C: 心脏毒性
- D: 出血性膀胱炎

答案：D

68. （2021 年真题）患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

- A: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- C: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- D: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确

答案：A

69. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 室性期前收缩？
- B: 心房颤动？
- C: 窦性心动过缓？
- D: 阵发性室上性心动过速？

答案：B

70. （2015 年真题）静脉注射青霉素的适宜溶媒是（ ）。

- A: 0.9 氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：A

71. 苯二氮

- A: 舍曲林
- B: 艾司唑仑
- C: 丁螺环酮
- D: 阿米替林

答案：B

72. 人体健康参数：体重指数(BMI)正常区间是

- A: 18.5~23.9
- B: 18.0~23.0

C: 18.0~22.0

D: 18.5~23.0

答案：A

73. 下述“关于肺结核的治疗原则”中，不正确的是

A: 整个治疗方案分为 3 个阶段

B: 防止耐药菌产生

C: 整个治疗方案分为强化期和巩固期两个阶段

D: 减少结核菌的传播

答案：A

74. 氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

A: 食醋

B: 酒

C: 食盐

D: 脂肪

答案：B

75. 患儿，3 岁，因发热就诊，体温 38.8℃。药师应推荐的治疗药物是

A: 布洛芬混悬液

B: 20% 安乃近滴鼻剂

C: 塞来昔布缓释片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：A

76. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 1 周频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 苯海拉明
- B: 电复律
- C: 阿托品
- D: 胺碘酮

答案：D

77. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 慢性肾盂肾炎
- B: 急性膀胱炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：B

78. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，是归属于

- A: 药学信息服务工作
- B: 处方点评工作
- C: 参与健康教育工作
- D: 处方审核工作

答案：B

79. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

- A: 氢化可的松软膏
- B: 联苯苄唑软膏
- C: 酮康唑软膏
- D: 复方苯甲酸软膏

答案：A

80. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此 ADR 因果关系可评价为

- A: 可能
- B: 待评价
- C: 可能无关
- D: 很可能

答案：A

81. 患者女,25 岁,两天前淋雨后开始发热,体温 39.0℃,咳嗽,咳铁锈色黏痰,化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高,诊断为肺炎,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物 ()

- A: 阿米卡星
- B: 头孢他啶
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢唑林

答案：D

82. 多用于病情急重者的制剂

- A: 透皮贴剂
- B: 泡腾片剂
- C: 膜剂
- D: 滴丸剂

答案：D

83. 下列药品宜于冷处贮存，但不应冷冻的是

- A: 托烷司琼注射剂
- B: 复方氨基酸注射剂
- C: 替硝唑注射剂
- D: 双歧三联活菌制剂

答案：D

84. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 经肝肾双途径消除的药物
- B: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- C: 经肝肠循环消除的药物
- D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：B

85. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

- A: B 级
- B: A 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：A

86. 下列药物中适宜在餐前服用的是()

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 莫沙必利片
- C: 伊马替尼片
- D: 头孢呋辛酯片

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/985140344114012033>