



宫颈癌介入治疗 及护理



目录

- 宫颈癌介入治疗概述
- 宫颈癌介入治疗方法
- 宫颈癌介入治疗的护理
- 宫颈癌介入治疗的疗效评估
- 宫颈癌介入治疗的并发症及处理
- 宫颈癌介入治疗的展望与研究方向





01

宫颈癌介入治疗概述



介入治疗的定义和特点



定义

介入治疗是一种非手术治疗方法，通过影像学技术引导医生将导管、针或其他介入器械插入病变部位进行治疗。



特点


具有微创、安全、有效的特点，能够减轻患者痛苦，缩短恢复时间，提高治疗效果。



宫颈癌介入治疗的重要性

01

Stages of Cervical dysplasia




提高治疗效果



介入治疗能够直接作用于肿瘤部位，提高肿瘤局部的药物浓度，增强治疗效果。

02




保护卵巢功能



对于年轻患者，介入治疗可以保护卵巢功能，减少因手术切除卵巢带来的生理和心理影响。

03



降低并发症风险



介入治疗创伤小，术后恢复快，降低感染、出血等并发症的风险。



介入治疗的历史与发展



历史

介入治疗起源于20世纪50年代，最初用于血管性疾病的治疗。随着影像技术的进步，介入治疗逐渐应用于肿瘤、疼痛、神经等多个领域。

发展

近年来，介入治疗技术不断创新和改进，新的介入器械和药物的研发为宫颈癌的治疗提供了更多选择和更好的疗效。同时，介入治疗与其他治疗手段的联合应用也成为了研究热点。



02

宫颈癌介入治疗方法




血管内介入治疗

动脉内药物灌注

通过导管将化疗药物直接注入肿瘤供血动脉，提高肿瘤局部药物浓度，杀灭肿瘤细胞。

栓塞治疗

使用栓塞剂阻塞肿瘤供血动脉，阻断肿瘤营养供给，促使肿瘤缺血坏死。



组织间介入治疗

放射性粒子植入

将放射性粒子植入到肿瘤组织中，通过释放辐射能量杀灭肿瘤细胞。

瘤内注药

将药物直接注入肿瘤组织内，提高肿瘤局部药物浓度，增强治疗效果。





肿瘤消融治疗

射频消融

利用射频电流产生的高温破坏肿瘤组织，使其凝固坏死。

冷冻消融

通过低温冷冻破坏肿瘤组织，再升温引起细胞死亡。





其他介入治疗方法



内镜下治疗

对于宫颈管内的肿瘤，可采用内镜下激光、电凝、冷冻等方法进行治疗。

免疫治疗

通过调节患者的免疫系统来增强其对肿瘤的抵抗力，达到控制和杀灭肿瘤的目的。



03

宫颈癌介入治疗的护理





术前护理

心理护理

向患者及家属介绍介入治疗的目的、方法及注意事项，减轻患者的紧张、焦虑情绪。

术前准备

协助完善相关检查，如血常规、凝血功能、心电图等；做好手术区域的皮肤准备；术前8小时禁食水。



术中护理

监测生命体征

密切监测患者的心率、血压、呼吸等指标，确保手术过程中患者的生命安全。

VS

疼痛护理

根据患者的疼痛程度，采取相应的疼痛缓解措施，如使用镇痛药物或进行心理疏导。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/985224133314011141>