

北京住院医师妇产科 I 阶段《滋养细胞疾病试卷》新版

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：良性葡萄胎术后随访目的是下列哪项（ ） A. 指导避孕

- B. 及早发现恶变
- C. 及早发现妊娠
- D. 了解盆腔恢复情况
- E. 指导进一步妊娠

本题答案：B

本题解析：暂无解析

2、单项选择题：患者 40 岁，停经 5 个月，阴道流血 15 日。宫底平脐，听不到胎心，扪不到胎体。确诊为葡萄胎后应立即采取的措施是（ ） A. 备血，立即行清宫术

- B. 输血输液
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 子宫切除术后化疗
- E. 立即化疗

本题答案：A

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：滋养细胞肿瘤的随访指标中，除血尿 hCG 外，下列哪一项最有价值（ ） A. 肺 X 线片

- B. 妇科检查
- C. 子宫双附件 B 超
- D. 肝脏 B 超
- E. 基础体温

本题答案：A

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：葡萄胎确诊后应采取的处理方案是（ ） A. 静脉滴注缩宫素

- B. 备血，立即行清宫术
- C. 输血输液
- D. 子宫切除后化疗
- E. 立即化疗

本题答案：B

本题解析：暂无解析

- 5、单项选择题：下列哪项能完全排除完全性葡萄胎的诊断（ ）
- A. 妊娠试验阴性
 - B. 子宫大于妊娠月份
 - C. 停经后阴道出血
 - D. 超声多普勒闻及胎心搏动
 - E. 卵巢黄素化囊肿

本题答案：D

本题解析：暂无解析

- 6、单项选择题：产后4个月，突然抽搐，CT证实为颅内占位，手术后病理为绒癌脑转移。术后需加用何种治疗最恰当（ ）

- A. 支持治疗
- B. 放疗
- C. 单药化疗
- D. 鞘内化疗
- E. 联合化疗

本题答案：D

本题解析：暂无解析

- 7、单项选择题：葡萄胎处理后选择的避孕方法最好是（ ）

- A. 避孕套
- B. 宫内节育器
- C. 避孕片 I 号
- D. Norplant I
- E. 避孕片 II 号

本题答案：A

本题解析：暂无解析

- 8、单项选择题：26岁已婚妇女，G0P0，诊断为葡萄胎，下列哪项是不恰当的（ ）

- A. 应取近子宫壁的刮出物送病理检查
- B. 子宫过大者，应行第2次刮宫
- C. 一经诊断，应尽快清宫
- D. 葡萄胎排出后，均应进行预防性化疗
- E. 40岁以上的妇女，水泡较小，滋养层细胞增生明显，无生育要求，可考虑切除子宫

本题答案：D

本题解析：暂无解析

- 9、单项选择题：绒毛膜癌转移早且广泛，其主要转移途径是（ ）

- A. 局部蔓延
- B. 淋巴转移
- C. 直接浸润
- D. 血行播散
- E. 腹腔种植

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986000000122010123>