


缺血性肠炎护理查房



CONTENTS

目录

- 病例介绍
- 缺血性肠炎护理知识
- 护理方案
- 护理效果评估
- 护理体会与建议

CHAPTER 01

病例介绍



患者基本信息

患者姓名：张三

职业：退休工人

籍贯：北京市

年龄：65岁

性别：男





病情概述



01

主诉


腹痛、腹泻、血便2天



02

病史


患者有高血压、糖尿病等慢性病史，长期服用阿司匹林



03

症状

腹痛、腹泻、血便，伴恶心、呕吐、发热



04

体征

腹部压痛、反跳痛，肠鸣音减弱

治疗方案

01



药物治疗



给予抗凝、扩血管、抗炎等药物治疗

02



饮食调整



禁食，待病情好转后逐渐过渡到流质、半流质、软食

03



护理措施




密切观察病情变化，监测生命体征，记录出入量，做好心理护理和健康教育

CHAPTER 02

缺血性肠炎护理知识




疾病成因



血管阻塞

由于动脉粥样硬化、血栓等原因，肠道血管阻塞导致肠道供血不足。



血流减少

血压过低或心脏疾病导致肠道血流减少，引发缺血性肠炎。



血管痉挛

某些药物或神经刺激导致肠道血管痉挛，影响肠道供血。



症状表现



腹痛

腹部出现突然的绞痛，
通常在左下腹。



腹泻

排出暗红色或鲜红色的
血便，可伴有黏液。



恶心、呕吐

可能出现恶心、呕吐等
症状。



发热

部分患者可能出现发热。



诊断标准

● 临床表现

腹痛、血便等症状表现。

● 实验室检查

粪便潜血试验阳性，血常规检查可见白细胞升高。

● 结肠镜检查

结肠镜检查是确诊缺血性肠炎的主要方法，可见肠道黏膜充血、水肿、糜烂和溃疡等病变。






治疗原则


补充血容量

对于血流减少引起的缺血性肠炎，补充血容量是关键措施。




解除痉挛

对于血管痉挛引起的缺血性肠炎，需要使用药物或物理方法解除痉挛，恢复肠道供血。



抗凝治疗

对于血栓引起的缺血性肠炎，需要进行抗凝治疗，防止血栓进一步形成。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986103031231010055>