



# 原发性肝癌治疗



# 目录

---

- 肝癌的早期诊断
- 原发性肝癌的治疗方法
- 肝癌的药物治疗
- 肝癌的放射治疗
- 肝癌的中医治疗



01

# 肝癌的早期诊断

Chapter





# 早期肝癌的症状

01

由于肝癌肿块压迫肝包膜，导致右上腹或中上腹钝痛。

02

## 食欲减退

肝癌引起肝功能异常，导致食欲减退、恶心、呕吐等症状。

03

由于肝功能异常和食欲减退，患者体重可能明显下降。

04

## 黄疸

肝癌压迫胆管可引起黄疸，表现为皮肤、巩膜黄染。



# 肝癌的早期筛查方法

## 血液甲胎蛋白检测

检测血液中甲胎蛋白水平，作为肝癌的标志物。

## 肝脏超声检查

通过高频超声检查肝脏，发现肿瘤病变。

## CT和MRI检查

通过断层扫描或磁场成像技术，发现肿瘤病变。

## 肝穿刺活检

通过穿刺肝脏组织进行病理检查，确诊肝癌。



# 早期肝癌的诊断标准

## ● 甲胎蛋白升高

血液甲胎蛋白水平高于正常值，提示肝癌可能。

## ● 影像学检查

肝脏超声、CT或MRI检查发现肿瘤病变。

## ● 病理诊断

肝穿刺活检确诊肝癌。





02

# 原发性肝癌的治疗方法

Chapter





# 手术切除



## 总结词

手术切除是原发性肝癌最常用的治疗方法，适用于早期肝癌患者。

## 详细描述

手术切除包括开腹手术和腹腔镜手术两种方式，通过切除肿瘤及部分周围正常肝组织来达到治疗目的。手术切除的疗效与肿瘤大小、位置、分期等因素有关，早期肝癌患者术后复发率较低，预后较好。



# 肝移植



## 总结词

肝移植是一种治疗原发性肝癌的有效方法，适用于无法通过手术切除的晚期肝癌患者。

## 详细描述

肝移植是通过将健康肝脏移植给患者来替换病变肝脏的治疗方式，可以根治肝癌并解决肝硬化等问题。肝移植的疗效与患者病情、供肝来源、手术技术等因素有关，术后需要长期使用免疫抑制剂以降低排斥反应的风险。



# 局部消融治疗

## 总结词

局部消融治疗是一种微创治疗方法，适用于小肝癌患者。

## 详细描述

局部消融治疗包括射频消融、微波消融、冷冻消融等，通过高温或低温将肿瘤组织灭活。该方法具有创伤小、恢复快、疗效可靠等优点，尤其适用于不能耐受手术的患者。





# 介入治疗

## 总结词

介入治疗是一种非手术治疗方法，适用于中晚期肝癌患者。

## 详细描述

介入治疗包括经导管动脉化疗栓塞、经导管肝动脉化疗灌注等，通过向肿瘤供血动脉注入药物或栓塞剂来抑制肿瘤生长。该方法可用于控制肿瘤进展、延长生存期、缓解症状等，但疗效不如手术切除和肝移植。



03

# 肝癌的药物治疗

Chapter



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986224135125010100>