

北京住院医师内科 I 阶段《神经内科必看考点》考试题

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：急性脊髓炎的治疗在急性期最应该采用（ ）。A. 中药
B. 抗生素
C. 激素
D. 大量维生素
E. 血管扩张药物
- 2、单项选择题：重症肌无力的发病机制可能是（ ）。A. 突触后膜乙酰胆碱受体敏感性降低和受体数目减少
B. 突触前膜乙酰胆碱释放减少
C. 乙酰胆碱酯酶活性降低
D. 乙酰胆碱酯酶活性增高
E. 以上均不是
- 3、单项选择题：关于多发性硬化治疗不恰当的描述是（ ）。A. 皮质类固醇是多发性硬化急性发作和复发的主要治疗药物，可加速急性复发的恢复和缩短复发期病程，但不能改善恢复程度
B. 长期应用皮质类固醇不能防止复发，且可出现严重不良反应
C. 继发进展（SP）型 MS 皮质类固醇无效，可选用免疫抑制剂
D. 对原发进展型 MS，采用特异性免疫调节治疗无效，主要是对症治疗，血浆置换对暴发病例可能有用
E. 金刚烷胺对尿潴留可能有用
- 4、单项选择题：肱二头肌质反射减弱或消失，而肱三头肌反射正常提示病变部位为（ ）。A. C3 或 C4
B. C5 或 C6
C. C3 或 C2
D. C1 或 C2
E. C4 或 C5
- 5、单项选择题：癫痫持续状态最常见类型是（ ）。A. 单纯部分性发作
B. 复杂部分性发作
C. 失神发作
D. 强直性发作
E. 全面强直-阵挛发作
- 6、单项选择题：大多数急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病脑脊液可见（ ）。A. 发病时细胞数明显增多，蛋白不增高
B. 发病时蛋白明显增高，细胞数不增多

- C. 病后第 3 周蛋白、细胞数均明显增高
D. 病后第 3 周细胞数显著增多，蛋白正常或近于正常
E. 病后第 3 周蛋白显著增高，细胞数正常或接近正常
- 7、单项选择题：关于重症肌无力的阐述哪项是错误的（ ）。A. 用抗胆碱酯酶药物有效
B. 部分或全身骨骼肌易疲劳
C. 腾喜龙试验阴性
D. 活动后加重，休息后减轻和晨轻暮重
E. 是自身免疫性疾病
- 8、单项选择题：运动神经元病的损害部位不包括（ ）。A. 皮质锥体细胞
B. 锥体束
C. 脊髓前角
D. 脑干后组运动神经元
E. 脊髓后角
- 9、单项选择题：58 岁男性，高血压病史，演讲时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫。在急诊室检查时病人昏迷，左侧瞳孔大，对光反射消失，诊断（ ）。A. 脑出血，左颞叶钩回疝
B. 脑出血，右颞叶钩回疝
C. 脑出血，小脑扁桃体疝
D. 蛛网膜下隙出血
E. 颈内动脉血栓形成
- 10、单项选择题：惊厥性全身性癫痫持续状态必须从速控制发作，并保持不再复发的时间至少为（ ）。
A. 6 小时
B. 12 小时
C. 24 小时
D. 48 小时
E. 72 小时
- 11、单项选择题：心源性脑栓塞时，栓塞多发生在（ ）。A. 大脑前动脉
B. 大脑中动脉
C. 大脑后动脉
D. 椎动脉
E. 基底动脉
- 12、单项选择题：下述哪项不是重症肌无力的临床特征（ ）。A. 严重时可能出现肢体无力，一般上肢重于下肢，近端重于远端
B. 呼吸肌麻痹是重症肌无力的常见死因
C. 短暂用力后肌力增强，持续收缩后又出现病态疲劳
D. 受累肌肉的病态疲劳多于下午或傍晚劳累后加重，早晨和休息后减轻
E. 感染、妊娠和月经前常导致疾病恶化
- 13、单项选择题：脑出血最常见的动脉是（ ）。A. 小脑齿状核动脉
B. 基底动脉旁正中动脉
C. 大脑中动脉豆纹动脉
D. 脉络膜前动脉
E. 前交通动脉
- 14、单项选择题：老年痴呆症的病理学变化中，老年斑属于哪一类沉积物（ ）。A. 细胞内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987030053131006102>