

试卷大题名称:A型题

题型:A型题

1. 患者,女,36岁,因下前牙变色1年余就诊。检查:左下中切牙牙冠变色,叩痛(-),电测无反应。开髓后根管内黄褐色清亮液体溢出。X线片根尖周见大小约1cm×1.2cm透射区,边界清楚,周围有骨白线。该主诉牙应诊断为()。

- A. 慢性根尖肉芽肿
- B. 慢性根尖脓肿
- C. 根尖周囊肿
- D. 牙髓坏死
- E. 致密性骨炎

【答案】C

【解析】从病例中可知道主诉牙为慢性根尖周炎,慢性根尖周炎X线片表现分为4型:根尖肉芽肿、根尖脓肿、根尖周囊肿、致密性骨炎。考生应当掌握4型的X线片区别,再加上黄褐色清亮液体溢出,可明确诊断。

涉及图片:

2. 关于牙髓塑化治疗,下列不正确的是()。

- A. 塑化治疗无需扩大根管,仅用15号器械通畅至近根尖区
- B. 塑化治疗不适用于拟行桩,核修复的患牙
- C. 塑化治疗不可用于前牙
- D. 根管器械切忌超出根尖孔
- E. 适用于乳牙

【答案】E

【解析】乳牙根尖孔狭窄区可能已被吸收而呈开放状态,造成塑化液的流失,其后果是一方面对根尖周组织形成化学性刺激并且伤害恒牙胚,另一方面可造成塑化剂对根管内残剩物质塑化不全,并影响其封闭根尖孔的作用。

涉及图片:

3. 关于急性根尖周炎应急处理操作注意点不正确的是()。

- A. 局部浸润麻醉要避免脓肿部位
- B. 正确开髓并尽量减少钻磨震动
- C. 用3%双氧水和次氯酸钠交替冲洗根管
- D. 开髓后要开放引流2~3天
- E. 如时间紧急,可在服用大量抗生素的情况下,一次性根管充填

【答案】E

【解析】若开髓后即做根管预备，往往使症状加重，应待急性炎症消退后再作常规治疗。

涉及图片：

4. 患者，男，50岁，因右侧后牙夜间痛3天，冷热加重就诊。检查：右上第一磨牙无龋，松动Ⅱ度，颊侧牙龈红肿，牙周溢脓，牙周袋深及根尖，冷热诊激发痛。该主诉牙应诊断为()。

- A. 慢性牙髓炎
- B. 急性根尖周炎
- C. 残髓炎
- D. 逆行性牙髓炎
- E. 慢性根尖周炎

【答案】D

涉及图片：

5. 患者，男，35岁，因下后牙急性根尖周炎行根管治疗，首诊开放处理后症状缓解，复诊时检查患牙叩痛(+)，扪痛(+)，医师进行了机械根管预备和封药，次日出现面部肿胀，分析原因最可能的是()。

- A. 机体抵抗力降低
- B. 根管内药效丧失
- C. 根管感染清创不足
- D. 操作中带入新感染
- E. 根管预备时机不当

【答案】E

涉及图片：

6. 患者，男，成年，右上第一前磨牙[牙合.gif]面深龋引起急性根尖周炎在某医院开髓治疗后，仍有剧烈疼痛，而且面部开始肿胀。查见：髓腔开放，穿髓孔大，根管通畅，叩痛(++)，龈轻红肿，已服消炎药。分析原因，最可能的是()。

- A. 开髓孔过小
- B. 根管不通畅
- C. 有其他感染源
- D. 抗感染力不强
- E. 根尖孔不通畅

【答案】E

【解析】急性根尖周炎的应急处理是开髓并贯通根尖孔以形成引流通道，从而使根尖渗出物及脓液通过根管得到引流，以缓解根尖部的压力，解除疼痛。若根尖孔不通畅，则无法建立引流，疼痛也不能减退。

涉及图片：

牙合.gif:


7. 平滑面早期龋临床特点是()。
- A. 呈白垩色点或斑，一般无主观症状，有一定的好发部位
 - B. 呈白垩色点或斑，遇冷热刺激时可出现疼痛
 - C. 呈白垩色点或斑，可出现在牙齿的任何部位
 - D. 呈白垩色点或斑，探针硬而光滑，病变呈对称性
 - E. 浅龋洞形成，遭受外界刺激时可有反应

【答案】A

涉及图片:

8. 釉质钙化不全与浅龋的临床诊断区别在于()。
- A. 前者由釉质脱矿造成，后者有细菌的作用
 - B. 釉质有机物支架有无分解
 - C. 白垩状损害，但前者表面光洁
 - D. 白垩状损害，但前者可在牙面任何部位，后者有好发部位
 - E. C+D

【答案】E

涉及图片:

9. 邻面早期龋损，最好用的帮助诊断的方法是()。
- A. 视诊
 - B. 探诊
 - C. 叩诊
 - D. [牙合.gif]翼片
 - E. 温度刺激试验

【答案】D

涉及图片:

牙合.gif:


10. 下列关于双生牙的描述正确的是()。
- A. 由两个正常牙胚融合而成

- B. 由两个牙的牙根发育完全后发生粘连而成
- C. 只发生在乳牙列
- D. 由一个向内的凹陷将一个牙胚不完全分开而成
- E. 双生乳牙不会影响其继承牙的萌出

【答案】D

涉及图片:

11. 复合树脂充填, 不宜用氧化锌丁香油糊剂垫底是因为()。

- A. 可致树脂性质改变
- B. 影响树脂聚合
- C. 影响树脂与牙粘接
- D. 抗压强度不足
- E. 使树脂色泽改变

【答案】B

涉及图片:

12. 窝洞制备时, 对于抗力形的要求, 错误的是()。

- A. 洞的深度达到釉牙本质界下0.5mm
- B. 盒形洞形: 底平, 壁直
- C. 复面洞阶梯的龈壁为向颈方的斜面
- D. 去除薄壁弱尖
- E. 洞缘曲线圆钝

【答案】C

涉及图片:

13. 症状比较明显的中龋部位为()。

- A. [牙合].gif面
- B. 颈部
- C. 接触面
- D. 颊面
- E. 舌面

【答案】B

涉及图片:

牙合.gif:



14. 检查继发龋的最佳方法是()。

- A. 探诊
- B. 叩诊
- C. 咬诊
- D. X线片
- E. 去除充填物

【答案】D

【解析】该题考查的知识点是继发龋的诊断方法。继发龋是充填治疗后，发生在邻近充填体的洞壁牙体组织的龋损。继发龋最多发生在邻面窝洞的龈壁，其次是洞底部位。因此拍X线片是最佳检查方法。去除充填体是最后证实是否有继发龋的方法，但这只是诊断确认继发龋后的处理，而不是最佳的诊断方法。

涉及图片:

15. 牙本质龋损在光镜下可看到微生物渗透至牙本质小管的区域是()。

- A. 坏死区
- B. 感染层
- C. 牙本质脱矿区
- D. 硬化区
- E. 修复性牙本质层

【答案】B

涉及图片:

16. 浅龋与轻度釉质发育不全的鉴别要点，不包括()。

- A. 好发牙位不同
- B. 好发部位不同
- C. 患区质地不同
- D. 患区光滑度不同
- E. 患牙牙体形态不同

【答案】E

【解析】该题考查的知识点是龋与釉质发育不全的鉴别诊断要点。正确答案是这两种疾病的共同点，即都有釉质的缺损而致牙体形态的改变，尤其在浅龋和轻度釉质发育不全，均出现白垩斑、黄褐色斑和釉质的浅缺损，其光滑度也不同。

涉及图片:

17. 为防止四环素牙的发生, 不宜使用四环素类药物的是()。

- A. 妊娠期和哺乳期妇女
- B. 4岁以下小儿
- C. 8岁以上儿童
- D. 妊娠期、哺乳期妇女和8岁以下儿童
- E. 所有人

【答案】D

涉及图片:

18. 漂白治疗常用的药物为()。

- A. 10%~15%过氧化脲
- B. 10%~15%过氧化氢
- C. 20%~30%过氧化脲
- D. 30%过氧化氢
- E. 以上均可

【答案】A

涉及图片:

19. 过小牙多见于()。

- A. 上颌侧切牙和第三磨牙
- B. 下颌侧切牙和多生牙
- C. 上颌侧切牙和尖牙
- D. 下颌侧切牙和尖牙
- E. 下颌切牙和第三磨牙

【答案】A

涉及图片:

20. 标准化25号K锉的刃部尖端直径为()。

- A. 0.25mm
- B. 0.20mm
- C. 0.50mm

D. 0.75mm

E. 0.66mm

【答案】A

【解析】国际通用规格的K锉，每一器械的尖端直径为号码的1/100，因此，25号器械的尖端直径为0.25mm。

涉及图片：

21. 治疗牙脱位时，应遵循的原则是()。

A. 部分脱位牙复位固定观察

B. 嵌入性牙脱位复位后2周应作根管治疗

C. 完全脱位牙应于30分钟内进行再植

D. 无论何种脱位牙均应进行根管治疗后再固定

E. 保存患牙

【答案】E

涉及图片：

22. 对深形楔状缺损引起的牙本质过敏首选的治疗方法为()。

A. 药物脱敏

B. 牙髓治疗

C. 牙周洁治治疗

D. 直接充填治疗

E. 垫底后充填治疗

【答案】E

涉及图片：

23. 对于不明显的牙隐裂可用何种方法加以诊断()。

A. 探针

B. 电活力计

C. 染色剂染色

D. 叩诊

E. 薄蜡片咬诊

【答案】C

涉及图片：

24. 由创伤性[牙合.gif]造成的隐裂在治疗时应首选()。

- A. 开髓失活
- B. 全冠修复
- C. 备洞充填
- D. 降低咬合
- E. 拔除患牙

【答案】D

涉及图片:

牙合.gif:



25. 患者，男，25岁，因上前牙有黄黑斑块要求治疗。检查：双侧上前牙唇面有黄褐色斑块，无缺损，表面光滑，质硬，探（-），叩（-），无松动，冷测反应正常，诉当地乡亲中亦有相似情况。最可能的诊断是()。

- A. 浅龋
- B. 四环素牙
- C. 静止龋
- D. 釉质发育不全
- E. 氟牙症

【答案】E

【解析】题干的信息：患者上前牙唇面有黄褐色斑块，表面光滑，质硬，探诊、叩诊及冷测反应均正常，当地居住者也有相似情况，很可能是高氟区，氟牙症中有关临床表现符合上述特点，因此正确答案选择应为E。

涉及图片:

26. 患者，女，19岁，要求美容牙齿，无自觉症状，幼儿时常患病。检查：14，15，17,24,25,27，34，35，37，44，45，47牙尖缺损，患牙对称，探（-），叩（-），松（-），冷测反应正常。医生诊断为釉质发育不全，推测其导致病变的致病因素发生在()。

- A. 1岁左右
- B. 2岁左右
- C. 3岁左右
- D. 4岁左右
- E. 5岁左右

【答案】C

【解析】由于釉质发育不全是同一时期的釉质形成或矿化出现障碍所导致的，前磨牙的釉质在2岁左右开始形成，而第二磨牙的釉质在3岁左右开始形成，所以引起该病变的致病因素应该发生在3岁左右，因此正确答案选择应为C。

涉及图片:

27. 患者，男，70岁，诉左上后牙咀嚼时敏感症状。检查：左上6咬合面磨耗严重，探诊敏感，叩(-)，无松动，冷测一过性敏感，诊断为()。

- A. 深龋
- B. 中龋
- C. 牙本质过敏症
- D. 逆行性牙髓炎
- E. 可复性牙髓炎

【答案】C

涉及图片：

28. 患者，19岁，上前牙外伤脱落10分钟，患者将脱落牙含于舌下，到院要求治疗。查：左上1完全脱位，右上1和左上2牙冠完整，叩(-)，松(-)，该脱落患牙应如何处理()。

- A. 脱落牙牙髓治疗后，复位再植固定
- B. 局麻下复位，再结扎固定4周。定期观察
- C. 立即再植固定，应在3~4周后再作根管治疗
- D. 嘱患者伤愈后修复
- E. 立即修复

【答案】C

【解析】从题干的信息中，患者仅19岁，上前牙外伤脱落10分钟，并含于口内，在半小时内即到院治疗。为该牙再植固定提供了最佳时机。同时因为这类牙再植后，牙髓势必坏死，从而引起炎性的牙根吸收或根尖周病变。若先治疗再再植固定，延长了体外时间，易导致牙根吸收。一般人牙再植后3~4周，松动度减少，而炎性吸收又正好于此时开始。故再植后3~4周作根管治疗是最好时期。故该题正确的答案是C。

涉及图片：

29. 牙未萌出前引起牙内源性着色的主要原因是()。

- A. 造血系统疾病
- B. 肝疾病
- C. 严重营养障碍或母婴疾病
- D. 釉质发育不全
- E. 以上均是

【答案】E

涉及图片：

30. 多生牙常发生在()。

- A. 下中切牙之间

- B. 上中切牙之间
- C. 下颌前磨牙之间
- D. 上颌侧切牙远中
- E. 第三磨牙远中

【答案】B

涉及图片:

31. 什么时期居住在高氟区可患氟牙症()。

- A. 7岁之前
- B. 7~12岁
- C. 12~15岁
- D. 15岁之前
- E. 任何年龄

【答案】A

【解析】氟主要损害牙釉质发育期牙胚的成釉细胞，因此，过多的氟只有在牙发育矿化期进入机体，才能发生氟牙症。若在6~7岁之前，长期居住在饮用水含氟量高的流行区，即使日后迁往他处，也不能避免以后萌出的恒牙受累，反之，如7岁以后才迁入高氟区者，则不出现氟牙症。

涉及图片:

32. 牙折按解剖部位可分为()。

- A. 冠折
- B. 根折
- C. 冠根联合折
- D. 根纵裂
- E. A+B+C

【答案】E

涉及图片:

33. 急性浆液性根尖周炎与急性化脓性根尖周炎的主要区别点是()。

- A. 患牙咬合痛
- B. 自发性、持续性钝痛
- C. 有持续性跳痛
- D. 患牙松动
- E. 叩诊疼痛明显

【答案】C

涉及图片:

34. 干髓术后发生残髓炎者应进行以下哪种治疗()。

- A. 除去充填物重新失活后再行干髓术
- B. 拔除患牙
- C. 除去充填物, 进行根管治疗或牙髓塑化疗法
- D. 不除去充填物, 只使用药物消炎
- E. 除去充填物开放, 服用止痛药物、症状消失后重新充填

【答案】C

涉及图片:

35. 牙周-牙髓联合病变治疗的原则是()。

- A. 尽量查清病源, 确定治疗的主次
- B. 一般来说, 死髓牙先作牙髓治疗, 配合一般牙周治疗
- C. 逆行性牙髓炎, 如牙周病变十分严重, 不易彻底控制炎症, 可直接拔除
- D. 对牙周袋深而牙髓活力迟钝的牙, 不宜过于保守, 应同时作牙髓治疗, 以利于牙周病变的愈合
- E. 以上都对

【答案】E

涉及图片:

36. 为将塑化液导入充满根管, 操作上应注意()。

- A. 将塑化液反复导入、吸出3~4次
- B. 导入器械提插震荡
- C. 导入器械必须进入根管的根尖1/3处
- D. 隔离口水, 干燥髓腔
- E. 以上都应注意

【答案】E

涉及图片:

37. 以下哪项是常用的临床检查()。

- A. 牙髓活力电测验

- B. 牙髓活力温度测验
- C. 咬诊
- D. 染色法
- E. 以上都是

【答案】E

【解析】熟练掌握常用的临床检查才能更好地诊治常见牙体牙髓根尖周病。

涉及图片:

38. 对牙髓活力温度测验说法错误的是()。

- A. 牙髓活力温度测验是根据患牙对冷或者热刺激的反应来检查牙髓状态的一种方法
- B. 低于10℃为冷刺激
- C. 高于60℃为热刺激
- D. 原理是突然、明显的温度变化可诱发牙髓一定程度的反应或疼痛
- E. 正常牙髓对温度测验表现为无酸痛感

【答案】E

【解析】正常牙髓在牙髓活力温度测试时出现短暂的轻中度不适或疼痛。产生疼痛但刺激去除后疼痛即刻消失，表明可复性牙髓炎的存在。疼痛反应在去除刺激后仍持续一定时间，表示牙髓存在不可复性炎症。

涉及图片:

39. 关于牙髓活力电测验错误的是()。

- A. 用于判断牙髓是否有炎症
- B. 用于判断牙髓是死髓还是活髓
- C. 禁用于心脏安装起搏器的患者
- D. 根管内过度钙化的牙可能无反应
- E. 根尖未发育完全的牙齿可能无反应

【答案】A

【解析】牙髓活力电测试仪用于判断牙髓是否有活力，不能判断牙髓是否有炎症。牙髓温度测试可根据被测牙的反应初步判断牙髓是否有炎症。

涉及图片:

40. 根管预备的原则是()。

- A. 无痛，无菌，不超出根尖孔
- B. 保持根管原有的解剖形态
- C. 冠1/3充分敞开，根尖形成根充挡
- D. 准确掌握工作长度

E. 以上都是

【答案】E

【解析】根管预备时严格遵守基本原则，形成良好的根管形态，去尽感染物质，同时为良好的根充打基础，控制在工作长度内，减少对根尖区组织的刺激，促进其愈合。

涉及图片：

41. 关于根管工作长度，错误的是()。

- A. 是从切缘或牙尖的标记点到根尖牙本质牙骨质界的距离
- B. 根管的工作长度与牙齿的实际长度一样
- C. 测量方法常用的有X线法，手感法，根管长度电测法
- D. 根管预备与充填要控制在根管工作长度之内
- E. 根管工作长度一般距离根尖0.5~1mm

【答案】B

【解析】根管预备的终止点应该在牙本质牙骨质界的组织学根尖孔，是牙髓与牙周组织的分界，也是根管最狭窄处，通常距离解剖学根尖孔约1mm，与牙齿的实际长度不一致，特别是老年患牙或者根尖孔开口在牙根侧方的患牙。

涉及图片：

42. 根管预备和消毒后根管充填的时机()。

- A. 没有明显自觉症状
- B. 没有明显叩痛
- C. 无严重气味
- D. 无大量渗出及急性根尖周炎症状
- E. 以上都是

【答案】E

【解析】根管适当消毒后，并不需要等症状全部消失后根充，因为反复封药消毒药物刺激可导致效果不佳。严密充填根管后轻微的症状可逐渐消除，根尖周病可逐渐愈合。但是明显的症状及渗出要先控制。

涉及图片：

43. 根管治疗中初尖锉是指()。

- A. 既能深入根管达到解剖根尖孔又稍有摩擦感的锉
- B. 能够到达生理根尖孔的锉
- C. 比主尖锉小三号的锉
- D. 能够到达解剖性根尖孔的锉
- E. 深入根管达到牙本质牙骨质界，又稍有摩擦感的第一支锉

【答案】E

涉及图片:

44. 不属于根管冲洗药物的是()。

- A. 15%EDTA
- B. 30%过氧化氢溶液
- C. 5.25%次氯酸钠
- D. 2%氯胺-T
- E. 生理盐水

【答案】B

【解析】临床上常用的根管冲洗液有2.5%~5.25%的次氯酸钠、3%的过氧化氢、生理盐水、螯合剂(常用的有15%的EDTA)以及2%的氯亚明。

涉及图片:

45. 根管长度测量时, 根管长度电测仪无法准确获得根管长度的原因包括()。

- A. 根管内大量渗出液
- B. 根管侧穿或牙根折裂
- C. 根管内残髓
- D. 测量时隔湿不当
- E. 以上均是

【答案】E

【解析】用电子仪器测量根管工作长度, 在下列情况下不准确或容易发生误差: 有坏死组织碎片、髓腔内有金属充填物、有髓石或异物、根尖尚未形成、意外穿孔、根管内过于潮湿如有多量脓血、唾液或冲洗液等。

涉及图片:

46. 以下哪一项关于逐步深入法的描述是错误的()。

- A. 从根管的冠方到根尖方向无压力地进行根管器械操作, 可减少根管内感染物质被挤出根尖孔的危险
- B. 较少发生术后反应
- C. 减少器械回复力
- D. 确定工作长度后再预备根管冠方部分
- E. 可减少预备弯曲根管时形成台阶的几率

【答案】D

涉及图片:

47. 手机灭菌的最佳方法是()。

- A. 化学消毒剂擦拭
- B. 酒精浸泡
- C. 戊二醛浸泡
- D. 紫外线照射
- E. 压力蒸气灭菌

【答案】E

【解析】手机最佳的灭菌方法是经过压力蒸气灭菌处理，用化学消毒剂擦拭手机难以达到灭菌的目的，紫外线照射主要用于诊室的空气消毒，化学浸泡消毒目前已较少采用。

涉及图片：

48. 患者，男，20岁，左下后牙近年来常嵌塞食物疼痛，遇冷热酸甜刺激时敏感但无自发痛，检查时发现左下六颌面深龋，探洞底敏感，无叩痛，治疗前应当判明主要的问题是()。

- A. 龋洞的大小
- B. 龋坏组织的多少
- C. 龋洞的位置
- D. 腐质颜色的深浅
- E. 牙本质-牙髓复合体的反应

【答案】E

涉及图片：

49. 患者左上第一磨牙近中龋深近髓，无自发痛。冷测正常，叩(-)，治疗方法是()。

- A. 安抚治疗
- B. 干髓治疗
- C. 塑化治疗
- D. 垫底充填
- E. 活髓切断

【答案】D

【解析】该龋深患牙无任何牙髓症状，可直接垫底充填。

涉及图片：

50. 患者，26岁，左下后牙咬物痛伴冷热刺激敏感1年。检查：左下第一前磨牙远中龋洞，探及大量腐质，探诊酸痛感明显，未探及穿髓孔，叩(-)，松动(-)、冷测出现一过性敏感。拟采取的治疗措施为()。

- A. 塑化治疗
- B. 活髓切断术
- C. 根管治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987062052136006033>