

# 2024 年儿科专科医师主治及诊断知识考 试题与答案

## 一、选择题

1. 新生儿呕吐的常见原因不包括（）。

- A. 食管闭锁
- B. 胃旋转不良
- C. 呕吐羊水
- D. 肠套叠。
- E. 巨结肠

**正确答案：D**

2. 新生儿高胆红素血症，可导致（）

- A. 颅内出血
- B. 颅内感染
- C. 核黄疸
- D. 败血症
- E. 支气管肺炎

**正确答案：C**

3. 关于新生儿呼吸窘迫综合征病因的描述不正确的是

- A、早产
- B、孕妇患糖尿病
- C、产前出血
- D、围生期窒息
- E、分娩过程中的挤压

**正确答案：E**

4. 患儿女，10岁。体型矮小，缺乏第二性征，乳房不发育，胸宽，双乳头相距较远，轻微智能障碍，伴有颈蹼、颈短，下颌小，腭弓高，临床拟诊为先天性卵巢发育不全综合征以下最具有诊断价值的是

- A、体型矮小
- B、性发育幼稚型
- C、染色体核型分析
- D、尿中雌激素减少
- E、原发性闭经

**正确答案：C**

5. 下列关于新生儿寒冷损伤综合征的说法，正确的是

- A、早产儿体表面积相对较大、皮下脂肪少、皮肤薄、

容易失热

B、骨骼肌是寒冷时产热的主要物质

C、该病仅发生于寒冷地区

D、足月儿体温调节中枢完善，不容易发生寒冷损伤综合征

E、皮下饱和脂肪酸含量低，其熔点高，低体温时容易凝固而出现皮肤硬肿

**正确答案：A**

6. 儿童慢性胃炎炎症程度的区分根据是

A、固有膜有无中性粒细胞的浸润

B、有无腺体的萎缩

C、胃镜下改变

D、炎症累及胃黏膜的深浅

E、固有膜炎症细胞浸润的数量

**正确答案：D**

7. 小儿急性上呼吸道感染的主要病原是（）

A、细菌

B、病毒

C、原虫

- D、真菌
- E、混合感染

**正确答案：B**

8. 小儿上感的最重要的防治措施是（）

- A、经常户外活动
- B、经常开窗通风
- C、提倡母乳喂养
- D、合理使用抗菌素
- E、对症处理

**正确答案：D**

9. 新生儿高胆红素血症，可导致（）

- A. 颅内出血
- B. 颅内感染
- C. 核黄疸
- D. 败血症
- E. 支气管肺炎

**正确答案：C**

10. 关于新生儿坏死性小肠结肠炎的发病，下面哪项不正确？（）

- A. 足月儿发病多
- B. 低体重儿发病多
- C. 早产儿发病多。
- D. 窒息新生儿多
- E. 高渗乳汁喂养儿多

**正确答案：A**

11、5 月婴儿, 体重 6kg, 人工喂养时每日需含糖 8%的牛奶约

- A: 550ml
- B: 600ml
- C: 660ml
- D: 500ml
- E: 700ml

**正确答案：B**

12、4 岁患儿, 发热伴皮疹 2 天, 皮疹瘙痒明显。查体: 一般情况尚好, 心肺无明显异常, 头面部、躯干见散在斑疹、丘疹、疱疹及结痂, 口腔黏膜见散在疱疹。该患儿最可能的诊断是

- A: 水痘

- B: 麻疹
- C: 风疹
- D: 急性荨麻疹
- E: 猩红热

**正确答案: A**

13、患儿,女,1岁。冬季发病,出现腹泻,水样大便,无腥臭味,每日7~8次。大便常规检查未见异常。患儿最可能出现的酸碱平衡紊乱是

- A: 混合型酸中毒
- B: 代谢性酸中毒
- C: 呼吸性酸中毒
- D: 代谢性碱中毒
- E: 呼吸性碱中毒

**正确答案: B**

14、小儿腹泻的治疗原则,错误的是

- A: 调整饮食
- B: 应用红霉素
- C: 纠正脱水
- D: 纠正电解质紊乱

E: 合理用药

**正确答案: B**

15、女孩, 4 岁。反复呕吐 3 天, 突发抽搐 1 次, 食欲差, 精神萎靡。肾病综合征病史半年余, 长期低盐饮食。其最可能合并

A: 低钠血症

B: 低钙血症

C: 颅内感染

D: 脑血栓形成

E: 肾静脉血栓

**正确答案: A**

16、维生素 D 缺乏性佝偻病活动期的主要表现为

A: 肌肉松弛

B: 语言发育迟缓

C: 骨骼系统的改变

D: 低热、盗汗

E: 突然惊厥或喉痉挛

**正确答案: C**

17. 出生 26 天男婴。不明原因的反复惊厥发作 3 次。首

选的止惊药物是（）

- A、地西洋
- B、苯巴比妥
- C、苯妥英钠
- D、异丙嗪
- E、硫喷妥钠

**正确答案：B**

18、 新生儿生理性黄疸的特点有哪些？（）

- A、黄疸在生后 24 小时内出现
- B、血清胆红素大于 12mg/dl
- C、肝脾肿大
- D、粪颜色由浅黄转白
- E、足月儿的黄疸在生后 10-14 天内消退，早产儿可于生后 3 周消退

**正确答案：E**

19、1 岁婴儿，面色苍黄，毛发稀疏，易怒少哭。查体：体温正常，神清，不会扶站，四肢抖动，踝阵挛，巴氏征(+)。该患儿的诊断可能是

- A：癫痫小发作



B: 巨幼细胞性贫血

C: 病毒性脑膜炎

D: 多动症

E: 先天愚型

**正确答案: B**

20. 下部量代表下肢长骨的发育, 其与上部量相等的年龄是: ( )

A、2 岁

B、3 岁

C、6 岁

D、12 岁

E、14 岁

**正确答案: D**

21. 男, 10 岁。发热 10 天, 体温  $38\sim 41^{\circ}\text{C}$ , 刺激性咳嗽明显, 胸痛。查体: 双肺散在干啰音。胸片: 左肺下野淡薄片状阴影。首选的药物治疗为

A: 无环鸟苷

B: 青霉素

C: 头孢菌素

D: 链霉素

E: 阿奇霉素

**正确答案: E**

22、女, 2 岁。自幼牛乳喂养, 未按要求添加辅食, 有时腹泻, 逐渐消瘦。体检: 身高 80cm, 体重 7000g, 皮下脂肪减少, 苍白, 肌张力明显减低, 肌肉松弛, 脉搏缓慢, 心音较低钝。此患儿目前最可能的主要诊断是

A: 婴幼儿腹泻

B: 营养不良

C: 营养性缺铁性贫血

D: 先天性甲状腺功能减低症

E: 心功能不全

**正确答案: B**

23、判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是

A: 白细胞高低

B: 呼吸频率

C: 有无累及其它系统

D: 胸片显示程度

E: 感染菌群

**正确答案：C**

24、患儿,3岁,近1年多哭甚时出现青紫。查体:心前区隆起,胸骨左缘第3~4肋间可闻及IV级收缩期杂音,可触及震颤。X线检查示:左右心室及左房增大,肺血管影增多,肺动脉段凸出。此患儿如决定手术必须做的检查是

- A: 心电图
- B: 超声心动图
- C: 心功能检查
- D: 磁共振成像
- E: 心导管检查

**正确答案：B**

25、婴儿期持续性青紫,见于

- A: 房间隔缺损
- B: 肺动脉狭窄
- C: 法洛四联症
- D: 动脉导管未闭
- E: 室间隔缺损

**正确答案：C**

26、新生儿期是指从出生断脐至足

A: 18 天

B: 40 天

C: 28 天

D: 7 天

E: 30 天

**正确答案: C**

27、1 个月婴儿, 冬季出生, 母乳喂养, 为预防佝偻病的发生, 最好的办法是

A: 母亲摄入富含维生素 D 的食物

B: 婴儿每日肌注维生素 D30 万 IU

C: 婴儿每日补充维生素 D400IU

D: 婴儿每日补充维生素 D1 万 IU

E: 母亲摄入富含钙、磷的食物

**正确答案: C**

28、诊断小儿肾病综合征的必备条件是

A: 明显水肿及大量蛋白尿

B: 明显水肿及高脂血症

C: 大量蛋白尿及高脂血症

D: 明显水肿及低蛋白血症

E: 大量蛋白尿及低蛋白血症

正确答案: E

29、男, 3 岁。腹泻 4 天, 加重 2 天, 稀水样便, 每天 10 余次, 尿量减少。体检: 眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 脉搏可扪及。查血钠  $135\text{mmol/L}$ 。其腹泻脱水的程度与性质应是

A: 中度等渗性

B: 重度低渗性

C: 轻度低渗性

D: 中度高渗性

E: 轻度等渗性

正确答案: A

30、婴幼儿时期, 外界刺激不易在大脑皮层造成明确兴奋灶的原因是

A: 树突, 轴突少

B: 神经元少

C: 神经元体积小

D: 树突、轴突短

E: 神经髓鞘形成和发育不完善

正确答案: E

31、8个月婴儿,于11月8日因呕吐、水样泻、发热、流涕2天人院。大便镜检白细胞1~3/HP,可见脂肪滴,大便pH偏酸性。可能的病原体是

- A: 致病性大肠杆菌
- B: 霉菌
- C: 腺病毒
- D: 金黄色葡萄球菌
- E: 轮状病毒

**正确答案: E**

32、病毒性脑膜炎脑脊液的特点是

- A: 白细胞数 $<10 \times 10^6/L$ ,糖量正常,氯化物正常,蛋白量降低
- B: 白细胞数 $>10 \times 10^6/L$ ,糖量减少,氯化物稍降低,蛋白量降低
- C: 白细胞数 $50 \sim 200 \times 10^6/L$ ,糖量减少,氯化物下降,蛋白量增多
- D: 白细胞数 $50 \sim 200$
- E: 白细胞数 $<10 \times 10^6/L$ ,糖量正常,氯化物降低,蛋白量增多

**正确答案：D**

33、10 个月，女婴。因面色不好就医。查 Hb110g/L，为明确该婴是否有体内贮铁减少，最重要的实验室检查是

- A: 血清叶酸量测定
- B: 血清铁测定
- C: 总铁结合力测定
- D: 铁蛋白测定
- E: 转铁蛋白饱和度测定

**正确答案：D**

34、男，2 岁。偏食，不喜欢吃鱼、肉、蛋和蔬菜，喜欢啃泥土，常患口腔炎。实验室检查：Hb90g/L，血涂片示红细胞大小不等，小细胞为多。该患者患病的主要病因是

- A: 铁消耗过多
- B: 先天储铁不足
- C: 铁摄入不足
- D: 红细胞破坏增加
- E: 生长发育快

**正确答案：C**

35、恒牙骨化开始的年龄是

- A: 1 岁
- B: 3 岁
- C: 4 岁
- D: 新生儿
- E: 2 岁

**正确答案: D**

36、女孩, 9 岁, 水肿 1 个月。查体: BP135/95mmHg, 颜面和四肢明显水肿。实验室检查: 尿蛋白(++++) , 24 小时尿蛋白定量 2.5g, 血浆白蛋白 28g/L, 尿素氮 10mmol/L, 血补体 C30.65g/L。该患儿最可能的诊断是

- A: 急进性肾小球肾炎
- B: 迁延性肾小球肾炎
- C: 肾炎型肾病综合征
- D: 单纯型肾病综合征
- E: 急性肾小球肾炎

**正确答案: C**

37、小儿咳嗽变异型哮喘的诊断依据是

- A: 临床有明显感染征象
- B: 用支气管扩张剂可使咳嗽发作缓解



- C: 低热 3 周以上
- D: 以往有呛咳病史
- E: 镇静剂可缓解病情

**正确答案: B**

38、男孩, 1.5 岁, 半岁后发现尿有怪臭味, 1 岁时发现智力较同龄儿童低, 尿有霉臭味, 近 1 个月经常抽搐发作。体检: 表情呆滞, 毛发棕黄, 面部湿疹, 皮肤白皙。最可能的诊断

- A: 21-三体综合征
- B: 呆小病
- C: 佝偻病性手足抽搐症
- D: 苯丙酮尿症
- E: 癫痫

**正确答案: D**

39、提示结核性脑膜炎进入晚期的临床表现是

- A: 性格改变
- B: 昏迷、频繁惊厥
- C: 肢体瘫痪或偏瘫
- D: 脑膜刺激征
- E: 颅神经障碍

**正确答案：B**

40. 幼儿急疹的病原是（）

A、幼儿急疹病毒

B、肠道病毒

C、风疹病毒

D、人疱疹病毒 6 型

E、乙型溶血性链球菌

**正确答案：D**

41. 女, 2 岁。智能落后, 表情呆滞, 眼距宽, 眼裂小, 鼻梁低, 口半张, 舌伸出口外, 皮肤细嫩, 肌张力低下, 右侧通贯手。此患儿最可能的诊断是

A: 唐氏综合征 21-三体综合征

B: 苯丙酮尿症

C: 先天性甲状腺功能减低症

D: 软骨发育不良

E: 维生素 D 缺乏病

**正确答案：A**

42. 百白破混合制剂预防免疫接种的计划是

A: 3 个月、4 个月、5 个月接种

- B: 8 个月接种
- C: 2 个月、3 个月、4 个月接种
- D: 出生时、1 个月、6 个月接种
- E: 出生时接种

**正确答案: A**

43、临床上出现差异性青紫的先天性心脏病是

- A: 完全性大动脉转位
- B: 房间隔缺损
- C: 法洛四联症
- D: 动脉导管未闭
- E: 室间隔缺损

**正确答案: D**

44、7 个月患儿, 发热 3 天, 体温  $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。流涕, 轻咳。查体: 一般情况好, 除咽部充血外, 未见其他异常, 一直服用中药治疗。今日热退, 因皮肤出现红色斑丘疹而就诊。最可能的诊断是

- A: 水痘
- B: 风疹
- C: 幼儿急疹

D: 麻疹

E: 猩红热

**正确答案: C**

45、足月儿皮肤外观的特点是

A: 皮肤发亮

B: 皮下脂肪少

C: 肤色红润

D: 皮肤水肿

E: 皮肤毳毛多

**正确答案: C**

46、小儿腹痛的治疗原则，哪项不正确？（）

A、尽早确诊

B、病因治疗

C、诊断未明可给镇痛剂

D、留观静脉补液

E、必要时转外科处理

**正确答案: C**

47、婴幼儿哮喘最基本的治疗方法是应用

- A: 局部糖皮质激素
- B: 细胞膜稳定剂
- C: 全身糖皮质激素
- D:  $\beta$  肾上腺能受体激动剂
- E: 茶碱类药物

**正确答案: A**

48、采用吲哚美辛治疗动脉导管未闭的最佳年龄段是

- A: 新生儿期
- B: 学龄前期
- C: 青春期
- D: 幼儿期
- E: 学龄期

**正确答案: A**

49、最易并发维生素 A 缺乏症的疾病是

- A: 幼儿急诊
- B: 麻疹
- C: 川崎病
- D: 风疹

E: 咽结合膜热

**正确答案: B**

50、女,4岁。因心悸、多汗入院。体检:消瘦、气急、水冲脉,心率 120 次/分,胸骨左缘第二肋间闻及粗糙的连续性机械样杂音,肺动脉瓣第二心音亢进。最可能的诊断是

A: 室间隔缺损

B: 房间隔缺损

C: 法洛四联症

D: 肺动脉瓣狭窄

E: 动脉导管未闭

**正确答案: E**

51. 外科腹痛的临床特点,最主要的是 ( )

A、起病急病程短

B、先腹痛后发热

C、腹痛剧烈、固定

D、腹部有固定压痛、肌紧张

E、保守治疗无效

**正确答案: D**

52、5个月婴儿,人工喂养。平时易惊,多汗,睡眠少。近

3 日咳嗽、低热。今晨突然双眼凝视,手足抽动。查体:枕后有乒乓球感。该患儿最可能的诊断是

- A: 癫痫发作
- B: 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- C: 营养不良
- D: 脑膜炎
- E: 低血糖症

**正确答案: B**

53、不属于川崎病诊断标准的是

- A: 化脓性眼结合膜炎
- B: 草莓舌
- C: 手足硬性水肿
- D: 颈淋巴结肿大
- E: 多形性红斑

**正确答案: A**

54、小儿扁桃体发育的高峰年龄段是

- A: 1~2 岁
- B: 4~10 岁
- C: 10~14 岁

D: 3~6 个月

E: 2~4 岁

**正确答案: B**

55、3 岁, 女孩。反复咳嗽 6 个月。查体: 体温正常, 浅表淋巴结(-), 咽(-), 两肺多哮鸣音, 无水泡音。反复抗生素治疗不愈, 以往无呛咳病史, 有变态反应性鼻炎。如病情恶化, 呼吸音减弱, 应紧急采用

A: 机械通气

B: 头部冰枕

C: 水合氯醛灌肠

D: 纯氧吸入

E: 胸外按摩

**正确答案: A**

56、男, 4 岁, 因怀疑先天性心脏病就诊。该患儿口唇黏膜青紫, 轻度杵状指(趾), 胸骨左缘 2~4 肋间听到 2~3 级收缩期杂音, 肺动脉瓣第二心音减弱, 2 个月后患儿出现发热伴咽痛, 2 周后出现头痛。右侧巴氏征(+), WBC $18 \sim 109/L$ , 中性 0.86, 淋巴 0.14。并发症治愈后, 进一步治疗的方法为

A: 预防外伤

B: 口服维生素



- C: 应用激素
- D: 长期抗生素预防感染
- E: 施行心脏手术

**正确答案: E**

57、女婴, 8 个月。水样便 3 天, 10 余次/日, 呕吐 3~4 次/日, 尿量减少。查体: 体重 8kg, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 四肢尚暖, 血钠 125mmol/L。该患儿最可能的诊断是

- A: 轻度低渗性脱水
- B: 中度低渗性脱水
- C: 重度低渗性脱水
- D: 中度等渗性脱水
- E: 轻度等渗性脱水

**正确答案: B**

58、男孩, 3 岁。发热伴咳喘 2 天, 加重 1 天。查体: T39℃, P120 次/分, R46 次/分。咽部充血, 双侧扁桃体 II 度肿大, 充血明显。听诊背部两侧下方可闻及固定的中、细湿啰音, 心律齐, 未闻及杂音。腹平软, 肝右肋下 1.6cm, 脾未触及。如果在病程中患儿病情加重, 胸部 X 线示: 肋膈角变钝, 肺部可见薄壁空洞。最可能的病原体是

- A: 呼吸道合胞病毒

B: 金黄色葡萄球菌

C: 肺炎链球菌

D: 腺病毒

E: 流感嗜血杆菌

**正确答案: B**

59、10个月男孩,诊断为“化脓性脑膜炎”,经有效抗生素治疗10天,病情好转,体温正常。近3天又出现发烧、抽搐、前囟饱满,颅缝分离。首先考虑到

A: 脑性低钠血症

B: 脑积水

C: 硬脑膜下积液

D: 脑水肿

E: 脑室管膜炎

**正确答案: C**

60、男,6岁。身高80cm,智能落后,仅能数1~20个数。体检:皮肤粗糙,眼距宽,鼻梁宽平,舌宽厚,常伸出口外,毛发枯干,发际低。骨龄摄片仅有4枚骨化核。患儿确诊后治疗应选用

A: 脑活素、脑复康

- B: 生长激素
- C: 甲状腺素
- D: 低苯丙氨酸饮食
- E: 低铜饮食

**正确答案: C**

61. 8月男孩呕吐腹泻3天，大便蛋花汤样，一日10余次，尿极少，哭无泪，肛温38.5。嗜睡，前囟深凹，口唇樱红色，心音低钝，腹胀，皮肤弹性极差，肢冷，最正确的处理是（）

- A、喂母乳，停辅食
- B、大便镜检培养
- C、口服补液盐
- D、口服抗生素
- E、转送上级医院

**正确答案: E**

62、胚胎期第5月的重要造血器官

- A: 肝脾
- B: 胆囊
- C: 骨髓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988002003046006035>