

2023-24 年湖南省双牌县《执业药师之西药专业二》考试必刷 200 题题库附答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）易发生持续性干咳不良反应的药品是

- A: 福辛普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

答案：A

2. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 特布他林
- B: 丙卡特罗
- C: 沙美特罗
- D: 福莫特罗

答案：D

3. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 紫杉醇
- D: 来曲唑

答案：D

4. 弥散性血管内凝血早期可选用 ()

- A: 肝素
- B: 尿激酶
- C: 维生素 K
- D: 叶酸

答案：A

5. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 红霉素眼膏
- B: 氯霉素眼膏
- C: 左氧氟沙星滴眼剂
- D: 阿托品滴眼剂

答案：C

6. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 对慢性渗血效果较差
- B: 低剂量抑制纤溶酶原的活化作用
- C: 高剂量直接抑制纤溶酶的蛋白溶解酶活性
- D: 口服或静脉给药起效较快

答案：A

7. （2016 年真题）抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应 ()

- A: 急性肝衰竭
- B: 肺部纹理加重
- C: 胰腺坏死
- D: 急性肾衰竭

答案：D

8. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋达帕胺

答案：A

9. 可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 鲨肝醇
- D: 碘及碘化物

答案：A

10. 氟喹诺酮类

- A: 禁用于早产儿、新生儿
- B: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于胆道阻塞患者

答案：B

11. 中度致吐级别的化疗药有

- A: 顺铂

- B: 卡铂
- C: 甲氨蝶呤
- D: 依托泊苷

答案：B

12. 多黏菌素 B 的抗菌机制是

- A: 影响胞浆膜的通透性
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响叶酸代谢

答案：A

13. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 眼周局部刺激
- B: 皮肤色素沉着
- C: 红斑
- D: 肝脏氨基转移酶 AST 降低

答案：D

14. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 罗红霉素

答案：B

15. 毛果芸香碱对眼的作用是

- A: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

B: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

C: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

D: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

答案：C

16. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

A: 雷尼替丁

B: 氢氧化铝

C: 甲氧氯普胺

D: 哌仑西平

答案：A

17. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg，化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT

A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

18. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

A: S 期

B: M 期

C: G

D: G

答案：B

19. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A: 是广谱抗心律失常药
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 在肝中代谢
- D: 脂溶性高，口服、静脉注射均可

答案：B

20. 合并重度感染的糖尿病应使用()

- A: 正规胰岛素
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 那格列奈

答案：A

21. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是()

- A: 泼尼松片 20mgqd
- B: 泼尼松片 30mgqd
- C: 地塞米松片 10mgqd
- D: 泼尼松片 50mgqd

答案：D

22. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克拉霉素

答案: C

23. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

A: 奥沙利铂

B: 环磷酰胺

C: 塞替派

D: 丝裂霉素

答案: B

24. 氯霉素的抗菌作用原理是

A: 抑制 DNA 回旋酶

B: 抑制蛋白质合成

C: 干扰叶酸合成

D: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长

答案: B

25. 一 60 岁男性患者呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森症，但患者同时又患有青光眼，所以该患者不要用

A: 溴隐亭

B: 卡比多巴

C: 培高利特

D: 左旋多巴

答案: A

26. 用于治疗疥疮的药物有()

- A: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- B: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- C: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏
- D: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

答案: D

27. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

- A: 阿昔莫司
- B: 阿托伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案: C

28. 婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

- A: 2 周
- B: 5~7 天
- C: 3 天
- D: 3~5 天

答案: B

29. 血肌酐升至

- A: 大于 $7\text{ }\mu\text{mol/L}$
- B: 大于 6mmol/L
- C: 大于 $172\text{ }\mu\text{mol/L}$
- D: 大于 $265\text{ }\mu\text{mol/L}$

答案: D

30. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

- A: 可的松
- B: 泼尼松龙
- C: 泼尼松
- D: 氟替卡松

答案：B

31. 利福平对多种革兰阳性球菌，特别是()具有强大抗菌作用

- A: 大肠埃希菌
- B: 流感杆菌
- C: 耐药金黄色葡萄球菌
- D: 变形杆菌

答案：C

32. 关于艾塞那肽的描述，不正确的是

- A: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状
- B: 适用于糖尿病酮症酸中毒
- C: 可造成消化不良
- D: 应注意是否有过敏性症状

答案：B

33. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

- A: 罗格列酮
- B: 瑞格列奈
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案：A

34. 长期服用糖皮质激素不产生下列哪种副作用

- A: 满月脸
- B: 骨质疏松
- C: 溃疡或出血穿孔
- D: 高血钾

答案：D

35. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 煤焦油类
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 肾上腺皮质激素类
- D: 重金属元素及其化合物

答案：A

36. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 硫唑嘌呤
- B: 环磷酰胺
- C: 环孢素
- D: 甲泼尼龙

答案：C

37. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 哌唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 普萘洛尔
- D: 利血平

答案：D

38. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A: 四环素

B: 曲伏前列素

C: 1%碘甘油

D: 9%硼酸冰片滴耳液

答案：D

39. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：A

40. 关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

A: 外用糖皮质激素可增加感染风险

B: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

C: 治疗全身性或严重过敏疾病时,不宜合用口服抗过敏药

D: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用

答案：C

41. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 埃索美拉唑钠
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 替米沙坦
- D: 美托洛尔

答案：B

42. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 氨曲南
- B: 克拉维酸
- C: 亚胺培南
- D: 阿莫西林

答案：A

43. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

- A: 卡托普利
- B: 地高辛
- C: 哌唑嗪
- D: 氨氯地平

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

44.（2018 年真题）用于治疗疥疮的药物有（）

A: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：A

45. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

A: 阿托品

B: 毛果芸香碱

C: 比马前列素

D: 噻吗洛尔

答案：A

46. 可用于防治泌尿系统结石的是

A: 氯化钠

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案：B

47. 既有抗病毒作用又有抗肿瘤作用的免疫调节剂是

A: 干扰素

B: 更昔洛韦

C: 环磷酰胺

D: 硫唑嘌呤

答案：A

48. 一般来讲，复方己酸羟孕酮注射液的注射时间与剂量是

A: 第二次及以后于月经来潮第 5 日每月注射 1 支

B: 第二次及以后于月经来潮后 10~12 日每月注射 1 支

C: 第一次于月经来潮后 10~12 日注射 2 支

D: 第一次于月经来潮第 5 日注射 1 支

答案: B

49. ACEI 与 () 联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

A: 噻嗪类利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: 留钾利尿剂

D: 人促红素

答案: D

50. 胰岛素增敏剂是

A: 胰岛素皮下注射

B: 吡格列酮

C: 西格列汀

D: 阿卡波糖

答案: B

51. 丙烯胺类抗真菌药 ()

A: 特比萘芬

B: 两性霉素

C: 阿莫罗芬

D: 氟康唑

答案: A

52. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

- A: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡
- B: 含地芬诺酯和阿托品
- C: 为阿片受体激动剂
- D: 地芬诺酯是吗啡的衍生物

答案：D

53. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

- A: 林可霉素
- B: 哌拉西林
- C: 庆大霉素
- D: 氯霉素

答案：B

54. 控制哮喘急性发作的首选药是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: β 受体激动剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：B

55. 患者，男，30 岁有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是（）

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 西咪替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 奥美拉唑

D: 雷贝拉唑

答案: B

56. 铵属于 M 胆碱受体阻断剂的是

A: 异丙托溴

B: 乙酰胆碱

C: 福莫特罗

D: 孟鲁司特

答案: A

57. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 阿卡波糖

B: 艾塞那肽

C: 罗格列酮

D: 瑞格列奈

答案: A

58. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A: 噻吗洛尔

B: 拉坦前列素

C: 毛果芸香碱

D: 地匹福林

答案: C

59. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

A: 增强胰岛素的作用

B: 拮抗胰岛高血糖素的作用

C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

D: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解

答案：D

60. 分泌糖皮质激素的是

A: 网状带

B: 球状带

C: 束状带和网装带

D: 束状带

答案：D

61. 对肝素的正确描述是

A: 直接抑制凝血因子的活化

B: 仅在体内有抗凝作用

C: 可抑制血小板聚集

D: 可以口服给药

答案：A

62. 司来吉兰用于

A: 特发性震颤

B: 早期帕金森病

C: 慢性脑功能不全

D: 神经源性尿崩症

答案：B

63. 抑制骨髓造血功能的是

A: 青霉素

B: 左氧氟沙星

C: 氯霉素

D: 四环素

答案: C

64. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

A: 度他雄胺

B: 他达拉非

C: 坦洛新

D: 西地那非

答案: A

65. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

A: δ 受体

B: μ 2 受体

C: μ 1 受体

D: K 受体

答案: C

66. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

A: 吡喹酮

B: 三苯双脒

C: 甲硝唑

D: 乙胺嘧啶

答案: A

67. 下列情况不应首选红霉素的是()

A: 军团菌肺炎

B: 肠道痢疾杆菌感染

C: 白喉带菌者

D: 支原体肺炎

答案：B

68. 主要用于糖尿病，特别是 1 型糖尿病的治疗的药物是()

A: 磺酰脲类

B: A 和 B 均无效

C: 二甲双胍

D: 胰岛素

答案：D

69. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

A: 利拉鲁肽

B: 那格列奈

C: 阿格列汀

D: 伏格列波糖

答案：A

70. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

A: 醛固酮受体阻断剂

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

D: 袢利尿剂

答案：B

71. 用药期间应注意监测血气和酸碱平衡的是

A: 赖氨酸

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 精氨酸

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: C

72. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肝功能不全者

B: 老年人

C: 肾功能不全者

D: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者

答案: A

73. (2020 年真题) 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A: 赖诺普利

B: 吲达帕胺

C: 普萘洛尔

D: 氨氯地平

答案: C

74. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

A: 避免饥饿时注射青霉素

B: 初次使用或换批号者必须做皮肤过敏试验

C: 皮试阳性者，注射青霉素前先预备肌内注射急救药物

D: 仔细询问过敏史，对青霉素过敏者禁用

答案：C

75. 为快速杀菌药的抗菌药是()

- A: 万古霉素和林可霉素
- B: 万古霉素和替考拉宁
- C: 万古霉素和氯霉素
- D: 氯霉素和替考拉宁

答案：B

76. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 过氧乙酸溶液
- C: 苯酚溶液
- D: 高锰酸钾溶液

答案：A

77. 属于 GLP-1 受体激动剂的是()。

- A: 阿卡波糖
- B: 艾塞那肽
- C: 那格列奈
- D: 二甲双胍

答案：B

78. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 毛花苷丙静脉注射

B: 利多卡因静脉滴注

C: 硝普钠静脉滴注

D: 普罗帕酮静脉注射

答案：C

79. 可用于吗啡中毒解救的药物是

A: 氟马西尼

B: 阿托品

C: 纳洛酮

D: 苯甲酸钠咖啡因

答案：C

80. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10% 葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

A: 滴速 20~30 滴 / 分

B: 不超过 40 滴 / 分

C: 滴速 80~100 滴 / 分

D: 不超过 15 滴 / 分

答案：B

81. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A: 多巴酚丁胺

B: 地高辛

C: 米力农

D: 依那普利

答案：D

82. 甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

- A: 抗炎类药
- B: 必需磷脂类
- C: 促进代谢类药物及维生素
- D: 解毒类药

答案：A

83. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- B: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- C: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- D: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

答案：B

84. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 人促红素
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 留钾利尿药

答案：D

85. 以下哪种药物对心脏影响最轻

- A: 茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 异丙肾上腺素
- D: 肾上腺素

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/988036031051007022>