

人卫一类口腔外科学学习题（含答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、铸造 3 / 4 冠的固位力，主要依靠

- A、邻轴沟彼此平行
- B、邻面片切彼此平行
- C、舌面或牙长轴平行
- D、邻轴沟的长度和深度
- E、切缘沟的位置

正确答案：D

2、固定桥粘固后患者感到胀痛不适的原因为

- A、桥体龈端接触过紧
- B、基牙受扭力，接触点过紧
- C、粘固剂过厚
- D、咬合过高
- E、基牙负担加重

正确答案：B

3、上下颌第三磨牙口外投照片可用于观察的项目不包括

- A、第三磨牙的形态
- B、第三磨牙阻生方向
- C、儿童第三磨牙牙胚发育情况
- D、下颌下腺导管结石情况
- E、第三磨牙萌出情况

正确答案：D

4、与 2% 普鲁卡因比较，以下哪项不是 2% 利多卡因的特点

- A、有抗室性心律失常作用
- B、麻效强，起效快
- C、毒性较大，但可用作表面麻醉
- D、有较强的组织穿透性和扩散性
- E、维持时间较短

正确答案：E

5、两侧创缘厚薄不等，缝合时要

- A、薄侧缝合稍多而深些，厚侧缝合稍少并浅些
- B、厚侧进针深些
- C、作适当的附加切口

D、两侧进针取同样的厚度

E、多作埋藏缝合

正确答案：A

6、因操作不当引起断根的原因不包括

A、拔牙钳选择不当

B、钳喙安放时位置不正确

C、牙冠有广泛破坏

D、拔牙时误使用旋转力

E、拔牙时用力方向错误

正确答案：C

7、最易进入上颌窦的断根是

A、第一磨牙近中颊根、第二磨牙近中颊根

B、第二磨牙远中颊根、第二磨牙腭根

C、第一磨牙腭根、第二磨牙腭根

D、第一磨牙腭根、第二磨牙近中颊根

E、第一磨牙近中颊根、腭根

正确答案：A

8、患者因左颈部神经鞘瘤复发而出现 Horner 征，说明肿瘤可能来源于或者压迫了

A、颈交感神经

B、副神经

C、喉返神经

D、迷走神经

E、舌下神经

正确答案：A

9、患者男性，40 岁，右咽旁间隙脓肿，切开引流出大量灰白色稀薄腐臭脓液，此为何种感染所致

A、肺炎双球菌

B、变形链球菌

C、混合性感染

D、绿脓杆菌

E、大肠杆菌

正确答案：C

10、口腔颌面一般检查不包括以下哪种检查

- A、颌面部检查
- B、口腔检查
- C、咽部检查
- D、颞下颌关节检查
- E、唾液腺检查

正确答案：C

11、女性，9岁。上颌前牙出现松动10天求拔。口腔检查：右上1开始萌出，右上I滞留，松动III°。最佳麻醉方法是

- A、2%盐酸丁卡因表面麻醉
- B、眶下神经阻滞麻醉
- C、1%普鲁卡因局部浸润麻醉
- D、鼻腭神经阻滞麻醉
- E、冷冻麻醉

正确答案：A

12、颌骨成釉细胞瘤X线特征性表现描述哪项是错误的

- A、肿瘤侵入牙槽侧造成牙根间牙槽浸润及硬骨板消失
- B、肿瘤边缘有部分增生钙化
- C、瘤内钙化多见
- D、颌骨膨胀，牙根呈锯齿状吸收
- E、瘤内可含牙

正确答案：C

13、患者，男性，12岁。5岁起即开始左面颊部肿胀，发展缓慢。查见左右面部不对称，左侧肥厚，触质软，皮肤有色素沉着，左上肢、胸、背部可见大片棕褐色色素沉着，X线片示左下颌角及颞部骨质有轻度破坏。该患者最有可能的诊断是

- A、腮腺区脂肪瘤
- B、腮腺区血管瘤
- C、腮腺区淋巴管瘤
- D、腮腺区神经纤维瘤
- E、神经纤维瘤病

正确答案：E

14、患者女性4岁，先天性左侧完全性腭裂，行腭裂修复术后为了达到满意的语音效果，术后应

- A、大剂量应用抗生素

- B、局部理疗
- C、语音训练
- D、长期配戴腭护板
- E、调整饮食习惯

正确答案：C

15、一病人硬腭损伤，致口腔粘膜、硬板和鼻腔粘膜穿孔，但无明显组织缺损。应采取的处理措施是

- A、在硬腭两侧行松弛切口，从骨面翻瓣拉拢关闭瘘口
- B、在穿孔邻近转移粘骨膜封闭瘘口
- C、作口腔侧粘骨膜缝合
- D、分层缝合口腔和鼻腔侧的粘膜
- E、舌瓣修复瘘口

正确答案：D

16、女性，50岁。单侧腮腺无痛性进行性肿大6年。有内风湿性关节炎史， γ 球蛋白增高，活检有大量淋巴细胞。最可能的诊断是

- A、腮腺放线菌病
- B、舍格伦综合症
- C、腮腺多形性腺瘤
- D、慢性化脓性腮腺炎
- E、腮腺淋巴结核

正确答案：B

17、出切牙孔的神经为

- A、切牙神经
- B、腭前神经
- C、鼻腭神经
- D、上牙槽前神经
- E、眶下神经

正确答案：C

18、牙种植术的概念正确的是

- A、将自体牙植入牙槽骨内的手术
- B、将脱位牙植入牙槽骨内的手术
- C、将异物牙植入牙槽骨内的手术
- D、将未发育完成的牙胚植入牙槽骨内的手术
- E、将人工牙植入牙槽骨内的手术

正确答案：E

19、牙周间隙变窄或消失的是

- A、牙根折裂
- B、致密性骨炎
- C、牙合向脱位
- D、牙嵌入性脱位
- E、牙折

正确答案：D

20、患者男性 28 岁，因右下 8 智齿冠周炎引起咬肌间隙脓肿需切开引流，下面说法错误的是

- A、切开后应注意探查升支骨面是否正常
- B、口内引流与口外引流效果相近，口内切口更为隐蔽
- C、口外切口选择在下颌支后缘并绕过下颌角，距下颌下缘 2cm 处
- D、口内切口选择在翼下颌韧带稍外侧
- E、切开引流即可从口内进行，也可从口外进行

正确答案：B

21、2%普鲁卡因一次最大用量为

- A、50ml
- B、500ml
- C、100ml
- D、10ml
- E、200ml

正确答案：A

22、属于口腔颌面外科手术的全麻方法是

- A、吸入麻醉
- B、静脉麻醉
- C、基础麻醉
- D、复合麻醉
- E、以上方法均可应用

正确答案：E

23、不属于非麻醉性镇痛药的是

- A、哌替啶
- B、醋氨酚
- C、布洛芬

D、阿司匹林

E、吲哚美辛

正确答案：A

24、在哪种根尖周病变时，X线片上显示病变边缘形成一条致密的线条影

A、根尖周肉芽肿

B、致密性骨炎

C、慢性根尖周脓肿

D、根尖周囊肿

E、急性根尖周炎

正确答案：D

25、骨折后1~2周时为

A、血肿形成期

B、骨痂形成期

C、颌骨临床愈合期

D、血肿机化期

E、骨痂改建期

正确答案：B

26、患儿，男性，3岁，先天性腭裂以行腭裂修复术，为使术后发音和讲话接近正常，术后应

A、长期佩戴腭护板

B、局部理疗

C、早期正畸治疗

D、及早进行语音训练

E、调整饮食习惯

正确答案：D

27、前牙3/4冠切面沟唇侧壁与舌侧壁高度的比例应为

A、1:3

B、1:1

C、2:1

D、3:1

E、1:2

正确答案：C

28、下牙槽神经阻滞麻醉麻药注射处

A、翼下颌间隙内

- B、翼腭窝附近
- C、腭前孔附近
- D、上颌结节附近
- E、卵圆孔附近

正确答案：A

29、可证实关节内游离体或占位性病变的是

- A、下颌骨开口后前位
- B、许勒位
- C、曲面体层
- D、经咽侧位
- E、颞下颌关节造影

正确答案：E

30、对放射线不敏感的肿瘤

- A、上颌窦癌
- B、腺癌
- C、牙龈鳞癌
- D、舌癌
- E、唇癌

正确答案：B

31、投照鼻颏位片时，听眦线与胶片成

- A、27° 角
- B、47° 角
- C、37° 角
- D、57° 角
- E、67° 角

正确答案：B

32、金属塑料联合全冠在我国应用较广的原因主要是

- A、塑料的颜色稳定
- B、金属的机械强度优良
- C、制作简便，成本较低
- D、金属与塑料为机械性结合
- E、塑料的机械强度足够

正确答案：C

33、以下哪种检查对于确诊腮腺腺淋巴瘤帮助不大

- A、腮腺造影
- B、B 超
- C、核素扫描
- D、细针吸细胞学检查
- E、临床检查肿瘤的位置和质感

正确答案：A

34、急性智齿冠周炎伴间隙感染的治疗原则中下列哪项是错误的

- A、镇痛
- B、拔除患牙
- C、增强抵抗力
- D、消炎
- E、切开引流

正确答案：B

35、患者，男性，40 岁。发现右侧舌根部有一核桃大小质硬肿块，触浸润已过中线。右侧颌下可及 2 个肿大淋巴结，粘连。左侧未及明显肿大淋巴结。关于颈部淋巴结的处理，以下哪项最佳

- A、右侧功能性颈清扫术
- B、右侧根治性颈清扫术加左侧功能性颈清扫术
- C、双侧功能性颈清扫术
- D、右侧根治性颈清扫术
- E、双侧根治性颈清扫术

正确答案：B

36、关于咬肌间隙感染下列错误的是

- A、易形成下颌骨升支边缘性骨髓炎
- B、常因下颌智齿冠周炎引起
- C、常伴明显开口受限
- D、脓肿形成后，常在咬肌前缘触及波动感
- E、脓肿形成后应及时切开引流

正确答案：D

37、牙槽嵴形成的时间约在

- A、胚胎第 8~9 周
- B、胚胎第 5 个月
- C、胚胎第 12 周
- D、胚胎第 6 周

E、胚胎第 10 周

正确答案：A

38、患者，男性，46 岁，近 3 周来感右侧舌根、软腭及扁桃体区域阵发性剧烈疼痛，每次发作持续数秒至 1~2 分钟，吞咽、咳嗽、咀嚼均可诱发疼痛，常有夜间疼痛发作而清醒。临床检查以上部位未见明显肿胀，黏膜颜色正常，局部无溃疡。涂布表面麻醉剂于疼痛部位，可暂时阻止疼痛发作。服用卡马西平有效。最有可能的原因是

- A、舌咽神经痛
- B、蝶腭神经痛
- C、三叉神经痛
- D、鼻咽癌
- E、非典型性口炎

正确答案：A

39、眶下间隙感染可沿哪些静脉向颅内扩散

- A、面静脉
- B、内眦静脉
- C、眼静脉
- D、眶下静脉
- E、A+B+C

正确答案：E

40、诊断真性颞下颌关节强直的主要依据是

- A、小下颌畸形
- B、关节动度减低或消失
- C、张口受限
- D、关节邻近区域炎症史
- E、X 线证实关节内呈致密骨性团块影

正确答案：E

41、颌面部创口初期缝合最宽时间为

- A、伤后 48 小时甚至更久的创口，只要没有明显的化脓，清创后仍可作初期缝合
- B、6 小时
- C、48 小时
- D、24 小时
- E、12 小时

正确答案：A

42、相同浓度和剂量的局麻药，毒性最小的是

- A、普鲁卡因
- B、利多卡因
- C、地卡因
- D、布比卡因
- E、丙胺卡因

正确答案：A

43、在 X 线片上，髓室及根管影像完全消失，不能分辨出髓腔界限表示有

- A、牙髓坏死
- B、牙髓充血
- C、牙内吸收
- D、弥散性牙髓钙化
- E、牙髓炎

正确答案：D

44、颌面部复合伤伴有鼻腔、外耳道出血时，最严重的并发伤应考虑

- A、口腔出血反流至鼻腔
- B、颅底骨折脑脊液漏
- C、鼻黏膜撕裂伤
- D、鼻腔、外耳道软组织损伤
- E、鼻、耳道骨折

正确答案：B

45、关于布比卡因，哪项描述是不正确的

- A、毒性较普鲁卡因大
- B、麻醉维持时间较普鲁卡因稍短
- C、可用于局部阻滞麻醉
- D、属酰胺类麻药
- E、与肾上腺素合用，效果好

正确答案：B

46、口腔颌面部的感觉与运动功能的主要脑神经是

- A、下牙槽神经和面神经
- B、三叉神经和面神经
- C、舌神经和三叉神经

D、三叉神经和颧神经

E、舌神经和面神经

正确答案：B

47、慢性边缘性颌骨骨髓炎的手术时机常选在病程的

A、6~8 周后

B、2~4 周后

C、4~6 周后

D、1~2 圈后

E、8~10 周后

正确答案：B

48、下列药物中不用于真菌感染治疗的是

A、多粘菌素

B、二性霉素

C、克霉唑

D、酮康唑

E、制霉菌素

正确答案：A

49、关于整复手术的技术特点，哪一项是不确切的

A、尽量爱护和保存组织

B、避免锐性剥离

C、防止或减少粗大瘢痕

D、严格按照无菌操作

E、应用显微外科技术

正确答案：B

50、下唇、口角、舌尖出现麻木表示何种阻滞麻醉显效

A、颊神经、切牙神经阻滞麻醉

B、颊长神经阻滞麻醉

C、下牙槽神经阻滞麻醉

D、下颌神经阻滞麻醉

E、舌神经阻滞麻醉

正确答案：D

51、口腔颌面部患者全麻手术时。应特别注意发生

A、伤口意外出血

B、中枢神经系统意外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988110077057007002>