

2023 年执业药师之西药学专业二自我提分评估(附答案)

单选题（共 50 题）

1、 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

- A. 哌嗪
- B. 替硝唑
- C. 伯氨喹
- D. 奎宁
- E. 青蒿素

【答案】 C

2、 支原体、衣原体引起的肺炎宜选用()

- A. 氟康唑
- B. 万古霉素
- C. 克林霉素
- D. 阿奇霉素
- E. 头孢哌酮

【答案】 D

3、 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是

- A. 法莫替丁
- B. 多潘立酮
- C. 氯苯那敏
- D. 奥美拉唑

E. 莫沙必利

【答案】 B

4、 β_1 受体激动后的影响是

A. 增加心率

B. 肌肉震颤

C. 脂肪分解

D. 支气管扩张

E. 肝糖原分解

【答案】 A

5、用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A. 收缩血管，减轻炎症反应

B. 收缩血管，降低其通透性

C. 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

D. 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

E. 松弛平滑肌，减轻鼻肺反射

【答案】 C

6、可使后者疗效显著下降的是

A. 红霉素

B. 氯丙嗪

C. 维生素 C

D. 他莫昔芬

E. 多柔比星与丝裂霉素合用或配伍

【答案】 C

7、可以改善心肌缺血的是

A. 葡萄糖

B. 果糖

C. 维生素

D. 脂肪乳

E. 氨基酸

【答案】 B

8、通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是()

A. 维 A 酸

B. 过氧苯甲酰

C. 壬二酸

D. 阿达帕林

E. 异维 A 酸

【答案】 B

9、对胰岛素产生耐受者选用

A. 胰岛素

B. 格列本脲

C. 丙硫氧嘧啶

D. 二甲双胍

E. 小剂量碘剂

【答案】 B

10、患者，男，29岁。因反酸、烧心、胸骨后隐痛1个月余就诊。胃镜检查提示，反流性食管炎。最适用于该患者的药物是

A. 西咪替丁

B. 雷尼替丁

C. 奥美拉唑

D. 尼扎替丁

E. 阿托品

【答案】 C

11、可用于治疗假膜性肠炎糖肽类药物是

A. 替硝唑

B. 万古霉素

C. 克林霉素

D. 红霉素

E. 多黏菌素

【答案】 B

12、患者，女，42岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵1月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的

A. 萘普生

B. 糖皮质激素

C. 依那西普

- D. 司来吉兰
- E. 柳氮磺吡啶

【答案】 D

13、可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

- A. 过氧苯甲酰
- B. 克林霉素
- C. 阿达帕林
- D. 异维 A 酸
- E. 克罗米通

【答案】 D

14、仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 链霉素
- C. 甲硝唑
- D. 四环素
- E. 多黏菌素

【答案】 D

15、有关可乐定的叙述，错误的是

- A. 可乐定是中枢性降压药
- B. 可乐定可用于治疗中度高血压

- C. 可乐定可用于治疗重度高血压
- D. 可乐定可用于治疗高血压危象
- E. 可乐定别称氯压定

【答案】 C

16、（2020年真题）关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

- A. 适用人群为成人及 8 岁以上儿童
- B. 疗程不宜过长
- C. 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便
- D. 肠梗阻患者禁用
- E. 可用于妊娠期及哺乳期妇女

【答案】 C

17、用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

- A. 苯丙哌林
- B. 右美沙芬
- C. 可待因
- D. 地塞米松
- E. 溴己新

【答案】 A

18、对于硼酸的描述，错误的是（ ）

- A. 用于急、慢性中耳炎

- B. 滴耳；成人一次 1~2 滴，一日 3 次
- C. 作为滴耳剂的常用规格是 10ml：4g
- D. 清洗外耳道，适量擦拭外耳道，一日 3 次
- E. 滴耳剂使用时温度应接近体温

【答案】 C

19、布美他尼属于下列哪类利尿药

- A. 高效能利尿药
- B. 中效能利尿药
- C. 保钾利尿药
- D. 碳酸酐酶抑制药
- E. 渗透性利尿药

【答案】 A

20、控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A. 地西洋
- B. 硫喷妥钠
- C. 阿司匹林
- D. 氯丙嗪
- E. 洛贝林

【答案】 A

21、主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A. 苯丙酸诺龙

- B. 丙酸睾酮
- C. 复方炔诺酮
- D. 炔诺酮
- E. 炔雌醇

【答案】 C

22、抗阿米巴原虫药的药物是()。

- A. 甲硝唑
- B. 伯氨喹
- C. 奎宁
- D. 氯喹
- E. 磺胺嘧啶

【答案】 A

23、患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A. Hcy
- B. Cr
- C. CK
- D. BUN
- E. TBiL

【答案】 C

24、（2019年真题）患者，女，63岁，因心绞痛急诊就医，诊断为ST段抬高心肌梗死，血压175/95mmHg，心率110次/分，该患者适宜使用的药物是（ ）

- A. 硝普钠
- B. 美托洛尔
- C. 氨氯地平
- D. 贝那普利
- E. 氢氯噻嗪

【答案】 B

25、患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0.5g，一日3次；阿卡波糖0.1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能I级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A. 高钾血症
- B. 高钠血症
- C. 高镁血症
- D. 高尿酸血症
- E. 高氯碱血症

【答案】 D

26、可增加肝毒性的药物是

- A. β 受体阻断剂
- B. 甲氨蝶呤
- C. 利福平
- D. 阿糖胞苷

E. 头孢菌素与多柔比星合用或配伍

【答案】 C

27、丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

- A. 头痛
- B. 关节痛
- C. 胃肠道反应
- D. 粒细胞缺乏症
- E. 中毒性肝炎

【答案】 D

28、（2019年真题）服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（ ）

- A. 乙胺丁醇
- B. 吡嗪酰胺
- C. 利福平
- D. 链霉素
- E. 异烟肼

【答案】 C

29、抗炎效能最大的糖皮质激素是

- A. 甲泼尼龙
- B. 地塞米松
- C. 氢化可的松

D. 氟氢可的松

E. 泼尼松

【答案】 B

30、患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A. 骨髓功能抑制

B. 严重心脏病

C. 腰椎间盘突出

D. 妊娠及哺乳期妇女

E. 心功能不全

【答案】 C

31、左炔诺孕酮为

A. 促性腺激素释放激素类似物

B. 短效口服避孕药

C. 促性腺激素

D. 雌激素类

E. 孕激素类

【答案】 B

32、氨基酸的主要作用不包括

A. 合成蛋白质

B. 维持氮平衡

- C. 调节体内酸碱平衡
- D. 转变为糖或脂肪
- E. 参与酶、激素及部分维生素的组成

【答案】 C

33、患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T 38.9℃，P 90次/分，R 21次/分，BP 110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A. 肝功能不全者
- B. 肾功能不全者
- C. 老年人
- D. 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者
- E. 新生儿

【答案】 A

34、奎宁日剂量超过1g/d或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

- A. 双硫仑样反应
- B. 吉海反应
- C. 金鸡纳反应
- D. 锥体外系反应
- E. 神经毒性反应

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988113037053007001>