

2024 年甘肃省和政县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库带答案（B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于时间依赖性抗菌药，且抗菌作用持续时间长，评估此类药物的 PK / PD 参数主要为 $AUC_{0\sim 24} / MIC$ ，一般推荐日剂量分 2 次给药方案的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 利奈唑胺
- C: 头孢克洛
- D: 氨茶碱

答案：B

2. 患者，男，80 岁，患有高血压、2 型糖尿病和前列腺增生症，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关，复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的是

- A: 珍菊降压片（含氢氯噻嗪）
- B: 依那普利
- C: 二甲双胍
- D: 非那雄胺

答案：A

3. 导致妊娠期妇女口服药物吸收减慢，达峰时间滞后，生物利用度下降的主要原因是

- A: 妊娠时体液总量和细胞外液都有所增加

- B: 妊娠时胃酸分泌减少，胃肠活动减弱
- C: 妊娠时雌激素分泌减少，孕激素分泌增多
- D: 妊娠时胃酸分泌增多，胃肠活动增强

答案：B

4. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

5. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

- A: 网站信息
- B: 三级信息源资料
- C: 二级信息源资料
- D: 期刊论文

答案：C

6. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用短程疗法
- B: 采用间歇疗法
- C: 避免与克服细菌耐药
- D: 采用大剂量

答案：C

7. 能用结论较肯定的药物就不用新药，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物

- B: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- C: 禁止用试验性药
- D: 用药必须有明确的指征和适应证

答案：C

8. 患者,女,24 岁。一周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不适,来药店购药,药师可推荐的药物是()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：B

9. 用质量调整生命年或伤残调整生命年为衡量指标,分析患者生活质量的提升与医疗成本的关系。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：A

10. 长期服用苯妥英钠,可能导致

- A: 丙氨酸氨基转移酶升高
- B: γ -谷氨酰转移酶升高
- C: 血清碱性磷酸酶升高
- D: A/G 值低于 1

答案：B

11. 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于()

- A: 心力衰竭患者
- B: 痛风患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 双侧肾动脉狭窄患者

答案: D

12. 上市后药品再评价阶段属于

- A: II 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: IV 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案: C

13. 肝硬化患者应用利多卡因,可引起严重中枢神经系统疾病,引起药源性疾病的因素主要为

- A: 年龄因素
- B: 基础疾病因素
- C: 性别因素
- D: 遗传因素

答案: B

14. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别)左眼

- A: NS
- B: LD
- C: DOL
- D: O

答案: C

15. 患者，女，28 岁，处于哺乳期，因阴道分泌物增多、稀薄且带鱼腥臭味，就医后确诊为细菌性阴道病，首选用药方案是

- A: 1: 2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日
- B: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- C: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- D: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次. 连用 7 日

答案：D

16. 米索前列醇所致的主要不良反应是

- A: 神经毒性
- B: 性功能减退
- C: 皮炎
- D: 腹痛

答案：D

17. （2016 年真题）从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是（）

。

- A: 伪麻黄碱
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 布洛芬
- D: 氯苯那敏

答案：D

18. 各调剂部门每天下班（或交班）前，管理人员应核对药品和相关记录，实施的是

- A: 五专管理
- B: 基数卡

C: 印鉴卡

D: 防盗设施

答案: A

19. 阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 肾小球滤过率下降

C: 前列腺素合成障碍

D: 结晶沉积

答案: C

20. 饮水可能会引起水潴留是指

A: 利胆药

B: 苦味健胃药

C: 抗利尿药

D: 舌下片（丸）

答案: C

21. 患者，男，35 岁，近日出现足趾间皮肤瘙痒、水泡样皮疹，宜选用的药物是（）

A: 甲硝唑栓

B: 雌三醇乳膏

C: 酮康唑乳膏

D: 硝酸咪康唑栓

答案: C

22. 有关尿酮体和尿肌酐的叙述正确的是

- A: 如酮体产生的速度小于组织的利用速度，则血液中的酮体增加出现酮血症
- B: 尿肌酐是体内肌酸代谢的最终产物，是脱水缩合物
- C: 尿酮体包括乙酰乙酸、 β -丁酸、丙酮，是体内糖氧化的中间产物
- D: 酮体在肾脏产生，在血液中循环

答案：B

23. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 替诺福韦
- B: 拉米夫定
- C: 奈韦拉平
- D: 双脱氧胞苷

答案：C

24. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇一屈螺酮片
- B: 17β 一雌二醇
- C: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- D: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：C

25. 成人静脉血白细胞计数的正常范围值

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$
- C: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：D

26. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

A: HBeAg

B: HBsAg

C: HBsAb

D: HBeAb

答案：C

27. 阿司匹林可能引起

A: 尿血红蛋白

B: 尿酮体

C: 尿沉渣结晶

D: 尿肌酐

答案：A

28. 患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: 胃肠道反应

B: 关节痛

C: 低血糖

D: 皮疹

答案：A

29. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A: 华法林

B: 地西泮

C: 头孢呋辛

D: 青霉素 G

答案：B

30. (2015 年真题) 中成药血脂康中含有的化学成分是 ()。

A: 辛伐他汀

B: 依折麦布

C: 阿托伐他汀钙

D: 洛伐他汀

答案：D

31. (肾功能不全者的药物排泄机制) 弱酸性药物离子化减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾小管重吸收增加

C: 肾血流量减少

D: 肾小管分泌减少

答案：B

32. 属于蛋白酶抑制剂的是 ()

A: 依非韦伦

B: 利巴韦林

C: 利托那韦

D: 齐多夫定

答案：C

33. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

A: 东莨菪碱

B: 抗过敏药

C: 阿米洛利

D: 双嘧达莫

答案: A

34. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是 ()。

A: 阿司匹林

B: 利伐沙班

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案: A

35. 发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

A: 37℃ 以上

B: 37.4℃ ~ 38℃

C: 38.1℃ ~ 39℃

D: 41℃ 以上

答案: B

36. 心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

A: 奥司他韦

B: 金刚烷胺

C: 布洛芬

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

37. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 维生素 B12 肌肉注射

B: 输血

C: 硫酸亚铁口服

D: 右旋糖酐铁肌注

答案：C

38. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A: 腹痛

B: 神经毒性

C: 性功能减退

D: 皮炎

答案：B

39. 依据“处方”的含义及其重要意义，属于处方范畴的医疗文书是

A: 病区领药单

B: 临床诊断书

C: 病区用药医嘱单

D: 药品出库单

答案：C

40. 饮食对粪外观的影响，食巧克力、咖啡

A: 暗绿色

B: 酱色

C: 红色

D: 黑褐色

答案：B

41. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 急性肾盂肾炎
- B: 膀胱炎
- C: 急迫性尿失禁
- D: 压力性尿失禁

答案：A

42. 试验样本数常见病不少于 2000 例的评价阶段是

- A: IV 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：A

43. 预混胰岛素 30R 的组成为()

- A: 70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素
- B: 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素
- C: 30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素
- D: 30%中效胰岛素，70%短效胰岛素

答案：B

44. 痛风急性发作期为抑制粒细胞浸润可选用

- A: 别嘌醇
- B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 泼尼松龙

答案：C

45. (2017 年真题) 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是 ()

A: 7 滴

B: 15 滴

C: 25 滴

D: 50 滴

答案：C

46. 不宜与茶叶合用的药物是

A: 左旋多巴

B: 磺胺类药物

C: 硫酸亚铁

D: 辛伐他汀

答案：C

47. 肌肉注射给药的外文缩写是

A: ivgtt

B: iv

C: i.h

D: im

答案：D

48. 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV₁<50%) 宜选用的治疗方案是 ()

- A: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：D

49. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 呋喃唑酮
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 四环素

答案：B

50. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月
- B: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案：B

51. 第二类精神药品处方印刷用纸为

- A: 白色
- B: 淡绿色
- C: 淡红色
- D: 淡黄色

答案：A

52. 西咪替丁所致的主要不良反应是

- A: 皮炎
- B: 腹痛
- C: 神经毒性
- D: 性功能减退

答案：D

53. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

- A: 福辛普利
- B: 二甲双胍
- C: 美托洛尔
- D: 阿卡波糖

答案：B

54. 适宜于餐中给药的药物是

- A: 复方铝酸铋
- B: 缬沙坦
- C: 二甲双胍
- D: 法莫替丁

答案：C

55. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 利巴韦林
- C: 阿洛司琼
- D: 阿昔洛韦

答案：A

56. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

- A: 2
- B: 0.8~1.5
- C: >1.5
- D: <0.8

答案：B

57. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于()。

- A: 发药环节
- B: 调配处方环节
- C: 药品储存环节
- D: 接待投诉环节

答案：A

58. 孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是

- A: 维生素 AD
- B: 复合维生素 B
- C: 维生素
- D: 葡萄糖酸钙

答案：C

59. 碱化尿液，服药期间需监测尿 pH 以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

- A: 苯溴马隆

B: 枸橼酸氢钾钠

C: 拉布立酶

D: 非布司他

答案：B

60. 可引起血肌酐增高的是

A: 急性胰腺炎

B: 严重肝病

C: 肾衰竭

D: 胃溃疡

答案：C

61. 解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

A: 布洛芬

B: 阿司匹林

C: 贝诺酯

D: 吲哚美辛

答案：B

62. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2～3 次的药物是 ()。

A: 地塞米松粘贴片

B: 冰硼咽喉散

C: 甲硝唑口腔粘贴片

D: 西地碘含片

答案：B

63. 美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益表明

- A: 有利诊断特殊疾患
- B: 改变降脂治疗观念
- C: 列为行政决策的依据
- D: 有助个体化给药

答案：B

64. 减少因人员不足、忙乱无序而带来的调配差错，是针对

- A: 及时沟通
- B: 规范操作、坚持核对
- C: 配备足够的人力
- D: 环境整齐、安静

答案：C

65. 铁剂联用维生素 C，可增加疗效的机制是（）

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 协同作用
- C: 作用于不同的靶点
- D: 促进机体的吸收利用

答案：D

66. 利尿脱水急速降低体重的兴奋剂是

- A: 呋塞米
- B: 阿托品
- C: 苯丙胺
- D: 甲睾酮

答案：A

67.（2018 年真题）患者，男，40 岁，因感冒所致鼻塞到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 氯苯那敏片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 酚麻美敏片

答案：C

68. 服药不宜从事驾驶、高空作业的药品是

- A: 含氯苯那敏的抗感冒药
- B: 含右美沙芬的抗感冒药
- C: 含伪麻黄碱的抗感冒药
- D: 含咖啡因的抗感冒药

答案：A

69. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

- A: ADR/ADE 过程描述
- B: 用药原因
- C: 用药起止时间
- D: 不良反应 / 事件的结果

答案：B

70. 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是（）

- A: 胰岛素
- B: 复方炔诺酮

C: 依那普利

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

71. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

A: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

B: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

C: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果

D: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

72. 在骨性关节炎治疗中，为减轻胃肠道反应，可选用的选择性 COX-2 抑制剂是

A: 吲哚美辛

B: 双氯芬酸

C: 塞来昔布

D: 萘普生

答案：C

73. 治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

A: 比沙可啶

B: 硫酸镁

C: 东莨菪碱

D: 乳果糖

答案：D

74. (血常规检查异常的病症)恶性肿瘤

- A: 白细胞增多
- B: 淋巴细胞增多
- C: 红细胞沉降率减慢
- D: 血小板增多

答案：A

75. 有关依从性的说法错误的是

- A: 依从性仅限于药物治疗
- B: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性
- C: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性
- D: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果

答案：A

76. 中枢性降压药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 可乐定
- C: 胍苯哒嗪
- D: 利血平

答案：B

77. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 罗格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 格列喹酮
- D: 阿卡波糖

答案：C

78. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药
- B: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- C: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- D: 瑞格列奈片应于餐前服用

答案：B

79. 胃黏膜保护药硫糖铝应该

- A: 在餐前 1 小时服用
- B: 在餐后 1~2 小时服用
- C: 在餐前 15 分钟服用
- D: 在早、晚餐前 1.5 小时服用

答案：A

80. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 米泔水样便
- C: 冻状便
- D: 黏液便

答案：C

81. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 曲尼司特
- B: 多索茶碱
- C: 孟鲁司特

D: 氨茶碱

答案: C

82. po. 表示

A: 每日

B: 口服

C: 双眼

D: 饭后

答案: B

83. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

A: 促进机体的利用

B: 竞争性拮抗作用

C: 作用于不同的靶点

D: 延缓或降低抗药性

答案: C

84. 中成药血脂康中航油的化学成分是

A: 洛伐他丁

B: 依折麦布

C: 辛伐他丁

D: 阿托伐他汀

答案: A

85. 现代临床药物治疗更多依赖于循证医学的支持。循证医学证据分为几种，下列证据级别和推荐强度最高的是

A: 单个大样本随机对照试验

B: 同质随机对照试验的系统评价

C: 大样本病案系列

D: 同质病例对照研究的系统评价

答案: B

86. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 降血压

B: 脱水

C: 扩容

D: 止血

答案: B

87. 患者，男，46 岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP) 评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果，药师的用建议是()

A: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 50%

B: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑

C: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 25%

D: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变

答案: B

88. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

A: 分布容积小的药物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 血浆蛋白结合率高的药物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/995020341121012033>