

主治医师（内科学）-综合练习(A1/A2 型题 2)

1、关于处理胰岛素治疗糖尿病过程中 Somogi 现象正确的是

- A. 减少饮食总热量
- B. 增加胰岛素剂量
- C. 减少晚间胰岛素剂量
- D. 加用磺脲类药
- E. 增加糖类摄入

2、以下哪项对胰岛素瘤的诊断具有决定意义

- A. 消瘦
- B. 供糖后症状迅速消失
- C. 常于空腹发作
- D. 餐后胰岛素升高
- E. 胰岛素 / 血糖比值升高

3、以下哪项为甲状腺功能亢进性肌病的好发部位

- A. 膝关节带肌群
- B. 肩关节带肌群
- C. 肘关节带肌群
- D. 肩胛与骨盆带肌群
- E. 颈椎关节肌群

4、温抗体型自身免疫性溶血性贫血患者吸附 C 的红细胞多以下哪个部位破坏

- A. 肾
- B. 脾
- C. 骨髓
- D. 淋巴结
- E. 胰

5、属于自身免疫性粒细胞减少的为

- A. 化疗药物致粒细胞减少症
- B. 家族性良性粒细胞减少症
- C. Felty 综合征
- D. 放射线致白细胞减少症
- E. 假性粒细胞减少症

6、Ph 染色体不会见于

- A. 慢性粒细胞白血病
- B. AMI
- C. 慢性淋巴细胞白血病
- D. 成人急性淋巴细胞白血病
- E. 慢性髓细胞白血病

7、属于边缘带淋巴瘤的是

- A. 单核细胞样 B 细胞淋巴瘤
- B. 外套细胞淋巴瘤
- C. 间变性大细胞型淋巴瘤
- D. 成人 T 细胞性淋巴瘤
- E. 皮肤 T 细胞性淋巴瘤

8、多发性骨髓瘤可引起淀粉样变性，以下为较易发生此症的骨髓瘤类型是哪项

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgM
- D. IgD
- E. IgE

9、以下疾病早期就常呈现全血细胞减少的是

- A. 非霍奇金淋巴瘤
- B. 多发性骨髓瘤
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 恶性组织细胞病
- E. 传染性单核细胞增多症

10、以下哪项为凝血过程中形成的凝血活酶不含有的

- A. PF
- B. FV
- C. FXa
- D. Ca
- E. FVIII: C

11、以下哪种物质与肝素的抗凝机制密切相关

- A. FVa
- B. 凝血活酶
- C. AT-III
- D. PF
- E. PC

12、能增加毛细血管致密度的止血药物是

- A. 安络血
- B. 维生素 K
- C. 止血芳酸
- D. 止血敏
- E. 立止血

13、过敏性紫癜的病因不包括

- A. 虫咬
- B. 菌苗或疫苗接种
- C. 自身免疫病
- D. 药物
- E. 花粉，尘埃

14、确诊症状不典型的哮喘不包括

- A. 支气管激发试验阳性
- B. 支气管舒张试验阳性
- C. 运动试验阳性
- D. 呼气峰流速日变异率 $\geq 20\%$
- E. 吸入过敏原 IgE 阳性

15、医院内获得性肺炎的特点不包括

- A. 以革兰阴性杆菌多见，主要为肠杆菌科细菌和非发酵菌
- B. 通常急性起病
- C. 喹诺酮类抗生素是治疗的主要药物
- D. 对产超广谱 β 内酰胺酶的细菌应避免使用头孢菌素
- E. 联合使用氨基糖苷类抗生素可以提高对耐药菌的治疗成功率

16、关于肺炎的治疗不正确的是

- A. 怀疑或经体外药敏试验证明对甲氧西林耐药，一般用万古霉素
- B. 肺炎链球菌肺炎首选青霉素 G
- C. 合并 COPD 的患者，抗生素的疗程应适当延长
- D. 肺炎球菌使用静脉抗生素体温正常后即可换用口服抗生素
- E. 治疗期间定期复查 X 线胸片，当阴影基本吸收后停药

17、有关抗生素副作用的论述不正确的是

- A. 服用喹诺酮类抗生素时不要在阳光下工作以免发生光敏反应
- B. 使用庆大霉素时，有肾功能不全，前庭功能或听力减退的患者所用维持量应酌减量
- C. 泰能（依米配能—西司他丁）可以引起惊厥，对于脑血管意外的患者应慎用
- D. 喹诺酮类抗生素可能影响软骨的发育，对儿童应禁用
- E. 红霉素对肾功能有影响，应根据肌酐清除率调整

18、阻塞性肺气肿时最不可能出现的是

- A. 心浊音界缩小或消失，肝浊音界下降
- B. 吸气相延长
- C. 触觉语颤减弱
- D. 劳力性呼吸困难
- E. 呼吸音和语音均减弱

19、某肺炎患者，痰培养结果为 MSSA（甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌），首选

- A. 红霉素
- B. 氨苄青霉素
- C. 氧氟沙星
- D. 氧哌嗪青霉素
- E. 万古霉素

20、以下对判断肺结核活动最有价值的指标是

- A. 午后低热
- B. 痰抗酸杆菌(+)
- C. PPD 试验强阳性
- D. X 线胸片示右肺上叶后段薄壁空洞
- E. ESR140mm/h

21、原发干燥综合征不常见的是

- A. 口眼干燥
- B. 肾小管性酸中毒
- C. 腮腺肿大
- D. 间质性肺炎和肺间质纤维化
- E. 致畸性关节炎

22、以下最可能是干燥综合征合并皮肤紫癜原因的是

- A. 凝血时间延长
- B. 过敏
- C. 雌激素代谢异常
- D. 血管脆性改变
- E. 感染

23、类风湿关节炎中与疾病活动性密切相关的最常见的关节外表现是哪项

- A. 动脉炎
- B. 类风湿结节
- C. 脾大
- D. 胸膜炎
- E. 周围神经病变

24、可引起咽下困难为

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性硬化病
- C. 多肌炎 / 皮肌炎
- D. 结节性多动脉炎
- E. 系统性红斑狼疮

25、膝腱反射的中枢部位在

- A. 胸～腰
- B. 腰
- C. 腰
- D. 腰～骶
- E. 骶

26、关于优势大脑半球病变的体征正确的是

- A. 肢体肌力减弱
- B. 肢体肌张力降低
- C. 腱反射亢进
- D. 失语
- E. 骨骼肌萎缩

27、患者一侧上肢出现痛觉和温度觉消失，而触觉保留，病变位于

- A. 脊髓后角
- B. 脊髓前索
- C. 脊神经后根
- D. 顶叶中央后回
- E. 脊髓前角

28、帕金森病一般不出现下列哪项

- A. 美多芭治疗有效
- B. 感觉异常
- C. 震颤和动作迟缓
- D. 偏瘫和偏身感觉障碍
- E. 肌肉僵直

29、以下哪根血管发出大脑后动脉

- A. 大脑中动脉
- B. 前交通静脉
- C. 椎动脉
- D. 基底动脉
- E. 后交通动脉

30、患者一侧内囊出血出现伸舌偏右，则考虑

- A. 左侧丘脑损害
- B. 右侧皮质脊髓束损害
- C. 左侧皮质延髓束损害
- D. 右侧皮质延髓束损害
- E. 右侧丘脑损害

1 次

B. >2 次

C. >3 次

D. >5 次

E. >6 次

49、肝硬化患者肝性脑病时不能采取的治疗措施是

A. 护肝

B. 弱酸性液灌肠

C. 纠正水、电解质紊乱

D. 静脉滴注免疫球蛋白

E. 谷氨酸钾或谷氨酸钠溶液静注

50、以下各项体征对诊断肝癌最有帮助的是

A. 肝脏增大

B. 墨菲征阳性

C. 肝区压痛

D. 肝表面结节，轻压痛

E. 肝区叩痛阳性

51、以下各选项中属于慢性肾炎的临床特点是

A. 不会导致尿毒症

B. 无蛋白尿

C. 双侧肾大小不一致

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995111222340011330>