

高中地搭理考复习大纲

必修一 第一章 行星地球

§ 1 宇宙中的地球

- 1、天系通通级别： 河外星系← 总星系 →银河系→太阳系→地月系
- 2、太阳系中距太阳由近及远的八大行星分别是：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 （运动特点 :同向性、近圆性、共面性 ）
- 3、由于地球上生物，因此地球是一颗特其他行星 。
- 4、地球上产生生命的基本条件：外面条件 :包括太阳坚固的光照和地球安全的运行轨道；自己条件： （1） 地球有适中的质量体积，因此地球周围有适合生物呼吸的 大气 ； （2)由于日地距离适中及地球大气的削弱作用和保温作用，因此地球上适中的 温度 ； （3)地球上 液态水（能形成海洋 ）。




§ 2 太阳对地球的影响

- 1、太阳辐射 是地球的主要 能量本源，它可以保持地表温度，是促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力，可以影响人类的生产和生活，供应煤炭、石油等化石燃料，还可以经过人为转变形成其他形式的能量。
- 2、太阳活动的标志包括黑子和耀斑。当太阳活动比较激烈时，可以形成磁暴和极光现象，造成无线电短波通讯中断，可以引起水旱灾害和地震等自然灾害。

§ 3 地球的运动


- 1、地球的自转方向是 自西向东 ，其自转周期若以太阳为参照物大体为 24 小时，叫做一个太阳日日；若以远离地球的某一恒星为参照物，则大体为 23 小时 56 分 4 秒，叫做一个恒星日日。

- 2、地球的公转方向是 自西向东 ，其公转周期大体为 365 天 6 小时 9 分 10 秒，叫做一个恒星年年。
- 3、由于 地球的自转 ，形成了 （ 1)昼夜更替现象； （2)不相同经度出现了不相同的地方时，即东边的时间比西边的时间要早； （3)形成了地转偏向力 ，即水平运动的物体 北半球向右偏，南半球向左偏 。
- 4、在空白图中绘制出直射光辉、晨昏线，注明出直射点及夜半球，表示出地球自转方向。



- 5、地球公转与自转轨道的夹角叫做 黄赤交角，其大小是 $23^{\circ}26'$ 。
- 6、由于黄赤交角的存在，产生了太阳直射点的南北搬动，以及昼夜长短的变化和正午太阳高度角的变化、四时的变化等。
- 7、太阳直射点的南北搬动：
 - 6 月 22 日（节气：夏至日 ），太阳直射点位于北回归线；
 - 9 月 23 日（节气：秋分日 ），太阳直射点位于赤道；
 - 12 月 22 日（节气：冬至日 ），太阳直射点位于南回归线；
 - 3 月 21 日（节气：春分日 ），太阳直射点位于赤道；太阳直射点南北搬动的周期：大体为 365 天 5 小时 48 分 46 秒，叫做一个回归年。

8、在图中适合地址绘制出地球自转和公转的方向，并判断出各点的日期



9、昼夜长短变化规律：

(1) 夏至日越向北昼越长，北极圈及其以北出现极昼，南极圈及其以南出现极夜；冬至日越向北昼越短，南极圈及其以南出现极昼，北极圈及其以北出现极夜；春分日、秋分日则全球昼夜等长。

(2) 北半球夏至日昼长最长，冬至日昼长最短；南半球冬至日昼长最长，夏至日昼长最短；赤道全年昼夜等长。

10、正午太阳高度角变化规律：

(1) 夏至日正午太阳高度角散布规律：由北回归线向南北两侧逐渐降低；冬至日正午太阳高度角散布规律：由南回归线向南北两侧逐渐降低；春分、秋分日正午太阳高度角散布规律：由赤道向南北两侧逐渐降低；

(2) 夏至日正午太阳高度角达到一年中最大值的是北回归线及其以北，达到一年中最小值的是南半球；冬至日正午太阳高度角达到一年中最大值的是南回归线及其以南，达到一年中最小值的是北半球；春秋分正午太阳高度角达到一年中最大值的是赤道。

§ 4 地球的圈层构造

1、地球的内部圈层包括地壳、地幔、地核；地球的外面圈层包括水圈、大气圈、生物圈。



2、图中 1 表示地壳， 2 表示地幔， 3 表示地核， A 表示莫霍面， B 表示古登堡面。

3、岩石圈包括软流层以上部分，即地壳和上地幔顶部顶部。

4、水圈是一个连续而不规则的圈层。

第二章 地球上的大气

§ 1 冷热不均引起大气运动


1、大气的根本热量本源是太阳辐射，但大气最直接的热量本源是地面。

2、大气对太阳辐射拥有削弱作用，对地面拥有保温作用。

3、大气中的二氧化碳越多，经过大气逆辐射还给地面的热量越多，即保温作用越强。

4、热力环流的形成过程是地面冷热不均→大气垂直运动→水平气压差异→大气水平运动（风）。


在图中绘制出空气运动的方向、注明出地面气压的高、低。



5、空气水平运动（风）的方向是从高压指向低压，北半球向右偏，南半球向左偏。在等压线图上，等压线越密集，风力越大。

§ 2 气压带细风带

1、在图中标出气压带、风带的名称，画出风带的风向。



2、气压带中是由于热力原因形成的是赤道低压带、极地高压带；由于动力原因形成的是副热带高压带、副极地低压带；风带是从高压带吹向低压带，并考虑地转偏向力形成的。

3、气压带、风带的季节搬动规律是无论南北半球都是 7 月向北移， 1 月向南移。


4、北半球 1 月(冬季)，亚洲大陆上形成亚洲高压，切断了副极地低压带，从而在太平洋上形成了阿留申低压；北半球 7 月（夏季），亚洲大陆上形成亚洲低压，切断了副热带高压带，从而在太平洋上形成了夏威夷高压。

5、东亚地域由于海陆热力差异对气压带、风带的影响可以在形成冬季由陆地吹向海洋、夏季由海洋吹向陆地的季风现象。（冬季西北风，夏季东南风）

6、气压带、风带对天气的影响：

	主要散布	天气成因	天气特点
热带雨林天气	南北纬 10° 之间	终年受赤道低压带控制	全年高温多雨
热带草原天气	南北纬 10° 到回归线之间	受赤道低压带与信风带交替控制	干湿季分明， 干季高温少雨， 湿季高温多雨
地中海天气	南北纬 30° — 40° 的大陆西岸	受西风带与副热带高压带交替控制	夏季高温少雨， 冬季平易多雨
温带海洋天气	南北纬 40° — 60° 的大陆西岸	终年受西风带控制	终年平易多雨

§ 3 常有天气系统




1、图中 1表示冷锋， 2表示暖锋。其中冷锋在我国出现的频率较高。

2、锋面天气系统：

	过境前	过境时	过境后	天气现象实例
冷锋	气温较高， 气压较低， 天气明亮	易出现雨雪大风及降温天气	气温下降， 气压高升， 天气转晴。	夏季的北方暴雨 冬季的寒潮 (暴风降温) 春季的沙尘暴
暖锋	气温较低， 气压较高， 天气明亮	易出现连续性降水或雾等天气	气温上升， 气压下降， 天气转晴。	略

3、图中的 1 表示高压， 2表示低压。



4、在图中用箭头表示出气流的水平运动和垂直运动方向。

5、图中 1形成的天气特点是明亮少雨，如我国夏季的伏旱、冬季的寒潮、秋季的秋高气爽等天气。 2 形成的天气特点是云雨天气， 如我国夏秋季的台风现

象。

§ 4 全球天气变化


- 1、全球天气变化既有自然原因，也有人为原因。现代天气变化最主要的趋势是全球天气变暖。
- 2、在我国，天气变暖现象由空间上看，北方地域十分明显，由时间上看，冬季季节比较突出。
- 3、产生全球天气变暖的主要原因：二氧化碳的排放（化石燃料的燃烧）、森林的破坏、人口的增加
- 4、全球天气变暖的影响：（1）以致海平面上升；（2）改变水循环，产生洪涝、干旱等灾害；加剧水资源的不坚固性及供需矛盾。（3）有利于高纬国家，使其农业增产（生长远延伸）；不利于低纬国家，使其农业减产（洪涝与干旱加剧）。

第三章 地球上的水

§ 1 自然界的水循环

1、水资源是指陆地上的淡水资源，其中储量最大的是冰川水，利用最多的是河流水。


2、



- (1)图中 1是蒸发， 2 是降水，它们组成了海上内循环循环；
 - (2)图中 3是蒸发， 4 是降水，它们组成了陆地内循环（内陆循环）循环；
 - (3)图中 5是蒸发， 6是水汽输送， 7是降水， 8是地表径流， 9是下渗， 10是地下径流，它们组成了海陆间循环循环。
 - (4)可以更新和净化陆地水资源的是海陆间循环。 人类在利用水循环过程中对地表径流的利用和影响最大。
- 3、水循环的意义：（1保持全球水体的动向平衡；（2促进全球的能量交换和物质转移；（3塑造地表形态；（4对陆地水资源拥有更新、净化的作用。

§ 2 大规模的海水运动

- 1、形成洋流的主要动力是流行风，其他处转偏向力和陆地形状也可以影响洋流的方向。
- 2、洋流的主要种类有寒流和暖流。
- 3、在图中绘制出洋流的方向。



- 4、图中的寒流包括 5 7、 10、 11；暖流包括 1 2、 3、 4、 6、 8、 9。
- 5、洋流的影响：

- (1) 影响高低纬间热量的输送和交换。
- (2) 对沿岸天气的影响：暖流起增温增湿作用，如西欧的温带海洋天气天气即受北大西洋暖流影响。寒流起降温减湿作用，如沿海地域受寒流影响可能形成荒漠。
- (3) 对渔场的影响： 太平洋中由于寒暖流 3和 7的交汇形成北海道渔场； 由于上升流的影响在 1处形成秘鲁渔场。
- (4) 对海洋污染的影响：扩大污染范围；加快污染物的净化。
- (5) 对海洋交通运输的影响：顺流时可以加快速度、节约燃料；寒暖流交汇处易出现雾，可以搅乱交通运输；此国外流可能由高纬带来冰山，危害交通运输。

§ 3 水资源的合理利用

- 1、自然资源按其性质可以分为可再生资源和非可再生资源，水资源属于其中的可再生资源。
- 2、影响水资源丰歉程度的要素有降水量、蒸发量、径流量等，其中径流量是衡量水资源丰歉程度最重要的标准。
- 3、水资源的数量主要影响经济活动的规模大小，水资源的质量主要影响经济活动的效益高低。
- 4、生产力（科技 ）的发展可以影响人类对水资源的利用。在科技落后时代，人类主要利用河流水、淡水湖泊水；科技发达时代，人类利用水资源的种类增多，利用方式多样化。比方地下水开采、海水淡化、跨流域调水、修建水库等。
- 5、目先人类对水资源的需求量不断增加，而水资源质量不断下降，必定合理


利用水资源，由于水资源其实不是取之不尽、用之不断的。

6、人类利用水资源的措施：（1）修建水库；（2）跨流域调水；（3）提高利用效率和重复利用率。（4）海水淡化；（5）合理开采地下水；（6）提高节水意识；（7）人工增雨；（8）减少污染浪费。其中属于开源措施的有（1）（2）（4）（5）（7）属于节流措施的有（3）（6）（8）。

第四章 地表形态的塑造

§ 1 创立地表形态的力量

- 1、地质作用依照能量本源的不相同可以分为内力作用、外力作用两种类。由整个地质时期看，地质作用中内力作用居主导地位
- 2、内力作用的能量主要来自地球内部（热能），它可以使地表变得高低不平；内力作用主要包括岩浆活动、变质作用、地壳运动等基本形式。
- 3、地壳运动中塑造地表形态的主要方式是地壳运动，其按运动方向和性质又可以分为水平运动和起落（垂直）运动两种形式。
- 4、水平运动常常形成褶皱山脉、断裂带、裂谷、海洋等；垂直运动常常形成地势起伏、海陆变迁等。就全球规模的运动而言，地壳运动以水平运动为主。
- 5、外力作用的能量主要来自地球外面（太阳能、重力能），它可以使地表变得平坦；外力作用主要包括风化作用、损害作用、搬运作用、积聚作用（积聚作用）、固结成岩等基本形式。
- 6、三大类岩石可以相互转变（地壳物质循环）。在图中填出相应名称。



§ 2 山岳的形成

- 1、山岳的主要种类包括褶皱山、断块山、火山。
- 2、褶皱的基本形态有背斜和向斜两种类。其中岩层向上拱起形成的是背斜，其岩层的新老关系是中心岩层较老，两翼岩层较新；岩层向下波折形成的是向斜，其岩层的新老关系是中心岩层较新，两翼岩层较老。
- 3、在内力作用影响下，一般情况下背斜成山，向斜成谷；但若是考虑到外力作用，背斜的顶部由于受张力作用，简单被损害成山谷，而向斜的槽部受挤压力作用，不易发生损害作用，从而形成山。世界出名的喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、科迪勒拉山脉等按其成因种类都属于褶皱山。背斜属于储油气构造；可修建地道；向斜属于储水构造。
- 4、岩层在地壳运动过程中破碎并沿破碎面发生明显位移而形成断层。两条断层之间的岩块相对上升则形成地垒，简单形成断块山地，比方华山、庐山、泰山等即是这样形成；两条断层之间的岩块相对下降则形成地堑，简单形成低地和谷地，比方渭河平原、汾河谷地、东非大裂谷等即是这样形成。
- 5、哥伦比亚高原、我国长白山主峰、日本富士山等都由于岩浆活动形成的。
- 6、山岳地域的交通线主要散布在山间盆地和河谷。原因是：山岳地域地表崎岖不平，而山间盆地及河谷地势相对较和缓。
- 7、山岳地域的交通线长度较长，波折度比较大。原因是：山岳地域的交通线需要绕过各种阻挡物。
- 8、山岳地域的交通线主要以公路为主，其次才是铁路。原因是：山岳地域的交通建设成本比较高，难度比较大，而公路的建设成实情对较低。

§ 3 河流地貌的发育

- 1、河流地貌依照成因可分为损害地貌、积聚地貌。
- 2、溯源损害可以使河谷向河流源泉方向伸展；下蚀可以使河谷加深，侧蚀可以使河谷加宽。
- 3、河流积聚地貌最典型的种类是冲积平原，它是由河流上游的洪积—冲积平原、河流中下游的河漫滩平原、河流入海口的三角洲平原等组成。
- 4、高原地域的聚落一般散布在深切河谷两岸的河漫滩平原，其形态呈条带状，集散程度比较分别，规模比较小。主要原因是：这里天气温暖（海拔低），土壤肥沃，水源充分。
- 5、山区地域的聚落一般散布在河流两岸的河漫滩平原或山前的冲积扇，其形态呈条带状，集散程度比较分别，规模比较小。主要原因是：这里地形平坦，地表或地下水源充分，土壤肥沃。
- 6、平原地域的聚落一般散布在三角洲或河流两岸的河漫滩平原，其形态呈条带状或团状，集散程度比较密集，规模比较大。主要原因是：这里地形平坦，土壤肥沃，水源充分，内河与海洋交通便利。

第五章 自然地理环境的整体性和差异性

§ 1 自然地理环境的整体性

- 1、组成环境的各个要素，总是力求整体的一致性；某一要素发生变化，会引起其他要素甚至整体发生相应改变。
- 2、地理要素间进行着物质与能量的交换，如水循环、生物循环、岩石圈物质循环（地壳物质循环）等过程。
- 3、地理要素间相互作用产生生产功能、平衡功能等新功能。其中，生产功能是指自然环境拥有合成有机物的能力；平衡功能指各自然地理要素经过物质

和能量交换，使自然地理要素的性质保持坚固。

- 4、自然地理环境拥有一致的演化过程，即自然地理环境的变化是由多个地理要素变化共同组成的。
- 5、地理要素的变化会“牵一发而动全身”，即某一自然地理要素的变化，会以致其他要素及整个地理环境状态的相应改变。

§ 2 自然地理环境的差异性

- 1、以热量变化为基础，形成自然带由赤道向两极表现南北方向有规律的更替，这种现象在低纬、高纬地域最明显。
- 2、以水分变化为基础，形成自然带由沿海向内陆表现东西方向有规律的更替，这种现象在中纬地域最明显。
- 3、以水分和热量的共同变化为基础，形成自然带由山麓向山顶表现垂直方向有规律的更替，这种现象在高差较大的山区地域最明显。当地所在纬度越低，海拔越高，垂直带数量越多，垂直带谱越完满。

课下思虑内容：

- (1) 自然灾害的主要种类？
- (2) 台风、寒潮、洪灾的成因、危害、防治措施。

必修二 第一章 人口的变化

§ 1 人口的数量变化


- 1、一个地域人口的数量变化包括人口的自然增加和机械增加（人口迁移）。其中，影响人口数量变化的决定性要素是自然增加，而机械增加对人口数量的影响力随着范围的增大而减弱。

2、从时间上看，世界人口数量的变化在不相同历史时期是不相同的，从总的趋势来看是不断增加的，二战后则进入迅速增加时期，70年代后增加速度减缓。

从空间上看，集中于欧洲、北美洲、大洋洲的发达国家，人口自然增加率较低，日本、俄罗斯；德国、法国、匈牙利等国家甚至出现了人口负增加现象；而集中于亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家人口自然增加率较高。因此不同的国家和地域采用的人口政策是不相同的。

3、世界人口增加模式是由出生率、死亡率、自然增加率三项指标共同组成的，可以分为原始型、传统型、现代型三种类。

4、图中曲线①表示出生率，曲线②表示死亡率。A表示的人口增加模式是原始型，B表示的人口增加模式是传统型，C表示的人口增加模式是现代型。在表格中填出各种人口增加模式的相关特点。



	出生率	死亡率	自然增加率
A	高	高	低
B	高	低	高
C	低	低	低

5、影响人口模式转变的主要要素是社会生产力，在人口模式的转变过程中，第一出现下降变化的是死亡率。

6、全球增加模式从整体来看处于由传统型转向现代型的过渡阶段，从局部看，发达国家以及中国等少许发展中国家已经进入现代型型，而大多数发展中国家依旧处于由传统型转向现代型的过渡阶段。

§ 2 人口的空间变化

1、人口迁移依照可否超越国界可以分为国际人口迁移和国内人口迁移。

2、国际人口迁移整体特点是以企业性、大批量的移民为主。① 19 世纪以前主要迁往新发现的大陆，如由欧洲迁往美洲、大洋洲，开发了新大陆，流传了工业文明，改变了人种的空间散布。②二战后的人口迁移主要特点是定居移民减少，短期流动人口增加，迁移方向主要由发展中国家迁往发达国家以及世界性的大型能源基地，主要迁出区是拉丁美洲，主要迁入区有欧洲、北美和西亚、北非地域。

3、我国人口迁移分为两个阶段：① 20 世纪 80 年代以前，为了开发边疆，主要以政策性迁移为主。② 20 世纪 80 年代今后，主要特点表现为人口迁移规模增大，频率加快，迁移方向主要为由农村向城市，由内陆向沿海。

4、我国人口迁移的主要意义：①调治人口空间散布；②调治人才余缺；③加强民族交融和文化交流；④促进经济发展、减小地域经济差距。

5、影响人口迁移的要素包括自然要素、社会经济要素、个人动机和需求等，从整体上看，最主要的影响因平素常是经济要素。

§ 3 人口的合理容量

1、①环境人口容量：是环境承载力最重要的指标，表示一个地域能养活的最

大人口数量；②人口合理容量表示一个地域在可连续发展的前提下所能养活的
的最大人口数量。二者均拥有不确定性性。

2、影响环境人口容量的要素主要包括资源、科技水平、生活和文化花销水平
等，其中最主要的要素是资源，与环境人口容量成正比的是资源和科技水平，
成反比的是生活和文化花销水平。

3、保持人口合理容量的要点是既要提高生活质量，又要保持好生态、经济、
社会的可连续发展发展；对于不相同国家和地域来说，保持人口合理容量的关
键措施是不相同的，发展中国家要尽最大可能将人口控制在合理的规模之内，
而发达国家要成立公正序次，保证大多数人追求生活质量的相同权益。

第二章 城市与城市化

§ 1 城市内部空间构造

1、城市形态分为组团状（重庆）、团块状（北京、成都、合肥、华盛顿）、放射
状（延安）、条带状（兰州、洛阳、西宁、宜昌）等。

2、影响城市形态的要素有自然条件（地形、河流等）和社会经济条件（交通、
经济、文化、历史等）。如：平原地域的城市形态多为团块状，山区和丘陵区
的城市形态则多为组团状。

3、城市中最常有的功能区主若是住处区、商业区、工业区。各功能区之间没
有明显界线；各功能区可能兼有其他土地利用方式；不相同规模和种类的城市，
其功能区组成不相同。

4、住处区：城市最广泛的土地利用方式，中高级与初级住处区呈背向发展。

5、商业区：需要便利的交通及大批花销者；散布以市场最优或交通最优为原

则；多位于市中心、交通干线两侧或街角路口；大多呈点状或条状。

6、工业区：专业化程度较高，相互之间协作性强；不断向外缘搬动；散布于
交通便利地域（靠近公路、铁路、河流等）

7、影响城市内部空间构造的最主要的要素是经济要素，如地租的高低（主要
取决于交通便利程度及距市中心远近）、各种土地利用方式的付租能力等。

8、图中 A表示工业， B表示住处， C表示商业，由市中心向外缘递变最快
的是商业，①—③中适合发展住处区的是②，适合发展工业区的是③，适合发
展商业区的是①。



9、代表性的城市地域构造包括同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

10、城市规划的合理性必定兼顾生态、经济、社会效益。比方：要有便利的
交通条件；协调好相互的地址关系，以减少污染；设置必要的防范带；必要
的卫星城建设等等。

§ 2 不相同样级城市的服务功能

1、城市等级越高，其服务种类越多，服务级别越高，服务范围越大。城市服
务范围平常不固定，没有明显界线。一般城市服务范围包括城市自己、周围

的小城镇以及广大农村地域；省会城市服务范围覆盖周围各县以致全省；北京、上海、广州等城市服务范围则可扩展至全国。

2、城市规模和等级与其地理地址相关，位于资源丰富、交通便利的地域，有利于城市等级的提高。

3、合理布局城市的原则：①高等级城市数量少，低等级城市数量多；②低等级城市散布于高等级城市周围；③高等级城市相互距离较远，低等级城市相互距离较近；④不相同样级城市的服务范围层层嵌套（高等级城市服务范围包括低等级城市服务范围）

§ 3 城市化

1、人口向城镇集聚、城市范围不断扩大、农村变成城镇的过程就是城市化。其水平高低的主要衡量标准包括城市人口比重、城市人口数量、城市用地规模和面积等，其中最重要的标准是城市人口比重的高低。

2、促进城市化发展的原因主要包括：农村（推力）：人口节余（对土地压力大）、自然灾害频频严重、收入低、社会服务短缺；城市（拉力）：就业机会多、社会福利保障程度高、文化设施齐全、交通便利。

3、发达国家城市化起步早，城市化水平高（城市人口比重重要），发展速度慢，已经进入城市化的后期成熟阶段，多出现逆城市化现象，从而出现众多的卫星城。

4、发展中国家城市化起步晚，城市化水平低（城市人口比重小），发展速度快，已经进入城市化的中期阶段，多出现郊区城市化现象，造成城市规模和面积不断扩大。

5、城市化对地理环境的影响是多方面的，即可以改进环境，如平坦土地、修

建水利设施、绿化环境等，也可以破坏环境，产生环境污染问题（大气污染、水体污染、固体荒弃物污染、噪音污染、光污染、电磁辐射污染等）和生态破坏问题（如生物多样性减少），其他还可以产生交通及居住条件差、失业和就业问题突出、社会序次凌乱、内城衰落等现象。

6、人类解决城市化问题（建筑生态城市）的主要对策：

①发展节能建筑和绿色交通，减少环境污染。

②使城市与自然环境保持协调，成立良性循环：比方：

A. 城市化发展要与经济、社会发展相适应，与环境保护相协调

B. 控制大城市规模，分别大城市职能，建设城市新区和建设卫星城

C. 合理规划城市，办理好城市各功能区的关系

D. 提高绿化

E. 其他措施：合理进行交通改造、住所改造、加强社会序次管理、合

理调整产业构造

第三章 农业地域的形成与发展

§ 1 农业的区位选择

1、影响农业的区位条件：

自然要素：地形、天气、土壤、水源

社会经济要素：交通、市场、劳动力、机械（工业基础）、政策、科技、历史原因（生产习惯）

2、农业区位选择的实质是合理利用农业土地。影响农业的区位要素是在不断变化的，自然条件相对坚固，社会经济条件更简单发生变化。

3、主要的农业地域种类：①以种植业为主的农业地域种类：季风水田农业；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996050235144010202>