北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《消化专业试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题:岁小儿腹泻，重度脱水伴重度酸中毒，此患儿需累计损失的液量及首次补充5%的碳酸氢钠的量分别约是（　）。A.600ml，35ml

B.800ml，35ml

C.1000ml，45ml

D.1200ml，55ml

E.1400ml，65ml

2、单项选择题：2：1等张含钠液是指（　）。A.2份5%葡萄糖液，1份1.4%碳酸氢钠溶液

B.2份5%葡萄糖液，1份生理盐水

C.2份生理盐水，1份1.4%碳酸氢钠溶液

D.2份生理盐水，1份5%碳酸氢钠溶液

E.2份1.4%碳酸氢钠溶液，1份生理盐水

3、单项选择题：口服补液盐中加入葡萄糖的主要作用是（　）。A.提供能量

B.预防酮症酸中毒

C.增加小肠对水、钠重吸收

D.使口服补液盐具有一定的渗透压

E.降低血清钾浓度

4、单项选择题：秋冬季婴儿腹泻，呈水样便，自限性常是（　）。A.真菌性肠炎

B.生理性腹泻

C.轮状病毒性肠炎

D.耶尔森菌小肠结肠炎

E.侵袭性大肠杆菌肠炎

5、单项选择题：小儿腹泻伴低血钾时，下列哪一项是不正确的（　）。A.腹泻时由于排钾过多以致缺钾

B.酸中毒时易致低血钾

C.血钾低于3.5mmol／L，临床出现缺钾症状

D.补液后血液被稀释，血钾相对减少

E.补液后钾由尿中排出，引起缺钾

6、单项选择题：列关于低渗性脱水的叙述，错误的是（　）。A.多见于久泻、营养不良儿

B.失钠的比例大于失水，以细胞外液减少为主

C.黏膜干燥，烦渴

D.皮肤弹性极差

E.血压降低，严重时出现休克

7、单项选择题：WHO 推荐使用的口服补液盐的氯化钾的浓度为（　）。A.0.1%

B.0.15%

C.0.2%

D.0.25%

E.0.3%

8、单项选择题：10 个月婴儿，体重 7kg。腹泻 3 天，蛋花汤样大便，每日排便 20 余次，尿少，前囟、眼窝明显凹陷，皮肤弹性极差，脉细弱，四肢冷，血 CO-CP6．75mmol／L。前 8 小时补液错误的是（　）。A.首先用 2：1 等张含钠液 140ml 扩容

B.扩容后选用 3：2：1 液 700ml 静脉滴注

C.补充累积损失量为 100～200ml／kg

D.补液速度为每小时 8～10ml／kg

E.见尿补钾，浓度小 0.2%

9、单项选择题：以下哪项最能确定慢性胃炎诊断（　）。A.上消化道造影

B.幽门螺杆菌感染检测

C.胃镜检查及胃黏膜活检

D.胃脱落细胞检查和胃液分析

E.慢性上腹部疼痛和消化不良症状

10、单项选择题：婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是（　）。A.皮肤弹性差

B.哭无泪，尿量少

C.眼眶及前囟凹陷

D.外周循环衰竭

E.精神萎靡

11、单项选择题：关于小儿腹泻补钾原则，哪项不正确（　）。A.补液有尿后可补钾

B.治疗前 6h 内排过尿，可按有尿处理

C.一般按每日 3～4mmol/kg 给予

D.静脉补钾浓度不能超过 0.5%

E.全日钾量不能少于 8h 给入

12、单项选择题：病毒性肠炎治疗最好选用（　）。A.饮食和支持疗法

B.口服吗啉胍

C.静滴氨苄西林

D.肌注利巴韦林

E.口服庆大霉素

13、单项选择题：性坏死性肠炎的病变主要部位（　）。A.空肠下段和回肠上段

B.横结肠和降结肠

C.全部小肠

D.直肠与乙状结肠

E.食管与小肠

14、单项选择题：婴儿排大便异常的是（　）。A.生后 12 小时排胎便

B.母乳喂养，每日排便 2～4 次

C.母乳喂养，大便性状稀薄

D.牛乳喂养，大便可两天一次

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/997020144016006102