

2022-2023 学年辽宁省铁岭市普通高校对口 单招医学综合自考预测试题(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(60题)

1.受伤达 12h 的严重沾染伤口,应采取()

- A. 清创及一期缝合 B. 清创及延期缝合 C. 清创后不予缝合 D. 清创及植皮 E. 无须清创

2.胸骨左缘第 2 肋间听到 3 级收缩期杂音伴 P2 亢时,应诊断为

()

- A. A. 动脉导管未闭 B. 房间隔缺损 C. 先天性肺动脉瓣狭窄 D. 功能性杂音 E. 见于健康青少年

3. 关于直肠壶腹的正确叙述是()

- A. 直肠位于盆膈以上的部分 B. 直肠盆部下段膨大的部分 C. 直肠下端无腹膜覆盖的部分 D. 以上都对 E. 以上都错

4.心迷走神经末梢释放的递质是 ()

- A. A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 5羟色胺

5.室性心动过速

- A. 窦性心律，心房频率 <60 次 / MIN
- B. 窦性心律，心房频率 >100 次 / MIN
- C. 窦性心律，P—P 间期变化 >0.12 S
- D. 房性心律，心房频率 160 次 / MIN
- E. 室性心律，心室频率 180 次 / MIN

6. 剑突下收缩期搏动提示()

- A. 右心室增大 B. 左心室增大 C. 右心房增大 D. 左心房增大 E. 心包积液

7. 下列哪项不属于浅反射()。

- A. 角膜反射 B. 腹壁反射 C. 桡骨骨膜反射 D. 提睾反射 E. 跖反射

8. 左主支气管的特点是 【 】

- A. 细而长 B. 细而短 C. 粗而短 D. 粗而长 E. 嵴下角小

9. 女性，40 岁。既往有风湿性心脏病史，近一周出现咳嗽、咯痰，双下肢浮肿，不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征 ()

- A. 呼吸过缓
- B. 深大呼吸
- C. 潮式呼吸
- D. 呼吸过速
- E. 叹息样呼吸

10. 正常人在安静、清醒、闭目时，出现的脑电波形是

A. α 波 B. β 波 C. θ 波 D. δ 波 E. γ 波

11. 第一心音减弱可见于（ ）

A. 二尖瓣狭窄 B. 左心室肥大 C. 发热 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 以上都不对

12. 病人叙述的最主要的症状称为

A. 现病史 B. 个人史 C. 既往史 D. 系统回顾 E. 主诉

13. 听到开瓣音常提示（ ）。

A. 二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全
B. 二尖瓣严重狭窄，瓣膜钙化
C. 二尖瓣狭窄分离术的禁忌证
D. 二尖瓣狭窄伴左心衰竭
E. 二尖瓣轻、中度狭窄，瓣膜弹性和活动性较好

14. 外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A. 低渗性脱水 B. 等渗性脱水 C. 高渗性脱水 D. 慢性脱水 E. 继发性脱水

15. 参与肋弓形成的是 【 】

A. 第 6~10 对肋软骨 B. 第 7~10 对肋软骨 C. 第 8~10 对肋软骨 D. 第

9~10 对肋软骨 E. 第 11~12 对肋软骨

16. 一旦确诊为心跳骤停, 必须争取在多长时间內重建呼吸循环()。

A. 4~6 分钟 B. 6~8 分钟 C. 8~10 分钟 D. 10~12 分钟 E. 12~15 分钟

17. 正常成年人的血液总量约相当于体重的

A. 0.05 B. 0.08 C. 0.1 D. 0.12 E. 0.15

18. 在诊治疾病过程中, 下列哪项不属于诊断学的基本内容 ()

A. 询问病史 B. 体格检查 C. 心电图测试 D. 药物治疗 E. 尿常规检测

19. 急性心肌梗塞病人多长时间內不施行择期手术

A. 2 个月內 B. 3 个月內 C. 4 个月內 D. 5 个月內 E. 6 个月內

20. 纯净胃液的 pH 为 ()

A. 0.9~1.5 B. 1.6~2.0 C. 2.5~3.0 D. 3.5~4.0 E. 4.5~5.0

21. 输精管 ()。

A. 起于睾丸下端 B. 全程位于精索內 C. 粗细一致的肌性管道 D. 末端膨大为输精管壶腹 E. 开口于前列腺

22. 阻塞性或肝细胞性黄疸 ()

A. 尿镜检红细胞满视野

B. 尿镜检白细胞满视野

C. 尿外观正常, 镜检可见各种管型

D.尿外观酱油色，隐血试验(+)

E.尿外观深黄色，含大量胆红素

23.前庭蜗器包括 ()

A. 骨半规管、前庭和耳蜗

B. 鼓室、乳突小房和咽鼓管

C. 外耳道、鼓膜、咽鼓管

D. 外耳、中耳和内耳

E. 外耳、鼓室和内耳

24.心内兴奋传导的顺序是

A. 窦房结—房室交界—心房肌—心室肌

B. 窦房结—房室交界—心室肌—浦肯野纤维

C. 窦房结—心房肌—心室肌—浦肯野纤维

D. 窦房结—心房肌—左右束支—浦肯野纤维

E. 窦房结—心房肌—房室交界—房室束和左右束支—浦肯野纤维—心室肌

25.最轻的意识障碍为 【 】

A. 嗜睡 B. 谵妄 C. 浅昏迷 D. 昏 E. 意识模糊

26. 小儿佝偻病常伴有()

A. 尖颅 B. 巨颅 C. 方颅 D. 长颅 E. 小颅

27. 预防休克的关键是

A. 消除病因 B. 保暖、防暑 C. 穿抗休克裤 D. 注意休息 E. 止痛剂早期应用

28. 非溶血性发热反应症状出现后，要立即（ ）

A. 减慢输血速度 B. 给予阿司匹林 C. 给予苯海拉明 D. 给予异丙嗪 E. 给予广谱抗生素

29. 前庭蜗器包括

A. 外耳、中耳和内耳 B. 外耳道、中耳和内耳道 C. 鼓室、乳突小房和咽鼓管 D. 骨迷路和膜迷路 E. 半规管、前庭和耳蜗

30. 癌转移引起淋巴结肿大的以下特征中哪项是错误的 【 】

A. 局部红肿 B. 无压痛 C. 质地坚硬 D. 与周围组织粘连 E. 不活动

31. 在体内，氧气进入组织细胞内的转运方式是 【 】

A. 入胞 B. 单纯扩散 C. 易化扩散 D. 原发性主动转运 E. 继发性主动转运

32. 输尿管结石（ ）。

A. 腹痛伴发热、寒战者 B. 急性腹痛伴休克者 C. 慢性腹痛伴腹泻 D. 急性腹痛同时伴贫血 E. 腹痛伴血尿者

33. 临床用简便方法测定能量代谢率必须取得的数据是 【 】

A. 食物的热价 B. 食物的氧热价 C. 非蛋白呼吸商 D. 一定时间内的耗氧量 E. 一定时间内需要二氧化碳的量

34. 下列出现输血反应后采取的措施中，错误的是（ ）

- A. A. 碱化尿液
- B. 减慢输血速度
- C. 利尿、保护肾功能
- D. 重新做血型及交叉试验
- E. 重新核对供血者、受血者的姓名、性别、血型

35. 烧伤创面适宜包扎疗法的部位是（ ）

- A. 头部 B. 面部 C. 躯干 D. 会阴 E. 肢体

36. 迷走神经背核属于（ ）

- A. 一般躯体运动核 B. 特殊内脏运动核 C. 一般内脏运动核 D. 一般内脏感觉核 E. 特殊躯体感觉核

37. 下列哪一项不属于临界性肿瘤（ ）

- A. 良性肿瘤位于两个脏器交界处 B. 包膜不完整的纤维瘤 C. 生物学行为介于良恶性之间 D. 切除后易复发 E. 唾液腺混合瘤

38. 50 kg体重的正常人的体液与血量分别为（ ）

A. 50 L 与 3.5 L B. 30 L 与 3.5~4 L C. 20 L 与 4 L D. 30 L 与 2.5L E. 20 L 与 2.5 L

39.开口位置高于窦底的鼻旁窦是()

A. 额窦 B. 上颌窦 C. 蝶窦 D. 筛窦前中群 E. 筛窦后群

40.下面哪种血尿应首先考虑上尿路结石()

A. 无痛性血尿 B. 终末血尿 C. 活动性血尿 D. 初期血尿

41.上呼吸道最狭窄的部位是

A. 鼻后孔 B. 喉口 C. 前庭裂 D. 声门裂 E. 声门下腔

42.诊断急性阑尾炎的重要依据是()

A. Murphy 征阳性 B. McBurney 点有显著而固定的压痛和反跳痛 C. 上腹部压痛 D. 脐周压痛 E. 右下腹疼痛

43. 男性，34 岁，晚餐后出现剧烈腹痛，6 小时后来医院就诊。经检查诊断为消化道穿孔、急性腹膜炎。该患者最不可能出现的体征是()

A. 板状腹 B. 肝浊音界缩小 C. 腹部反跳痛阳性 D. 移动性浊音阳性 E. 肠鸣音亢进

44.胃的容受性舒张是通过下列哪种途径实现的()

A. 交感神经 B. 迷走神经末梢释放乙酰胆碱 C. 迷走神经末梢释放的血管活性肠肽 D. 壁内神经释放的生长抑素 E. 肠~胃反射

45.当中心静脉压小于 4cmH₂O 时，可出现的主要表现是()。

- A. 少尿、意识淡漠、血压下降
- B. 头痛、意识障碍、喷射状呕吐
- C. 少尿、浮肿、血压升高
- D. 腹胀、少尿、意识障碍
- E. 尿黄、恶心、意识障碍

46.白细胞分类中，淋巴细胞的百分比为（ ）

- A. A. 10%~30% B. 20%~40% C. 30%~50% D. 10% E. 25%

47. 肝脏扩张性搏动常见于

- A. 正常人 B. 肝炎 C. 肝癌 D. 二尖瓣关闭不全 E. 主动脉瓣关闭不全

48.高渗性缺水患者，输液治疗首选

- A. 生理盐水 B. 5%葡萄糖注射液 C. 10%葡萄糖注射液 D. 5%碳酸氢钠
E. 复方氯化钠溶液

49. 下列便血患者中，能提示结肠癌的是

- A. 伴发热 B. 伴消瘦 C. 伴腹痛 D. 伴黑便 E. 伴腹部肿块

50.月经的发生与下列哪种因素有关（ ）。

- A. 血液中前列腺素的浓度降低

- B. 血液中孕酮和雌二醇水平下降
- C. 血液中孕酮水平升高，雌二醇水平下降
- D. 卵泡刺激素和黄体生成素水平升高
- E. 血中人绒毛膜促性腺激素浓度升高

51. 中性粒细胞核右移可见于()

- A. 巨幼红细胞性贫血 B. 溶血性贫血 C. 缺铁性贫血 D. 失血性贫血 E. 再生障碍性贫血

52. 补充营养的主要途径是 【 】

- A. 胃肠外营养 B. 胃肠内营养 C. 口服 D. 静脉注射 E. 肌注

53. 骨骼肌细胞静息电位水平接近于()

- A. K^+ 的平衡电位 B. Na^+ 的平衡电位 C. Ca^{2+} 的平衡电位 D. Cl^- 的平衡电位 E. Mg^{2+} 的平衡电位

54. 上肢的浅静脉是()

- A. 贵要静脉 B. 尺静脉 C. 桡静脉 D. 大隐静脉 E. 肱静脉

55. 患者浅感觉障碍，可能出现异常的是()

- A. 关节觉 B. 痛温觉 C. 震动觉 D. 位置觉 E. 两点辨别觉

56. 老年人主动脉弹性降低时，血压的变化是()

- A. 收缩压升高，脉压减小
B. 收缩压升高，脉压加大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997116120050006162>