北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科题库考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

Ⅰ　E.滑膜组织肿瘤

3、单项选择题：女性，20 岁，高处坠落伤致双下肢不全瘫而急诊入院。X 线及 CT 证实 T12 椎体爆裂骨折，碎骨片挤入椎管内并压迫脊髓，T12 椎板骨折、轻度移位。下述哪个治疗方案最合理（　）。A.立即脱水、给予神经营养药物，3 周后根据神经恢复情况再考虑是否手术

B.除给予脱水及营养神经药物外，立即行大重量复位牵引

C.行椎板切除并摘除挤入椎管内的碎骨片，脊柱植骨，内固定

D.经椎弓根外固定架复位及固定

E.行椎板前外侧减压，切除挤入椎管内的碎骨片，脊柱植骨、内固定

4、单项选择题：臂丛神经的组成为（　）。A.颈 17 神经

B.颈 4～7 神经

C.颈 5～8 神经

D.颈 4～胸Ⅰ神经

E.颈 5～胸 1 神经

5、单项选择题：有关梨状肌综合征的描述哪项不对（　）。A.下肢内旋加重症状

B.臀部局限性压痛

C.可手术松解梨状肌

D.下肢外旋加重症状

E.可局部封闭治疗

6、单项选择题：与特发性脊柱侧凸的发生有关的病因是（　）。A.椎体发育畸形，阻滞椎或半椎体

B.尚不清，可能与营养缺乏、生长失调、肌力不平衡有关

C.间盘退变及膨出

D.脊柱骨折及脱位畸形愈合

E.神经纤维瘤病

7、单项选择题：有关先天性髋脱位的检查，下列哪项在 3 岁患儿不宜采用（　）。A.弹进弹出试验

B.单足站立试验

C.打气筒样征

D.屈髋屈膝外展试验

E.Galeazzi 征

8、单项选择题：有关体操运动员腕，以下正确的是（　）。A.慢性反复的桡骨远端运动和机械性负担过重引起

B.继发于腕部的解剖变化，随后出现生物力学.变化

C.骺板损害可造成腕部永久性不对称畸形

D.可使骺板增宽、模糊

E.以上都是

9、单项选择题：尤文肉瘤 X 线特征（　）。A.X 线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X 线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X 线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有 Codman 三角

D.X 线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X 线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

10、单项选择题：指骨 X 线片示，骨干中心密度减低区骨皮质膨大，边缘整齐，阴影中心有钙化点。最大可能是（　）。A.骨囊肿

B.内生性软骨瘤

C.成软骨细胞瘤

D.成骨细胞瘤

E.嗜酸性肉芽肿

11、单项选择题：一名前臂骨折患者，经手法复位，小夹板固定 5 小时，感觉剧痛，手指麻木、肿胀、活动不灵，其主要原因是（　）。A.神经损伤

B.神经受压和静脉受压

C.动脉受压和静脉受压

D.静脉受压

E.动脉受压

12、单项选择题：患儿，出生后 3 周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。肿块消失的时间约为出生后（　）。A.2 个月

B.4 个月

C.6 个月

D.5 个月

E.3 个月

13、单项选择题：初诊特发性脊柱侧弯最关键的诊断依据是（　）。A.X 线片见脊柱弯曲，未见椎体异常

B.X 线片上见到椎体破坏

C.X 线片上见椎旁软组织影增厚

D.MRI 见脊髓空洞

E.CT 检查见椎间盘突出

14、单项选择题：化脓性膝关节炎的早期诊断中，最有价值的方法是（　）。A.关节肿胀与压痛

B.浮髌试验阳性

C.X 线摄片检查

D.关节液检查

E.CT 检查

15、单项选择题：9 岁女性患儿，8 天前突发左髋剧痛，左下肢活动受限，伴畏寒，高热，全身不适及食欲不振，急重病容，贫血，体温 38.7℃，脉搏 100 次 / 分，左大腿近端肿胀，皮温升高，但外观无异常，腹股沟韧带中点稍下方深压痛，最可能的诊断是（　）。A.左髋关节急性风湿性关节炎

B.左髋关节急性化脓性关节炎

C.左髋关节结核

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998051122015006063