

2024 河北省灵寿县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整题库加下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 药物不良反应多潘立酮（）

- A: 黑便
- B: 溢乳现象
- C: 睡眠障碍
- D: 性功能障碍

答案：B

2. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 抑制 CYP2C9
- C: 抑制 CYP1A2
- D: 诱导 CYP3A4

答案：A

3. 有关"书写处方药品剂量与数量"的叙述中，最正确的是

- A: 以罗马数字书写药品用量
- B: 不能超过药品说明书中的用量
- C: 按照药品说明书
- D: 以阿拉伯数字书写

答案：D

4. 常用抗消化性溃疡药的合理应用应于早餐前 30 分钟服用的是（）

- A: 替普瑞酮
- B: 吉法酯
- C: 瑞巴派特
- D: 质子泵抑制剂

答案：D

5. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的饮食是

- A: 食醋
- B: 食盐
- C: 脂肪
- D: 酒

答案：A

6. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 链霉素

答案：D

7. 医院获得性肺炎无感染高危因素患者的最常见病原体为

- A: 肺炎链球菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 大肠杆菌

D: 流感嗜血杆菌

答案：A

8. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是()

- A: 可静脉滴注维生素 B₁₂100~500 μg
- B: 恶性贫血者需要终生维持治疗
- C: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
- D: 老年人和酗酒者为高危人群

答案：A

9. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 沙立度胺
- C: 氮芥类
- D: 雌孕激素

答案：B

10. 静脉滴注时间应控制在 2h 以上的药物是

- A: 万古霉素
- B: 培氟沙星
- C: 两性霉素 B
- D: 青霉素

答案：A

11. 荨麻疹患者常出现

- A: 血小板计数增高
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少

D: 中性粒细胞增多

答案：B

12. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 双八面体蒙脱石散

B: 小檗碱

C: 碳酸氢钠

D: 胰酶

答案：D

13. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

A: B 级

B: C 级

C: E 级

D: D 级

答案：A

14. 不宜用热水送服的药物是

A: 双膦酸盐

B: 氨茶碱

C: 去氢胆酸

D: 整肠生

答案：D

15. 用前摇匀，尽量将痰液咳出、口内的食物咽下，含激素类制剂用后以温水漱口

- A: 泡腾片
- B: 阴道栓剂
- C: 膜剂
- D: 气雾剂

答案：D

16. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

- A: 氮芥类
- B: 雄激素
- C: 沙利度胺
- D: 孕激素

答案：A

17. HMG-CoA 还原酶抑制剂

- A: 辛伐他汀
- B: 考来烯胺
- C: 阿昔莫司
- D: 吉非贝齐

答案：A

18. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓后 3h?
- B: 溶栓后 24h?
- C: 溶栓后 12h?
- D: 溶栓后 1h?

答案：B

19. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

- A: 依立雄胺
- B: 普适泰
- C: 氟他胺
- D: 雌三醇

答案：A

20. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

- A: 枸橼酸哌嗪
- B: 阿苯达唑
- C: 甲苯咪唑
- D: 噻嘧啶

答案：D

21. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: 61~90g/L
- B: 31~60g/L
- C: >90g/L
- D: <30g/L

答案：D

22. 适宜餐后服用的是

- A: 阿司匹林
- B: 呋塞米

C: 普伐他汀

D: 格列美脲

答案: A

23. (2016 年真题) 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于 ()。

A: 成本-效用分析

B: 成本-效益分析

C: 成本-效果分析

D: 最小成本分析

答案: B

24. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

A: 沙美特罗

B: 沙丁胺醇

C: 异丙托溴铵

D: 孟鲁司特

答案: D

25. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 输血

B: 维生素 B12 肌肉注射

C: 右旋糖酐铁肌注

D: 硫酸亚铁口服

答案: D

26. 可减弱华法林抗凝作用的食物有

- A: 韭菜
- B: 葡萄柚
- C: 洋葱
- D: 大蒜

答案：A

27. 所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

- A: 地高辛
- B: 卡托普利
- C: 坎地沙坦
- D: 美托洛尔

答案：D

28. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

- A: $<140/90\text{mmHg}$
- B: $<130/80\text{mmHg}$
- C: $<120/80\text{mmHg}$
- D: $<150/80\text{mmHg}$

答案：A

29. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药品是

- A: 阿米卡星
- B: 酮康唑
- C: 氯化钾
- D: 新霉素

答案：B

30. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- B: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药
- C: 采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
- D: 药物治疗高血压时要考虑患者的并发症

答案：B

31. 下列药品中，最容易吸湿的是

- A: 甘油
- B: 维生素 D
- C: 乙醇
- D: 硫酸钠

答案：A

32. 第一类精神药品处方印刷用纸是

- A: 淡橙色
- B: 淡黄色
- C: 淡红色
- D: 淡绿色

答案：C

33. 容易造成溶血，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者禁用的药物是

- A: 罗红霉素
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 亚胺培南
- D: 环丙沙星

答案：B

34. 醛固酮受体拮抗剂

- A: 雷米普利
- B: 阿利吉仑
- C: 依普利酮
- D: 阿米洛利

答案：C

35. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 二巯丁二钠
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 纳洛酮

答案：D

36. 治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

- A: 聚甲酚磺醛栓
- B: 克霉唑栓
- C: 硝酸咪康唑栓
- D: 甲硝唑栓

答案：A

37. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II a 类证据
- B: I a 类证据
- C: I b 类证据
- D: II b 类证据

答案：B

38. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

- A: 恩夫韦替
- B: 扎西他滨
- C: 奈韦拉平
- D: 沙奎那韦

答案: A

39. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 需掌握吸入技术
- B: 偶发呼吸困难可使用短效支气管舒张剂
- C: 单独应用 ICS 减少急性发作频数
- D: 后期发作必要时可使用 PDE-4 抑制剂

答案: C

40. 超常处方

- A: 黄连素用于细菌性腹泻
- B: 无适应证用药
- C: 无正当理由不首选国家基本药物
- D: 二甲双胍用于糖尿病患者

答案: B

41. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

- A: 多黏菌素
- B: 庆大霉素
- C: 甲氨蝶呤
- D: 青霉素

答案：D

42. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.50~0.70
- B: 0.03~0.08
- C: 0.01~0.05
- D: 0.20~0.40

答案：A

43. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

- A: 减量使用
- B: 加量使用
- C: 在危及生命时方可使用
- D: 避免应用

答案：A

44. 关于血清天冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- B: 天冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- C: 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 与丙氨酸氨基转移酶 (GPT) 是同一概念
- D: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT

答案：B

45. 患者,男,72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入,氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 非洛地平
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 缬沙坦

答案：D

46. (2018 年真题) 患者,男,60 岁,因水疱型足癣到药店购药药师应推荐的药品是 ()

- A: 氢化可的松软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 利巴韦林软膏
- D: 10%樟脑软膏

答案：B

47. 已肯定的致畸药物禁止使用,即

- A: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- B: 选用对胎儿危害较小的药物
- C: 用药必须有明确的指征和适应证
- D: 禁止用试验性药

答案：B

48. 当创伤应激严重时,给予肠外营养的热氮比调整为

A: 100kcal:1gN

B: NPC5: 5

C: 150kcal:1gN

D: NPC7:3

答案：A

49. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 醋酸锌

B: 葡萄糖辛含片

C: 布洛芬

D: 阿昔洛韦

答案：C

50. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

A: 青霉素

B: 氯化钾

C: 红霉素

D: 苯妥英钠

答案：C

51. 透析患者宜在两餐中间服用的药物是

A: 维生素 D

B: 铁剂

C: 促红细胞生成素

D: 磷结合剂

答案: B

52. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

A: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？

B: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？

C: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？

D: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？

答案: D

53. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

B: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

C: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案: C

54. 老年患者对低血糖的耐受能力差，不建议使用的降糖药是

A: α -葡萄糖苷酶抑制剂

B: 磺酰脲类促胰岛素分泌剂

C: 胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物

D: 二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂

答案: B

55. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（ ）

- A: 0.01
- B: 0.1
- C: 0.1
- D: 0.009

答案：A

56. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 药物的使用
- B: 药动学相互作用
- C: 药理作用
- D: 药物制剂因素

答案：A

57. 记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

- A: 药历书写技能
- B: 自主学习能力
- C: 沟通技能
- D: 药品警戒技能

答案：A

58. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 色甘酸钠
- B: 维生素 B2

C: 碘苷

D: 磺胺醋酰钠

答案: C

59. 下列药物中, 可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是 ()

A: 口服避孕药

B: 叶酸

C: 阿司匹林

D: 银杏叶片

答案: A

60. 可加重痴呆及认知功能受损的是

A: 氯苯那敏

B: H

C: 地西泮

D: 异丙嗪

答案: B

61. (2021 年真题) 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

A: 万古霉素

B: 头孢哌酮

C: 美罗培南

D: 克拉霉素

答案: D

62. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系), 铁缺乏时铁剂的吸收率可达

A: 20%~60%

B: 10%~20%

C: 15%~20%

D: 20%~40%

答案：A

63. 患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺类药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物增多并有烧灼感。药师应推荐的治疗药物是

A: 硫酸锌滴眼液

B: 磺胺醋酰钠滴眼液

C: 利巴韦林滴眼液

D: 氯霉素滴眼液

答案：A

64. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

B: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

C: 含非甾体抗炎药制剂

D: 含氢溴酸右美沙芬制剂

答案：A

65. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: β 受体阻断剂、钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

B: ACEI/AR

C: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

D: 硝普钠、利尿药、ACEI/AR

答案：A

66. 特布他林平喘的主要机制是

A: 抑制白三烯受体

B: 拮抗 M 胆碱受体

C: 阻断腺苷受体

D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：D

67. (2018 年真题) 患者,男,57 岁,化验结果:TC4.6mmol/L (参考值 <5.2mmol/L),TG11.0mmol/L (参考值 0.56——1.70mmol/L) 尿酸 508 μ mol/L (参考值 <420 μ mol/L),应首选的调脂药物为 ()

A: 依折麦布

B: 考来烯胺

C: 非诺贝特

D: 烟酸

答案：C

68. 转复并维持窦性心律

A: 硝苯地平

B: 多非利特

C: 华法林

D: 血凝酶

答案：B

69. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 单硝酸异山梨酯缓释片
- C: 布地奈德干粉吸入剂
- D: 多潘立酮片

答案：A

70. 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是（ ）

- A: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- C: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- D: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确

答案：C

71. 止咳药

- A: 硝酸甘油
- B: 甘草合剂
- C: 去氨加压素
- D: 胃黏膜保护剂

答案：B

72. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 胰岛素+二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：A

73. 妊娠期妇女甲亢首选

- A: 碘化钾
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 放射性 ^{131}I

答案：B

74. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

- A: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
- B: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- D: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

答案：B

75. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 激素替代剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：D

76. 用于慢性胆囊炎患者改善胆源性消化不良症状的药物是

- A: 脂肪乳
- B: 复方阿嗪米特
- C: 匹维溴铵
- D: 头孢曲松与甲硝唑联用

答案：B

77. 通过抑制磷酸二酯酶，升高 cAMP 水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

- A: 米力农
- B: 地高辛
- C: 洋地黄毒苷
- D: 卡维地洛

答案：A

78. 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

- A: 双歧杆菌
- B: 干酵母
- C: 比沙可啶
- D: 硫酸镁

答案：C

79. 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B

- A: 卡马西平的不良反应
- B: 停用了苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠的不良反应
- D: 糖尿病病情进展

答案：C

80. 患者，男，60 岁，因轻度冻疮（无破溃）到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 10%樟脑软膏
- B: 利巴韦林软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：A

81. 口服后可导致肠道内 pH 下降，并可通过渗透作用增加结肠内容量的药物是

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 比沙可啶

答案：A

82. 应在餐前服用的药物是

- A: 吡罗昔康片
- B: 呋塞米片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 氨茶碱片

答案：C

83. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 白血病

答案：A

84. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿酮体
- D: 尿血红蛋白

答案：D

85. 二巯丙醇用于解救的是()

- A: 有机磷中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 汞中毒

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998052054043007022>