

口腔修复试题及参考答案

1、修复前缺牙间隙的准备工作包括

- A、手术去除残根、骨尖、游离骨片或残余牙片
- B、磨改对颌伸长牙
- C、邻缺隙牙倾斜致邻面倒凹过大者，需磨改以减小倒凹
- D、系带附丽过高影响基托伸展和排牙者应手术矫正
- E、以上都是

答案：E

2、可摘局部义齿上颌后堤区后缘应在

- A、前颤动线以前
- B、软硬腭交界处稍后的软腭上
- C、腭小凹之前
- D、后颤动线以前
- E、前后颤动线以前

答案：B

3、上颌第二前磨牙缺失而缺牙间隙较大，为了增进美观，桥体设计应

- A、将桥体牙颊面和颊嵴向近中移动
- B、将桥体牙颊面和颊嵴向远中移动
- C、使远中面至颊嵴间的宽度与第一前磨牙的相应宽度相等
- D、将基牙固位体适当加大
- E、以上均可

答案：A

4、可摘局部义齿中起连接、稳定与固位作用的部分是

- A、小连接体
- B、基托
- C、大连接体
- D、人工牙
- E、固位体

答案：B

5、制作黏膜支持式义齿制取印模应

- A、下颌印模做主动肌功能修整时应充分抬高舌尖伸出口外
- B、在压力下取模
- C、制作个别托盘

D、采用二次取模法

E、做肌功能修整

答案：E

6、可摘局部义齿的恢复功能部分是

A、固位体

B、基托

C、人工牙

D、连接体

E、以上均非

答案：C

7、引起可摘局部义齿固位不良的原因包括

A、倒凹区基托缓冲不够

B、基托与组织不密合，边缘封闭不好

C、卡环与基牙不贴合

D、人工牙排列位置不当

E、基牙牙冠小

答案：A

8、减少游离端义齿合力的方法中，哪种方法不对

A、选用人工塑料牙

B、减少牙单位

C、减少人工牙的咬合接触

D、减少人工牙的颊舌径

E、减少牙尖斜度

答案：C

9、一位年轻患者，上前牙缺失，下前牙咬于腭黏膜时，哪种设计为好

A、拔除下前牙后，上下前牙义齿修复

B、磨除下前牙切端使之有 2mm 空隙

C、在义齿上前牙区基托附平面导板，择期再行修复

D、在义齿上前牙区加斜面导板

E、在义齿的上磨牙区做牙合垫

答案：C

10、可摘局部义齿铸造金属基托的平均厚度为

A、1.

- B、0.
- C、0.
- D、1.
- E、2.

答案：B

11、可摘局部义齿塑料基托的厚度一般为

- A、0.
- B、3.
- C、2.
- D、2.
- E、1.

答案：D

12、前牙固定桥最好的固位体设计是

- A、金塑冠
- B、金瓷冠
- C、邻切嵌体
- D、3/4M
- E、开面冠

答案：B

13、修复前外科处理有

- A、唇舌系带的矫正术
- B、牙槽嵴修整术
- C、骨性隆突修整术
- D、前庭沟加深术
- E、所有选项均对

答案：E

14、关于复合固定桥的说法中，错误的是

- A、包括4个以上的牙单位
- B、只有2个基牙
- C、由2种或3种基本类型的固定桥组合而成
- D、获得共同就位道比较困难
- E、可有中间基牙

答案：B

15、可能导致全冠粘固后松动、脱落的原因不包括

- A、咬合侧向力过大
- B、预备体轴壁聚合角过大
- C、牙周病
- D、修复体不密合
- E、粘固失败

答案：C

16、对可摘局部义齿基托的要求中，错误的是

- A、在骨突处缓冲
- B、在牙龈缘处缓冲
- C、舌侧与余留牙倒凹区密切接触
- D、在牙龈乳突处缓冲
- E、与牙槽嵴贴合

答案：C

17、理想的嵌体蜡型应达到

- A、与预备的洞形完全密合，没有缺陷
- B、恢复患牙的正确解剖外形，边缘整齐无菲边
- C、建立良好的咬合及邻接关系
- D、表面光滑，残留内应力少
- E、以上均为需达到的要求

答案：E

18、以下哪项不是可摘局部义齿具有的优点

- A、夜间摘除后可以让牙槽嵴得到适当休息
- B、患者可以自行摘戴便于洗刷清洁
- C、磨除牙体组织较少
- D、可以修理、增补
- E、对基牙要求不高，一般要求松动不超过 I。牙槽骨吸收在 1/3 以内

答案：E

19、右上 5 缺失，间隙 4mm, 右上 6 近中牙合面齿龋，根充完善，下颌对牙合牙为局部义齿，修复右上 5 最好的设计是

- A、种植义齿
- B、活动义齿
- C、双端固定桥
- I)、半固定桥

E、单端固定桥

答案：E

20、固定义齿的设计是否合理，其中最重要的是

A、缺失牙数目的多少

B、固位体固位形式与种类选择得当

C、基牙牙周组织健康

D、是否符合机械力学原则

E、基牙的负重不超过其牙周组织的储备

答案：E

21、固定义齿修复的生理基础是

A、基牙牙周潜力

B、基牙牙槽骨结构

C、基牙牙周膜面积

D、基牙牙周储备力

E、以上均是

答案：E

22、影响桥体挠曲变形的最主要因素为

A、桥体厚度

B、桥体材料的机械强度

C、桥体长度

D、桥体宽度

E、合力大小

答案：E

23、间接固位体安放的位置与哪条线有关

A、支点线

B、观测线

C、导线

D、外形高点线

E、以上均有关

答案：A

24、铸造合支托凹制备时，其宽度应为前磨牙合面颊舌径的

A、1/4

B、1/2

C、2/3

D、1/3

E、3/4

答案：B

25、需确定治疗计划后再考虑修复牙体缺损的疾病是

A、牙列畸形

B、牙龈退缩

C、心血管系统疾病

D、牙髓炎、牙周炎

E、心理严重障碍

答案：A

26、制作可摘局部义齿印模选择的托盘时，要求托盘的侧翼与牙弓内外侧应有的间隙是 0

A、1.

B、1~2mm

C、3~4mm

D、2~3mm

E、5mm

答案：C

27、固定义齿修复后引起龈炎，必须拆除后重新制作固定桥，除了

A、接触点不正确

B、固位体边缘不贴合

C、修复体颊舌侧轴面外形恢复不正确

D、黏固剂未去净

E、龈组织受压

答案：D

28、全口义齿的印模属于

A、闭口印模

B、初步印模

C、功能性印模

D、加压印模

E、解剖式印模

答案：C

29、男 42 岁。C 区 6 缺失，C 区 5-7 双端固定桥修复。固定桥试戴时，用力戴入后，C 区 4 出现胀痛，最可能的原因是

- A、就位道不一致
- B、邻接触点过紧
- C、有早接触
- D、微电流刺激
- E、C 区 4 有根尖病变

答案：B

30、可摘局部义齿固位体应具备的条件哪项是错误的

- A、能维护余留牙及牙周组织的健康
- B、对口内组织不造成损伤
- C、不引起矫治性移位
- D、为达到固位目的允许暴露金属
- E、必须提供足够的固位力

答案：D

31、通常后牙铸造金属全冠边缘的最佳选择是

- A、平龈边缘
- B、龈下边缘
- C、达龈沟底
- D、龈下 0.
- E、龈上边缘

答案：E

32、颌间距离是指

- A、息止合位时，上下牙槽嵴顶之间的距离
- B、前伸颌时，上下牙槽嵴顶之间的距离
- C、正中合位时，上下牙槽嵴顶之间的距离
- D、息止颌位时鼻底到频底的距离
- E、正中合位时鼻底到须底的距离

答案：C

33、下列含 B-半水硫酸钙的石膏是

- A、普通熟石膏
- B、生石膏
- C、无水石膏
- D、超硬石膏
- E、硬石膏

答案：A

34、能良好行使功能的固位体应该

- A、有良好的固位形和抗力形
- B、各固位体之间应有共同的就位道
- C、材料性能好，边缘密合度高，外形美观，符合解剖形态和生理功能
- D、能保护牙体组织和牙体活力
- E、所有选项条件均应具备

答案：E

35、当牙冠缺损大，固位力差，残留牙体容易破碎时，修复体应

- A、适当增加人造冠合面面积，增加机械便利
- B、适当减少人造冠合面面积，减少机械便利
- C、适当减少人造冠合面面积，增加机械便利
- D、适当增加人造冠合面面积，减少机械便利
- E、按原牙牙冠大小制作

答案：C

36、采用固定义齿修复的主要根据是

- A、牙槽嵴吸收程度
- B、患者的美观性
- C、患者的舒适度
- D、牙周的储备力
- E、基牙的咬合力

答案：D

37、卡臂尖位于基牙倒凹区，可以

- A、防止义齿牙合向脱位
- B、防止义齿龈向脱位
- C、防止义齿前向脱位
- D、防止义齿后向脱位
- E、防止义齿侧向脱位

答案：A

38、不属于部分冠的是

- A、半冠
- B、核冠
- C、前牙 3/4 冠
- D、开面冠

E、后牙 3/4 冠

答案：B

39、影响冠修复体黏着力大小的因素不包括

- A、黏固剂过稀影响黏着力
- B、黏着力与黏着面积成正比
- C、黏固过程影响黏着力
- D、黏着力与黏固剂量的厚度成正比
- E、黏着面上有水分影响黏着力

答案：D

40、全冠牙体预备牙合面磨除的目的是

- A、为了容易就位
- B、为了更好地恢复牙体的解剖外形
- C、为全冠制作提供牙合面的金属空间
- D、为制作方便
- E、以上都不对

答案：C

41、男性，20 岁，左侧上颌侧切牙为锥形牙，与邻牙之间有约 1mm 间隙，适宜的修复方法不包括

- A、树脂贴面
- B、3/4 冠
- C、金属烤瓷冠
- D、瓷贴面
- E、全瓷冠

答案：B

42、为了增加全冠的固位力，下列哪种方法是错误的

- A、采用高性能的黏接剂
- B、增大修复体与预备体的接触面积
- C、备牙时增加预备体表面的粗糙度
- D、设计箱状、针道等辅助固位形
- E、增加修复体与预备体的密合度

答案：C

43、后堤区的作用

- A、缓冲作用

B、排列后牙的标志

C、基托后缘定位

D、支持

E、边缘封闭

答案：E

44、如全冠试戴时出现翘动，可能的原因，除了

A、预备体轴壁聚合度大

B、石膏代型磨损

C、邻接过紧

D、未完全就位

E、全冠组织面有金属瘤

答案：A

45、牙体缺损修复时，增加修复体抗力的措施

A、保证修复体适当的体积和厚度

B、合理控制修复体的外形

C、选择理化性能优良的修复材料

D、保证修复体制作质量

E、以上都对

答案：E

46、以下哪种情况不会影响面部外形的对称性

A、偏侧咀嚼

B、单个牙牙体缺损

C、牙列缺失

D、牙列缺损

E、后牙早失

答案：B

47、人造冠黏固剂最大被膜厚度一般不超过

A、30 μm

B、20 μm

C、10 μm

D、40 μm

E、50 μm

答案：A

48、前腭杆与上前牙龈缘关系为

- A、与龈缘接触
- B、距龈缘 2~4mm
- C、距龈缘 4~6mm
- D、距龈缘 6~8mm
- E、距龈缘 8mm 以上

答案：C

49、可摘局部义齿中没有传导力作用的部件是

- A、大、小连接体
- B、卡环体
- C、人工牙
- D、卡臂尖
- E、基托

答案：C

50、洞固位形轴壁可向洞口敞开

- A、 $1^{\circ}\sim 20^{\circ}$
- B、 $2^{\circ}\sim 7^{\circ}$
- C、 $2^{\circ}\sim 6^{\circ}$
- D、 $2^{\circ}\sim 5^{\circ}$
- E、 $3^{\circ}\sim 6^{\circ}$

答案：D

51、烤瓷熔附金属全冠边缘为烤瓷者牙体颈缘应预备成

- A、羽状
- B、凹槽状
- C、直角斜面形
- D、 135° 凹面或直角
- E、以上颈缘预备形均可

答案：D

52、以下对金属烤瓷全冠牙体预备要求叙述正确的是

- A、前牙切端至少预备 2.0mm 间隙
- B、肩台宽度一般为 1.
- C、各轴面角无倒凹，各线角圆钝
- D、各轴面预备出金属厚度 0.
- E、所有选项都对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998071114047006052>