

2024 河南省上街区《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题完整题库（全国通用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 托拉塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

2. （2017 年真题）治疗青光眼宜选用（ ）

- A: 托吡卡胺滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 碘苷滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：D

3. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

A: 有可能引起维生素 D 缺乏症状

- B: 询问过敏史，使用期间密切关注过敏反应
- C: 如需连续给药 1 周以上，应进行肝功能检查
- D: 需关注中枢神经系统不良反应

答案：A

4. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- B: 具有肝脏毒性
- C: 属繁殖期杀菌剂
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

答案：C

5. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 四环素类
- B: 氧化镁
- C: 阿莫西林
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

6. 关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

- A: 可抑制外周组织的 T
- B: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高
- C: 作用较甲巯咪唑弱
- D: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌

答案：C

7. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 庆大霉素

- B: 异烟肼
- C: 新霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

8. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 四环素可的松
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：A

9. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体拮抗剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: β_2 受体激动剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：D

10. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 山莨菪碱
- C: 胶体果胶铋
- D: 多潘立酮

答案：A

11. 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

- A: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- B: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- C: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- D: NSAIDS 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

答案：B

12. 属于甲状腺激素类药的是

- A: 左甲状腺素
- B: 醋酸去氨加压素
- C: 生长抑素
- D: 甲巯咪唑

答案：A

13. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

- A: 氨力农
- B: 多巴酚丁胺
- C: 硝普钠
- D: 地高辛

答案：C

14. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- B: 抑制碘泵
- C: 抑制 $\text{Na}^{+}-\text{K}^{+}$ 泵
- D: 抑制甲状腺素的生物合成

答案：D

15. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 抗病毒
- B: 抗休克
- C: 免疫抑制
- D: 抗炎

答案：A

16. 预防急性肾衰竭可选用

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：A

17. 林可霉素可以作为首选药的是

- A: 金葡菌致骨髓炎
- B: 皮肤感染
- C: 呼吸道感染
- D: 胆道感染

答案：A

18. 肾毒性大的是

- A: 阿莫西林
- B: 庆大霉素
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢哌酮

答案：B

19.（2016 年真题）属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 艾塞那肽
- D: 那格列奈

答案：A

20. 属于短效口服避孕药的是

- A: 壬苯醇醚
- B: 氯地孕酮
- C: 米非司酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：D

21.（2020 年真题）消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案：C

22. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 丙酸睾酮
- C: 坎利酮

D: 伐地那非

答案: A

23. 润滑性泻药()

A: 乳果糖

B: 甘油

C: 地芬诺酯

D: 硫酸镁

答案: B

24. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ()

A: 纳洛酮

B: 氟马西尼

C: 苯甲酸钠咖啡因

D: 阿托品

答案: D

25. (2017 年真题) 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是 ()

A: 抑制 5-羟色胺再摄取

B: 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

C: 抑制神经末梢突触前膜的 α_2 受体

D: 抑制单胺氧化酶

答案: A

26. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

A: 喷托维林

B: 福尔可定

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: C

27. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: S 期

B: G

C: G

D: M 期

答案: A

28. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

A: 胍屈嗪

B: 利血平

C: 硝苯地平

D: 氢氯噻嗪

答案: C

29. (2015 年真题) 治疗侵袭性曲霉菌病首选 ()。

A: 伏立康唑

B: 氟康唑

C: 氟胞嘧啶

D: 灰黄霉素

答案: A

30. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

A: 庆大霉素

B: 呋喃妥因

C: 甲硝唑

D: 苜星青霉素

答案: C

31. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

A: 卡托普利

B: 沙库巴曲缬沙坦

C: 美托洛尔

D: 伊伐布雷定

答案: B

32. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 戊四醇酯

B: 硝酸异山梨酯

C: 单硝酸异山梨酯

D: 硝酸甘油

答案: D

33. 以上药物镇咳作用最弱的是

A: 喷托维林

B: 右美沙芬

C: 可待因

D: 吗啡

答案: A

34. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

A: 3% 过氧化氢溶液

B: 2%过氧化氢溶液

C: 2%酚甘油滴耳液

D: 3%酚甘油滴耳液

答案：C

35. 西咪替丁的禁忌证是

A: 卓-艾综合征

B: 急性胰腺炎

C: 应激性溃疡

D: 胃食管反流病

答案：B

36. 氨基糖苷类抗菌药无效的是()

A: 厌氧菌和肠球菌

B: 铜绿假单胞菌

C: 结核杆菌

D: 需氧革兰阴性菌

答案：A

37. 其他 β -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs

B: 二氢叶酸合成酶

C: 细菌核蛋白体 50S 亚基

D: DNA 螺旋酶

答案：A

38. 蒙脱石散是

A: 抗分泌药

- B: 抗动力药
- C: 微生物制剂
- D: 吸附剂

答案：D

39. 不能用于隐球菌感染的抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 伊曲康唑
- C: 氟康唑
- D: 伏立康唑

答案：A

40. 口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎可选用

- A: 曲伏前列素
- B: 9%硼酸冰片滴耳液
- C: 1%碘甘油
- D: 四环素

答案：C

41. 不良反应为刺激性干咳的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 依那普利
- D: 哌唑嗪

答案：C

42. 因改变肠道内寄生菌群的生长，使迟缓真杆菌的转化作用受到抑制，导致地高辛的生物利用度和血药浓度增加的是

- A: 硫酸镁
- B: 呋塞米
- C: 胺碘酮
- D: 克拉霉素

答案：D

43. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

- A: 氟他胺
- B: 他莫昔芬
- C: 托瑞米芬
- D: 乙烯雌酚

答案：A

44. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

- A: 15 分钟以上
- B: 30 分钟以上
- C: 5 分钟以上
- D: 60 分钟以上

答案：A

45. 下述药物中，不能用于促进铁剂吸收的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 E
- C: 半胱氨酸
- D: 食物中的果糖

答案：B

46. 应用强心苷或停用后 7 日内禁用

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 氯化钠
- D: 枸橼酸钾

答案：B

47. 腺病毒可致

- A: 角膜炎
- B: 流行性结膜炎
- C: 急性出血性结膜炎
- D: 巨细胞病毒性视网膜炎

答案：B

48. 判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

- A: 2~3 日
- B: 8~10 日
- C: 12~15 日
- D: 5~7 日

答案：D

49. 下列药物中，能促进食物消化的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 胶体果胶铋
- C: 乳酶生
- D: 兰索拉唑

答案：C

50. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

- A: 度他雄胺
- B: 坦洛新
- C: 他达拉非
- D: 西地那非

答案：B

51. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 只对室上性心动过速有效
- B: 特异性针对房颤有效
- C: 只对室性心动过速有效
- D: 对室上性和室性心动过速都有效

答案：D

52. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 整合素受体阻断剂
- B: 环氧酶抑制剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂

答案：D

53. 可能引起中性粒细胞减少的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 碘及碘化物
- C: 鲨肝醇
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

54. （2020 年真题）餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 米索前列醇
- B: 兰索拉唑
- C: 铝碳酸镁
- D: 枸橼酸铋钾

答案：C

55. 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：C

56. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

- A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- D: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

答案：D

57. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 他莫昔芬
- B: 长春碱
- C: 羟基树碱
- D: 紫杉醇

答案：B

58. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

- A: 骨骼肌血管
- B: 冠状血管
- C: 肾血管
- D: 皮肤黏膜血管

答案：D

59. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 直接对抗血小板聚集
- B: 环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用
- C: 激活抗凝血酶
- D: 降低凝血酶活性

答案：B

60. 癫痫小发作选用

- A: 苯巴比妥
- B: 丙戊酸钠
- C: 乙琥胺
- D: 苯妥英钠

答案：C

61. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 西地那非
- B: 丙酸睾酮
- C: 他达拉非
- D: 甲睾酮

答案：A

62. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

- A: 体内、体外均有强大的抗凝作用
- B: 仅在体外有效
- C: 用药 2 个月后需检测血小板计数
- D: 仅在体内有效

答案：A

63. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿昔莫司
- D: 非诺贝特

答案：B

64. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 不良反应较多
- B: 疗效不确切
- C: 需冷藏保存，携带不便
- D: 不适合成年人服用

答案：C

65. 血钾升高至

- A: 大于 $7 \mu\text{mol/L}$
- B: 大于 $265 \mu\text{mol/L}$
- C: 大于 $172 \mu\text{mol/L}$
- D: 大于 6mmol/L

答案：D

66. 下列不属于胃肠解痉药的是

A: 山莨菪碱

B: 阿托品

C: 颠茄

D: 多潘立酮

答案：D

67. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

A: 拮抗 M 胆碱受体

B: 阻断腺苷受体

C: 抑制白三烯受体

D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：A

68. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

A: 甲氧氯普胺

B: 西沙必利

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案：B

69. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

A: 制霉菌素

B: 两性霉素 B

C: 奥司他韦

D: 膦甲酸钠

答案: C

70. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

A: 阿苯达唑

B: 噻嘧啶

C: 吡喹酮

D: 甲硝唑

答案: C

71. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

A: 红霉素眼膏

B: 阿托品滴眼剂

C: 左氧氟沙星滴眼剂

D: 氯霉素眼膏

答案: C

72. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要的是

A: 赖氨酸

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: A

73. 对 β -内酰胺酶有抑制作用，属于青霉烷砜类结构的药物是()

A: 他唑巴坦

B: 克拉维酸

C: 美罗培南

D: 氨曲南

答案: A

74. 属于刺激性泻药的是()

A: 多库酯钠

B: 欧车前

C: 利那洛肽

D: 番泻叶

答案: D

75. 属于III类抗心律失常药

A: 普萘洛尔

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 奎尼丁

答案: C

76. 可减少神经元囊泡释放乙酰胆碱，使平滑肌或横纹肌暂时麻痹，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 西地那非

B: 睾酮

C: A型肉毒毒素

D: 奥昔布宁

答案: C

77. 促进微管的装配，抑制其解聚

A: 羟喜树碱

- B: 紫杉醇
- C: 他莫昔芬
- D: 长春碱

答案：B

78. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

- A: 氨苯蝶啶
- B: 阿米洛利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：C

79. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A: 应激性大出血
- B: 血小板减少症
- C: 骨质疏松性骨折
- D: 动脉粥样硬化

答案：C

80. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是（）。

- A: 苯巴比妥
- B: 地西泮
- C: 佐匹克隆
- D: 唑吡坦

答案：A

81. 有关奎尼丁药理作用的叙述，正确的是

- A: 可使正常窦房结自律性降低明显
- B: 可缩短动作电位时程
- C: 直接作用于心肌，中度抑制 Na^+ 内流
- D: 竞争性拮抗 N 受体，有抗胆碱作用

答案：C

82. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度
- B: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- C: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性
- D: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案：B

83. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁
- B: 驱钩虫
- C: 输血+注射右旋糖酐铁
- D: 驱钩虫+口服铁剂

答案：D

84. (2017 年真题) 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是 ()

- A: 硝普钠
- B: 氨氯地平
- C: 卡托普利
- D: 阿利克仑(阿利吉仑)

答案：A

85. 对抗香豆素类过量引起出血可选用

- A: 维生素
- B: 鱼精蛋白
- C: 垂体后叶素
- D: 维生素 K

答案：D

86. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 维生素 C
- B: 氯丙嗪
- C: 红霉素
- D: 他莫昔芬

答案：D

87. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

- A: 局部外用治疗浅表真菌感染
- B: 口服吸收很少
- C: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性
- D: 作用机制与两性霉素 B 相似

答案：C

88. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

- A: 15mg
- B: 10mg
- C: 5mg
- D: 20~40mg

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998112004042007022>