

手足外科出科理论考试

一、单选题

1.手部创口处理原则是越早清创疗效越好，一般应争取在伤后几小时内缝合（ ）[单选题]。

A.4-6h✓

B.10-12h

C.14-16h

D.18-20h

E.24h

2.青霉素过敏性休克的抢救药物首选（ ）[单选题]。

A、0.01%去甲肾上腺素

B、0.1%去甲肾上腺素✓

C、0.01%盐酸肾上腺素

D、0.1%盐酸肾上腺素

E、0.001%肾上腺素

3.关于开放性骨折患者的急救处理错误的是（ ）[单选题]。

A.夹板固定患肢

B.包扎伤口

C.有较大血管出血者可用止血带，并注明时间

D.应用止血带者每30秒放松一次✓

E.观察血压、脉搏

4.合谷穴属于哪条经络（ ）[单选题]。

- A.足阳明胃经
- B.手太阳小肠经
- C.足太阳膀胱经
- D.足太阴脾经
- E.手阳明大肠经✓

5.休克体位（ ）[单选题]。

- A.抬高头胸部 10-20 度，抬高下肢 20-30 度✓
- B.抬高头胸部 20-30 度，抬高下肢 10-20 度
- C.抬高头胸部 30-40 度，抬高下肢 10-20 度
- D.抬高头胸部 15-20 度，抬高下肢 30-40 度

6.维持人体相对恒定的体温，属于气的哪项功能（ ）[单选题]。

- A.推动
- B.温煦✓
- C.凉润
- D.防御
- E.中介

7.严重出血用止血带止血的患者，应多长时间放松一次（ ）[单选题]。

- A.15-30min
- B.30min
- C.30-60min✓
- D.60min

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

E.90min

8.最严重的石膏综合征是（ ）[单选题]。

A.呼吸困难

B.剧烈疼痛

C.急性胃扩张✓

D.寒战

E.末梢血运差

9.配置好的青霉素皮试液浓度为（ ）U/ml（ ）[单选题]。

A.20U

B.50U

C.20-50U

D.200-500U✓

10.皮下注射部位（ ）[单选题]。

A.后背

B.大腿外侧

C.上臂三角肌下缘

D.腹壁

E.大腿前侧

F.以上都对✓

11.《素问.阴阳应象大论》中指出怒容易伤（ ）[单选题]。

A.肝✓

B.脾

C.心

D.肺

12.小腿骨筋膜室综合征的最有效处理是（ ）[单选题]。

A.抬高患肢、制动

B.抗生素防治感染

C.继续输液，脱水治疗

D.血管解痉药物治疗

E.切开深筋膜减压✓

13.鼻胃管插入的深度一般为（ ）[单选题]。

A.30-40cm

B.35-40cm

C.45-55cm✓

D.40-50cm

14.离断肢（指）体的保存哪项是对的:（ ）[单选题]。

A.浸泡在生理盐水中

B.浸泡在消毒液中

C.浸泡在清水中

D.放在 4 度的冰冻层内

E.用 8 层无菌干纱布包裹，然后放入无漏孔的塑料袋内，扎紧袋口，使袋口朝上放入冰筒或放入装有冰块的器皿内✓

15.处理骨折患者首先应掌握的原则（ ）[单选题]。

A.抢救生命

B.妥善处理伤口，并简单有效固定✓

C.迅速安全转移患者

D.输液并输血

E.立即将骨折端嵌入进行复位

16.断指再植时限一般以伤后（ ）h 为限（ ）[单选题]。

A.3-4h

B.4-5h

C.5-6h

D.6-8h✓

17.夹板的松紧度以两手指提起绷带后能在夹板上下移动（ ）为标准，绷带移动度超过（ ）说明过松。

（ ）[单选题]。

A1cm2cm✓

B2cm3cm

C3cm4cm

D4cm5cm

18.由父母遗传的生命物质，称之为（ ）[单选题]。

A.先天之精✓

B.后天之精

C.肾精

D.水谷之精

E.生殖之精

19.人体之气的运动称作（ ）[单选题]。

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

A.气机✓

B.气化

C.升降出入

D.气机调畅

E.阴阳转化

20.脾的生理特性是（ ）[单选题]。

A.喜和降

B.喜清肃

C.喜燥恶湿✓

D.喜润恶燥

21. “水谷之海” 指（ ）[单选题]。

A 脾

B 胃✓

C 胆

D 肾

22.四肢肌肉的壮实主要取决于（ ）（ ）[单选题]。

A.心主血脉的功能

B.肾主骨的功能

C.脾主运化的功能✓

D.肺主气的功能

23.人体中最根本、最重要的气是（ ）[单选题]。

A.元气✓

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

B.宗气

C.营气

D.卫气

E.脏腑之气

24.预防下肢深静脉血栓抬高患肢高于心脏（ ）cm（ ）[单选题]。

A.30-40cm

B.20-30cm✓

C.30-50cm

D.15-20cm

25.手足外科手术野皮肤准备原则:（ ）[单选题]。

A.超过手术部位一个关节

B.超过手术部位两个关节✓

C.超过手术部位 10cm

D.超过手术部位 15cm

E.超过手术部位 1-2 个关节

26.手足外伤术后观察哪项是对的:（ ）[单选题]。

A.注意观察生命体征包括体温、脉搏、呼吸、血压等观察及血容量的判断，术

B.色泽变化反映了皮下血循环的状态，是最易观察到的客观指标，正常为红润，如转苍白，为静脉缺血的表现。

C.肤色如转暗红继而暗紫是动脉血流受阻的表现。

D.在全身置于同一温度下，再植或移植物的温度较健侧降低 3°以上，说明血供障碍。✓

E.指腹张力高提示出现动脉危象。

27.观察伤者病情之缓急、轻重，最主要重视: () [单选题]。

A、望肢体功能活动

B、望神色✓

C、望畸形

D、望创口

E、望形态

28.骨筋膜室综合征“5P”表现，哪项不符合 () [单选题]。

A、青紫✓

B、苍白

C、感觉异常

D、无脉

E.麻痹

F.疼痛

29.肱骨干骨折后，出现“垂腕”，说明损伤了 () [单选题]。

A.正中神经

B.尺神经

C.肌皮神经

D.腋神经

E.桡神经✓

30.骨折反复多次复位造成最严重的并发症有 () [单选题]。

A.继发性血肿

B.皮肤坏死

C.继发血管神经损伤

D.骨折移位

E.骨不连接✓

31、骨折急救处理时妥善固定的目的，哪项是错误的:（ ）[单选题]。

A.使移位的骨折得到适当的矫正

B.避免骨折端在搬运过程中加重软组织损伤

C.可以止痛，利于防止休克

D.便于运输

E.减少骨折端出血✓

32、对严重开放性骨折清创时，下列哪项是不正确的做法（ ）[单选题]。

A.伤后 6~8 小时清创可一期愈合

B.伤后 8~24 小时之间的创口仍可作清创术

C.彻底切除无活力的组织

D.彻底去掉碎骨块✓

E.植皮或皮瓣旋转闭合创面

33、对于桡骨小头脱位正确的处理是（ ）[单选题]。

A.手法复位不必固定✓

B.手法复位固定

C.切开复位不必固定

D.切开复位固定

E.不必处理

34、肘关节骨折脱位可能并发（ ）[单选题]。

A.动、静脉损伤

B.缺血性肌挛缩

C.损伤性骨化✓

D.缺损性骨坏死

E.周围神经

35、肱骨干中段骨折较常见的合并症是（ ）[单选题]。

A.桡神经损伤✓

B.肱动脉损伤

C.肱静脉损伤

D.肌皮神经损伤

E.正中神经损伤

36、手足显微外科术后病室湿度要求（ ）[单选题]。

A、 20-30%

B、 30-40%

C、 40-50%

D、 50-60%

E、 60-70%✓

37、63 岁女性患者，平地跌倒时左手掌撑地，当即感左腕疼痛、肿胀、于活动受限，侧面观像“餐叉”，最可能的诊断是（ ）[单选题]。

A.腕关节脱位

B.腕舟骨骨折

C.伸直型桡骨下段骨折

君子忧道不忧贫。——孔丘

D.Smith' s 骨折

E.Colle' s 骨折✓

38、骨折的专有体征是（ ）[单选题]。

A.畸形✓

B.疼痛与压痛

C.局部肿胀

D.功能障碍

E.血运不良

39、锁骨骨折可发生的合并损伤，是（ ）[单选题]。

A、颈 2，3 神经根

B、胸锁乳突肌

C、副神经损伤

D、膈神经损伤

E、臂丛神经损伤✓

40、锁骨骨折常用的治疗方法，是（ ）[单选题]。

A、切开复位，内固定

B、手法复位，横 8 字绷带固定✓

C、牵引治疗

D、手法复位，夹板固定

E、手法复位，石膏外固定

41、Colles 骨折远段的典型移位，是（ ）[单选题]。

A、远侧端向尺侧移位

- B、近侧端向背侧移位
- C、远侧端向背侧移位✓
- D、近侧端向尺侧移位
- E、远侧端向桡侧移位

42、踝关节的功能位是: () [单选题]。

- A 背屈 90°✓
- B 背屈 20°-30°
- C 跖屈 90°
- D 跖屈 20°-30°
- E 足底平面不向任何方向偏斜

43、骨折早期，肢体的功能锻炼形式是: () [单选题]。

- A 患肢肌肉舒缩运动✓
- B 患肢关节主动活动
- C 患肢关节被动活动
- D 患肢关节屈伸活动
- E 患肢负重活动

44、肱骨骨折好发于肱骨的哪个部位: () [单选题]。

- A.外科颈✓
- B.解剖颈
- C.上段
- D.中段

45、手足显微外科术后进行血运观察多少时间 1 次 () [单选题]。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

A、15-30min

B、30min-1h✓

C、1-2h

D、2-3h

E、3-4h

46、肱骨外科颈骨折是中老年常见的骨折，在临床上骨折愈合后常遗留肩关节的活动功能障碍，导致这种情况的原因一般不包括（ ）[单选题]。

A．骨折仅达到了功能复位而未达到解剖复位✓

B．受伤后局部出血，血肿与肩关节周围软组织发生粘连

C．骨折移位可能引起了结节间沟完整性与平滑度的改变

D．骨折固定时间较长

E．功能锻炼未跟上

47、患者在医院再植成功后，术后护理哪项不妥（ ）[单选题]。

A、住单人房间，严格消毒

B、室温 28-30 度✓

C、应用抗菌素抬高手术侧上肢

D、术后注意尿量

48、断肢再植灯烤的度数（ ）[单选题]。

A、25 瓦灯泡

B、40-60 瓦灯泡✓

C、100 瓦灯泡

D、120 瓦灯泡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998117117112007023>