

危重孕产妇救治应知应会

一、选择题

1、下列哪一项不属于《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》的目标（ ）[单选题]*

A、普及健康知识，提高妇女健康素养水平

B、降低孕产妇中重度贫血患病率✓

C、妇女心理健康素养水平不断提升

D、适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上，乳腺癌人群筛查率逐步提高

2、《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》提出妇女心理健康目标:不断提升妇女心理健康素养水平。

减缓妇女（ ）（ ）患病率上升趋势。[单选题]*

A、焦虑障碍、抑郁症✓

B、妄想症、强迫症

C、躁狂症、抑郁症

D、恐惧症、躁狂症

3、在心理健康和精神卫生服务体系建设中，要重点关注哪些时期妇女的心理健康。（ ）[单选题]*

A、青春期、孕产期、更年期和老年期✓

B、青春期、育龄期、更年期和老年期

C、青春期、育龄期、孕产期和老年期

D、青春期、育龄期、孕产期和更年期

4、关于死胎的描述，下面正确的是（ ）[单选题]*

A、死胎可与孕妇疾病相关✓

B、死胎与胎盘羊水异常无关

C、胎儿在娩出后即刻死亡，称死产

D、死胎均因胎儿畸形引起

5、妊娠合并病毒性肝炎的产科处理，哪项是错误的（ ）[单选题]*

A、重症肝炎控制 24 小时以剖宫产为宜

B、分娩前应准备好新鲜血

C、宫口开全后产钳助娩

D、对 HBsAg 阳性母亲的新生儿，即使经过主动和被动免疫后，都不建议母乳喂养✓

6、不属于早产原因的是（ ）[单选题]*

A、胎膜早破

B、孕妇患慢性肾炎

C、胎儿脑积水✓

D、双子宫的一侧妊娠

7、不属于治疗先兆早产的药物是下列哪项（ ）[单选题]*

A、硫酸镁

B、前列腺素合成酶抑制剂

C、苯甲酸雌二醇✓

D、硝苯地平

8、妊娠期急性脂肪肝的诊断要点是（ ）[单选题]*

A、多发生在妊娠中期

B、常伴有消化道症状，但无胆酶分离现象

C、肝脏超声提示低回声

D、高血氨、低血糖✓

9、糖尿病合并妊娠的诊断依据，正确的是（ ）[单选题]*

A、空腹血糖 ≥ 7.5 mmol/L

B、随机血糖 ≥ 11.0 mmol/L

C、75gOGTT 服糖后 2 小时血糖 ≥ 11.1 mmol/L✓

D、糖化血红蛋白 $\geq 7.0\%$

10、妊娠期糖尿病筛查时间是在多少周（ ）[单选题]*

A、18-22 周

B、20-24 周

C、23-25 周

D、24-28 周✓

11、妊娠期糖尿病患者控制血糖的方法不包括哪项（ ）[单选题]*

A、饮食运动治疗

B、磺脲类药物治疗✓

C、血糖的监测

D、胰岛素治疗

12、在诊断异位妊娠中，最重要的检查方法是（ ）[单选题]*

A、后穹窿穿刺✓

B、HCG

C、彩超

D、腹腔镜检查

13、妊娠早期合并甲减首选的替代药物是（ ）[单选题]*

A、L-T4✓

B、甲状腺素片

C、PTU

D、MMI

14、妊娠合并甲亢严重者易发生 () [单选题]*

A、死胎死产

B、甲亢危象

C、甲亢性心脏病

D、以上均正确✓

15、已婚女性，停经 54 天，阴道中等量出血 2 天，伴有阵发性下腹痛，妇科检查:子宫稍增大，宫口容 1 指，宫口内可见胎囊，应如何处理 () [单选题]*

A、肌注黄体酮 20mg

B、检测 HCG

C、立即输血输液

D、立即行吸宫术✓

16、下列关于自然流产的描述正确的是 () [单选题]*

A、自然流产的主要原因是胎儿畸形

B、凡妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止者，称为流产✓

C、发生于妊娠 10 周以前者称为早期流产

D、发生在妊娠 10 周至不足 20 周者称为晚期流产

17、育龄女性，自然流产 2 次，本次停经 4 月，阴道流血 1 月余，为保胎一直拒绝妇科检查，患者治疗前应首先检查 () [单选题]*

- A、血常规
- B、超声✓
- C、血 HCG
- D、心电图

18、国家卫生健康委印发《母婴安全行动提升计划（2021-2025 年）》中提出：到 2025 年，全国孕产妇死亡率下降到（ ）。[单选题]*

- A、13、5/10 万
- B、14、5/10 万✓
- C、15、5/10 万
- D、16、5/10 万

19、国家卫生健康委印发《母婴安全行动提升计划（2021-2025 年）》中提出：紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间（ ）努力控制在（ ）以内并逐步缩短。[多选题]*

- A、20 分钟
- B、30 分钟✓
- C、40 分钟
- D、50 分钟

20、妊娠风险评估中对患有疾病可能危及生命不宜继续妊娠的孕妇，由（ ）任职资格的医师对病情进行评估和确诊，提出科学严谨的医学建议。[单选题]*

- A、执业医师及以上
- B、主治医师及以上
- C、副主任医师及以上✓
- D、主任医师及以上

21、对妊娠风险分级为“橙色”“红色”和“紫色”的孕产妇，医疗保健机构应当将其作为重点人群纳入高危孕产妇专案管理，合理调配资源，保证专人专案、全程管理、动态监管、集中救治，确保做到（ ）[单选题]*

- A、发现一例、报告一例、管理一例、救治一例
- B、发现一例、登记一例、报告一例、救治一例
- C、发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例✓
- D、发现一例、登记一例、报告一例、管理一例

22、抢救新生儿窒息时最为重要的是（ ）[单选题]*

- A 保暖
- B、触觉刺激
- C、清理呼吸道✓
- D、用呼吸兴奋剂

23、在孕妇腹壁上听诊，与母体心率先一致的音响是（ ）[单选题]*

- A、胎心音
- B、子宫杂音✓
- C、脐带杂音
- D、胎动音

24、下列哪项不是先兆子宫破裂的诊断依据（ ）[单选题]*

- A、先露部下降受阻，产程延长
- B、血尿
- C、病理性缩复环
- D、血红蛋白下降✓

25、孕妇，33岁，停经35周，发现血压升高伴尿蛋白3天，入院查体血压140/90mmHg，下肢水肿(+)，心肺(-)，宫高32cm，头位，头浅入盆，胎心率146次/分，急查尿蛋白(+++)，下列治疗方案应除外() [单选题]*

- A、急查肝肾功能
- B、胎心监护
- C、首选解痉治疗
- D、立即终止妊娠✓

26、抢救新生儿窒息的程序应是() [单选题]*

- A、清理呼吸道、建立呼吸、建立正常循环、用药✓
- B、建立呼吸、清理呼吸道、建立正常循环、用药
- C、清理呼吸道、用药、建立呼吸、建立正常循环
- D、清理呼吸道、建立正常循环、建立呼吸、用药
- E、用药、清理呼吸道、建立呼吸、建立正常循环

27、正常足月新生儿的出生体重应在____之间。 [单选题]*

- A、2400-3500g
- B、2400-3500g
- C、2500-4000g✓
- D、2400-3000g

28、臀位阴道分娩,胎儿脐部娩出后应结束分娩的时间是()。 [单选题]*

- A、10分钟内
- B、9分钟内
- C、8分钟内✓

D、7 分钟内

29、《新生儿疾病筛查管理办法》规定的新生儿疾病筛查病种不包括 () [单选题]*

A、先天性甲状腺功能减低症

B、新生儿眼病筛查✓

C、听力障碍

D、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病

30、下述哪种情况可使用缩宫素 () [单选题]*

A、宫颈水肿

B、头盆不称

C、不协调性宫缩乏力

D、协调性宫缩乏力✓

31、胎盘娩出后的处理方式，正确的是 () [单选题]*

A、产妇观察 1 小时无异常可进入分娩室

B、发现胎盘胎膜是否完整均应立即清宫

C、阴道出血超过 300ml，缩宫素可经下腹部直接注入宫体肌壁

D、检查胎盘胎膜是否完整✓

32、正常胎位分娩机制的概念正确的是 () [单选题]*

A、仰伸:胎头颈部紧贴胸部

B、下降:呈持续性，且贯穿分娩全过程

C、俯屈:以耻骨弓为支点，胎儿额顶鼻口颈相继娩出

D、衔接:胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平✓

33、骨盆入口平面最小的径线是 () [单选题]*

- A、右斜径
- B、左斜径
- C、坐骨棘间径
- D、真结合径✓

34、枕前位的分娩机制正确的是 () [单选题]*

- A、下降动作呈连续性
- B、胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态
- C、下降动作贯穿在整个分娩过程中✓
- D、俯屈动作完成后，胎头以枕额径通过产道

35、下列有促进乳汁分泌作用的是 () [单选题]*

- A、吸吮动作✓
- B、前列腺素
- C、孕激素制剂
- D、溴隐亭

36、枕左前位胎头进入骨盆入口时衔接的径线是 () [单选题]*

- A、双颞径
- B、双顶径
- C、枕额径✓
- D、枕颈径

37、关于临产后子宫颈的变化，下列说法正确的是 () [单选题]*

- A、子宫颈管展平过程是先呈漏斗状，逐渐变短，直至展平✓
- B、初产妇多是子宫颈管展平与子宫颈管扩张同时进行

C、破膜后胎先露直接压迫子宫颈，影响子宫颈口扩张

D、形成前羊水囊时，子宫颈口不易扩张

38、枕先露胎头到达盆底俯屈后，适应产道继续下降的径线是（ ）[单选题]*

A、枕额径

B、双顶径

C、双颞径

D、枕下前凶径✓

39、初产妇潜伏期延长时限为（ ）[单选题]*

A、8 小时

C、10 小时

B、16 小时

D、20 小时✓

40、正常分娩的临床表现正确的是（ ）[单选题]*

A、第三产程多超过 30 分钟

B、经产妇临产后胎头多已入盆

C、产妇屏气用力标志宫口开全

D、胎膜破裂多在宫口开全时✓

41、下列有关产褥期消化系统变化，正确的说法是（ ）[单选题]*

A、胃酸减少，胃肠道平滑肌收缩力下降✓

B、产后胃肠道张力和蠕动力 1 周内能恢复正常

C、产后孕酮及胃动素水平下降

D、产后数日内，产妇一般食欲好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/99813000021006036>