

2021-2022 年浙江省嘉兴市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.病毒性心肌炎的表现是

- A.寒战，高热，呼吸困难，偶见心律失常
- B.剧烈胸痛，发热，心电图出现 Q 波，ST 段弓背向上抬高
- C.症状、体征无典型表现，主要依据血沉增快帮助诊断
- D.最先有低热，倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常
- E.发热，P-R 间期延长，血清抗"O"滴度增高(1：400)

2.隐性黄疸时，血清总胆红素含量为

- A.1.71 ~ 3.42 $\mu\text{mol/L}$
- B.5.13 ~ 6.84 $\mu\text{mol/L}$
- C.8.55 ~ 15.4 $\mu\text{mol/L}$
- D.17.1 ~ 34.2 $\mu\text{mol/L}$
- E.73.4 $\mu\text{mol/L}$

3.根据上述血气分析结果，本例应属于下列哪项酸碱平衡失调

A.A.呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒+呼吸性碱中毒

C.呼吸性酸中毒代偿

D.呼吸性酸中毒失代偿

E.代谢性碱中毒

4.女性患者，34岁，风湿性心瓣膜病伴心房颤动，长期服地高辛每天0.25mg，近一周出现恶心、呕吐、腹泻，胃口欠佳。两天前出现头晕、心悸、黄视等，曾出现短暂意识不清。查体：平卧位，神清，表情淡漠，心率40次/分，律整，心尖区可闻隆隆样舒张期杂音，双肺检查未发现异常。无双下肢水肿。患者求诊的原因是

A.血容量不足 B.急性胃肠炎 C.洋地黄中毒 D.急性肝炎 E.短暂性脑供血不足

5.流感嗜血杆菌抗菌治疗首选

A.苯唑西林 B.去甲万古霉素 C.第二、三代头孢菌素 D.亚胺培南 E.氟康唑

6.男性，60岁。2小时前与人争吵后突发头痛，吐咖啡色液体。查体：BP 190/120mmHg，深昏迷，双侧瞳孔小，四肢瘫、颈有阻力。四肢有阵发性强直出现，诊断为高血压性脑出血。出血部位可能为

A.A.内囊 B.额叶 C.小脑 D.脑室 E.枕叶

7.以下哪项不是急性一氧化碳中毒的临床表现

A.昏迷 B.口唇黏膜呈樱桃红色 C.抽搐 D.呼吸困难 E.贫血

8.再生障碍性贫血的发病机制中，下列哪项是错误的

A.发病机制未完全明了 B.干细胞存在内在缺陷 C.造血微环境存在缺陷 D.遗传性疾病 E.干细胞损伤

9.与类风湿关节炎比较，风湿性关节炎

A.多累及四肢大关节 B.多无晨僵 C.抗链球菌溶血素“O”升高 D.无关节畸形 E.以上都对

10.对食管癌高发区普查能早期诊断的主要方法是

A.食管拉网做食管脱落细胞检查 B.食管镜 C.食管 X 线吞钡检查 D.食管下段 pH 测定 E.食管测压检查

11.蛛网膜下腔出血的脑脊液改变为

A.脑脊液呈均匀一致血性

B.脑脊液呈洗肉水样血性

C.脑脊液呈清亮

D.脑脊液浑浊

E.脑脊液黄色，离体不久自动凝固

12.属于抗原虫药的是()。

A.抗阿米巴及滴虫药 B.抗线虫病药 C.抗血吸虫病药 D.抗血绦虫病药

13.下列与类风湿关节炎活动无关的是

A.晨僵 B.类风湿结节 C.关节畸形 D.C反应蛋白增高 E.血沉增快

14.慢性肺心病急性加重期治疗措施中最重要的是

A.抗菌药物 B.解痉平喘药 C.化痰药 D.利尿剂 E.呼吸中枢兴奋剂

15.胃溃疡的腹痛规律

A.无明显规律性 B.疼痛-排便-加重 C.疼痛-进食-缓解 D.疼痛-便意-缓解 E.进食-疼痛-缓解

16.敌百虫中毒患者洗胃禁用哪种洗胃液

A.2%碳酸氢钠 B.1:5000 高锰酸钾 C.鸡蛋清 D.温热水 E.生理盐水

17.关于色素痣的描述，下列哪项是错误的

A.由含黑色素颗粒的痣细胞组成
B.由含黑色素的多少可呈黑色、褐色和黄色
C.可分为皮内痣和交界痣
D.可恶变形成皮肤癌
E.怀疑有恶变应及时切除并行病理检查

18.鼻出血现场简易止血方法错误的是

- A.可嘱患者用手指紧捏紧两侧鼻翼 10 ~ 15 分钟
- B.指压期间用冷水袋或湿毛巾敷前额及后颈
- C.松指后如仍出血，可用浸以 1% 麻黄碱生理盐水的棉片塞入鼻腔止血
- D.指压期间用热水袋或热毛巾敷前额及后颈
- E.松指后如仍出血可用浸以 0.1% 肾上腺素的棉片塞入鼻腔止血

19.假如在距肛门 7cm 处触及活动肿块，应选择

- A.活组织检查 B.钡灌肠 C.纤维结肠镜检 D.CT 检查 E.MRI 检查

20.氨基甲酸酯类杀虫剂中毒可做哪项相关检查

- A.血液碳氧血红蛋白测定 B.全血胆碱酯酶活力测定 C.血乙醇浓度 D.血铅测定 E.以上都不对

21.巨幼细胞贫血的消化系统表现不包括

- A.腹痛 B.腹胀 C.腹泻 D.舌痛 E.食欲不振

22.男，78 岁。1 天前突然失语伴右上肢活动无力进行性加重，但意识清楚，脑脊液检查无异常。最可能的诊断是

- A.短暂性脑缺血发作 B.脑血栓形成 C.脑栓塞 D.脑出血 E.蛛网膜下腔出血

23.关于 COPD 的全身表现下列哪项不常见

- A.可导致机体低氧血症
- B.可导致患者营养不良、消瘦、肌肉萎缩
- C.可导致患者冠心病
- D.可导致患者焦虑
- E.可导致患者Ⅱ型呼吸衰竭

24.就诊患者的肝炎二对半检测结果：HB- sAg(-)、HBeAg(-)、抗-HBe(+)、抗-HBc (+)、抗-HBs(+), 应考虑该患者是

- A.急性乙型肝炎
- B.HBV 既往感染
- C.慢性活动性乙型肝炎
- D.慢性乙型肝炎
- E.急性乙型肝炎恢复期

25.降糖灵(苯乙双胍)

- A.不经肝脏代谢
- B.慢性失血性贫血 95%的代谢产物在胆汁中排出
- C.易出现乳酸酸中毒
- D.作用时间超过 24 小时
- E.有调节凝血机制的作用

26.关于淋巴瘤，错误的是

- A.起源于淋巴结或淋巴组织的恶性肿瘤
- B.病因和发病机制不完全清楚
- C.在我国非霍奇金淋巴瘤发病率明显高于霍奇金淋巴瘤
- D.与霍奇金淋巴瘤比较，非霍奇金淋巴瘤预后差
- E.淋巴瘤不能治愈

27.脑出血急性期血压在什么范围内应使用降压治疗

- A.收缩压 ≥ 140 mmHg，或舒张压 ≥ 90 mmHg
- B.收缩压 ≥ 160 mmHg，或舒张压 ≥ 95 mmHg
- C.收缩压 ≥ 180 mmHg，或舒张压 ≥ 105 mmHg
- D.收缩压 ≥ 200 mmHg，或舒张压 ≥ 110 mmHg
- E.收缩压 ≥ 220 mmHg，或舒张压 ≥ 120 mmHg

28.与胃癌发生无关的因素是

- A.幽门螺杆菌感染
- B.慢性胃炎
- C.常食腌制烟熏食品
- D.明显家族聚集倾向
- E.慢性萎缩性胃炎

29.风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄最主要的特征是

- A.心脏显著向左下扩大
- B.主动脉瓣区喷射性杂音伴第二心音减弱或消失

C.胸骨左缘第 3、4 肋间有舒张期高调递减型杂音

D.周围血管征

E.Austin-Flint 杂音

30.除下列哪项外都是右心衰竭与肝硬化共同具有的体征

A.下肢水肿 B.尿少 C.腹腔积液 D.肝脏肿大 E.颈静脉怒张

二、专业知识(10 题)

31.该病例心脏超声检查何项表现对诊断最有意义

A.二尖瓣面积增大，闭合不佳 B.二尖瓣腱索断裂 C.二尖瓣反流 D.二尖瓣瓣膜有赘生物 E.M 型超声见 CD 段呈吊床样改变

32.关于高钾血症的处理错误的是

A.10%葡萄糖酸钙缓慢静推

B.5%NaHCO₃ 静点

C.11·2%乳酸钠静推

D.500 葡萄糖+正规胰岛素

E.透析疗法并不是最有效的方法

33.不应采用的治疗方案是

A.抗感染治疗 B.抗结核治疗 C.止痛药 D.手术治疗 E.对症止血

34. 溃疡性结肠炎腹痛特点是

A. 周期性 B. 长期性 C. 持续性灼痛 D. 节律性 E. 疼痛便意 ~ 便后缓解

35. 检查后为甲状腺功能亢进症(Graves 病), 长期抗甲状腺药物治疗最可能的预后

A. 多数治愈, 少数复发 B. 治愈及复发机会相等 C. 最终成为甲低 D. 病情反复发作 E. 完全治愈

36. 三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(75~76 题共用备选答案)

肺结核胸 x 线片示

- A. 偏心空洞, 内有洞壁结节
- B. 双肺网状影伴蜂窝状
- C. 双上肺尖钙斑伴密度不均斑片影
- D. 双肺弥漫大小不等团块影
- E. 肺动脉段凸出, 右下肺动脉增宽

37. 在临床上, 腰椎间盘突出主要原因是

A. 急性腰部扭伤 B. 椎间盘退性变+积累性损伤 C. 遗传因素 D. 妊娠 E.

椎间隙发育异常

38.急性膀胱炎

- A.尿蛋白、低蛋白血症、高脂血症及水肿
- B.无痛性血尿
- C.血尿伴尿急、尿频、尿痛
- D.尿蛋白、血尿、管型尿伴水肿高血压
- E.腰痛向大腿内侧或会阴部放射

39.女性，56岁，慢性咳嗽、咳痰3年，每年冬季发作，多持续3~4个月，近1周再次出现咳嗽、咳痰，为白黏痰，无发热、呼吸困难来诊。查血WBC $7.0 \times 10^9 / L$ ，分叶68%，淋巴30%，嗜酸1%，单核1%，尿常规正常，胸片示双肺纹理增多、紊乱。查肺功能:FVC正常，FEV1 / FVC正常，FEV1正常，DLC0正常。最恰当的诊断是

- A.慢性阻塞性肺疾病(COPD)
- B.肺结核
- C.支气管哮喘
- D.支气管扩张
- E.慢性支气管炎

40.哮喘患者禁用

- A.吡罗昔康
- B.对乙酰氨基酚
- C.布洛芬
- D.消炎痛
- E.萘普生

三、共用题干单选题(5题)

41.最可能的诊断是

A.感染中毒性休克 B.急性机械性肠梗阻 C.急性中毒，心肌损害 D.中毒性巨结肠 E.急性肺栓塞

42.(题干)患者，男，左手拇、示、中指掌侧外伤3天，

发热，血 WBC $9.6 \times 10^9/L$ ，中性 0.78。体检：左拇、示、中指创面有脓性分泌物，拇指呈外展状，

不能对掌，示指呈半屈状，活动受限，中指可被动活动，掌心有轻度凹陷，手背及大鱼际和拇指指蹼明显肿胀，并有压痛。其最主要的诊断是

A.左拇、示、中指化脓性腱鞘炎 B.左桡侧化脓性滑囊炎 C.左鱼际间隙感染 D.左掌中间隙感染 E.左掌中间隙、鱼际间隙均感染

43.(题干)男性，15岁，学生。突然出现畏寒、高热，体温高达 $40^{\circ}C$ ，头晕、头痛、全身酸痛、乏力伴有腹痛、腹泻，同班同学也有相似症

状。血常规检查示 **WBC $3.0 \times 10^9/L$ ，N 70%，L 30%。**

最可能的诊断是

A.肺脓肿 B.急性上呼吸道感染 C.普通感冒 D.流行性感冒 E.支气管炎

44.(题干)患者,女性,70岁。陈旧性广泛前壁心肌梗死7年,活动后胸闷、心悸、气短2年,近1周出现夜间阵发性呼吸困难。体检:端坐呼吸, BP 170/88mmHg, P130次/

分。心脏各瓣膜区未闻及杂音。双肺底可闻及细湿啰音，双肺散在哮鸣音。腹平软，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。空腹血糖

4.9mmol/L。心电图:V1~V6 导联 ST 段压低 0.1mV。血清肌钙蛋白 I

正常。该患者血压控制目标至少是

- A.160/90mmHg B.150/90mmHg C.140/90mmHg D.130/90mmHg
E.130/80mmHg

45.对明确诊断是最有价值的检查是

- A.TT, TT, TSH B.FT, FT, TSH C.TT,TT,T D.TGA,TR-Ab E.TT, TT, FT, TSH

参考答案

1.D 轻者可无症状，或仅有心悸、胸闷、乏力、纳差等症状，大多心率增快而与体温升高不相称，也有少数心动过缓;重者可有心力衰竭、心律失常、心源性休克甚至猝死。

2.D 黄疸是指血中胆红素浓度增高，导致巩膜、黏膜、皮肤及体液发生黄染的现象。血清胆红素浓度为 $17.1 \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$ 时，肉眼看不出黄疸，称隐性黄疸。

3.D

患者有低氧血症、高碳酸血症，pH 值下降，提示有呼吸性酸中毒，失代偿。

4.C

5.C 甲氧西林金黄色葡萄球菌(MSSA)抗菌治疗首选苯唑西林或氯唑西

林单用或联合利福平、庆大霉素；不动杆菌性肺炎抗菌治疗首选亚胺培南，或氟喹诺酮类联合阿米卡星或头孢他啶、头孢哌酮/

舒巴坦钠；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌抗菌治疗首选（去甲）万古霉素
单用或联合利福平或奈替米星；真菌性肺炎抗菌治疗首选氟康唑；流感
嗜血杆菌抗菌治疗首选第二、三代头孢菌素。

6.D 脑室出血为脑实质内出血破入脑室内，称继发性脑室出血，原发性
脑室出血少见。症状严重，头痛、呕吐、深昏迷，四肢弛缓性瘫痪，脑
膜刺激征阳性，可出现阵发性强直痉挛或去大脑僵直状态。生命体征不
稳定。多在 24 小时内死亡。

7.E 急性一氧化碳中毒的临床表现有昏迷、口唇黏膜呈樱桃红色、抽搐、
呼吸困难，但无贫血表现。

8.D 遗传因素可能是再生障碍性贫血的发病机制之一，但再生障碍性贫
血并不是遗传性疾病。

9.E 风湿性关节炎多发生于年轻人，发病前 1~2 周发热、咽痛，此后出
现膝、肘、肩、髌等大关节游走性肿痛。多无晨僵，不遗留关节畸形。
部分患者有心肌炎及心瓣膜病变。抗链球菌溶血素“O”升高，RF 阴性，
X 线检查无关节骨质侵蚀。

10.A 食管拉网做食管黏膜脱落细胞检查主要用于食管癌高发区现场普
查。

11.A 神经系统常见疾病的脑脊液改变特点，在掌握其描述后应当能反过
来根据脑脊液改变来鉴别不同的疾病，该题主要考查脑出血、蛛网膜下
腔出血和细菌性脑膜炎脑脊液改变的鉴别。从课本及教师的授课可以正
确选出答案。

12.A

13.C 关节畸形多见于较晚期患者，与类风湿关节炎的活动无关，而其余各项均与类风漫关节炎的活动相关。

14.A 在慢性肺心病急性加重期，积极控制感染，畅通呼吸道，控制呼吸和心力衰竭，以改善肺、心功能是治疗的关键。其中，积极控制感染是最重要的环节之一。

15.E

胃溃疡疼痛常在餐后 1 小时内发生，经 1~2 小时后逐渐缓解，在下次餐前自行消失，下次进餐后再复出现上述节律，呈“进食-疼痛-缓解”特点。

16.A

17.C 色素痣可分为皮内痣、交界痣和混合痣。

18.D 鼻出血现场，可嘱患者用手指捏紧两侧鼻翼以止血，如松指后仍出血，可用麻黄碱或肾上腺素的棉片塞入鼻腔止血，因麻黄素和肾上腺素会收缩血管，从而止血。同时，可用冷水敷前颈及后颈，不应用热水毛巾，因冷的毛巾可收缩血管，从而止血。

19.A

A。触及活动肿块应选择活组织检查以确诊。

20.B

21.A 腹痛不是巨幼细胞贫血的消化系统表现，其余各项均可出现。

22.B 脑血栓的临床表现和诊断要点：①50 岁以上多见；②有 TIA 病史或高血压、糖尿病等危险因素；③发病急骤，但还可缓慢加重；④常于安静状态或休息时出现偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、失语或其他脑局灶

损害症状；⑤大多无明显头痛和呕吐；⑥一般无意识障碍；⑦

脑脊液检查基本正常。

23.C

24.E

E。乙肝五项中三个抗体阳性提示处于乙肝病毒感染恢复期，传染性小。

25.A

中枢神经系统白血病的主要表现有头痛、呕吐、颈项强直等脑膜炎或中枢神经系统症状，脑脊液可检出白血病细胞。

26.E 淋巴瘤起源于淋巴结或淋巴组织，其发生大多与免疫应答过程中淋巴细胞增殖分化产生的某种免疫细胞恶变有关，是免疫系统的恶性肿瘤。在我国非霍奇金淋巴瘤发病率明显高于霍奇金淋巴瘤。淋巴瘤的病因扣发病机制不完全清楚，可能与病毒感染、细菌感囊（如幽门螺杆菌）、免疫功能缺陷等有关。淋巴瘤的预后较其他肿瘤要好，尤其是霍奇金淋巴瘤，不少患者可获治愈。与霍奇金淋巴瘤比较，非霍奇金淋巴瘤预后差，但部分患者也可获治愈。因此，正确答案是 E。

27.C 脑出血后血压升高是对颅内压增高情况下为保持相对稳定的脑血流量的脑血管自动调节反应，通常可不用降压药。收缩压 180 ~ 230mmHg，或舒张压 105 ~ 140mmHg，宜口服降压药治疗，使血压维持在略高于发病前水平；收缩压 180mmHg 以内，或舒张压 105mmHg 以内，可观察而不用降压药。

28.B 一般慢性胃炎与胃癌发生是无关的。

29.B

主动脉瓣狭窄听诊特征性体征为胸骨右缘第 2 肋间收缩期喷射性杂音，粗糙而响亮，主动脉瓣区第二心音减弱，第二心音反常分裂。

30.E 右心衰竭可表现为颈静脉怒张，肝硬化则无此表现。全科医学(中级)模拟试卷及解析

31.D 瓣膜关闭不全较狭窄易发生赘生物和感染性心内膜炎，超声下发现二尖瓣膜赘生物是协助诊断的有力证据。

32.E 高钾血症是急性肾功能衰竭少尿期的重要致死原因，须马上采取紧急措施处理。具体包括：①在心电图监护下，予 10% 葡萄糖酸钙 10 ~ 20ml 静脉缓慢推注；② 5% NaHCO₃ 100 ~ 200ml 静脉滴注；③ 50% 葡萄糖 50ml + 正规胰岛素 10U；④ 11.2% 乳酸钠 40 ~ 200ml 静脉注射；⑤ 透析疗法是治疗高钾血症最有效的方法，适用于以上措施无效和伴有高分解代谢的急性肾衰竭患者，后者尤以血液透析治疗为宜。

33.B

34.E 溃疡性结肠炎腹痛多为左下腹或下腹的阵痛，亦可涉及全腹，有疼痛—便意—便后缓解的规律，常有里急后重。

35.A 抗甲状腺药物的作用是抑制甲状腺合成甲状腺激素，多数治愈，但也有一部分病例复发。

36.C

37.B

38.C

39.E 综合各项症状、体征、实验室检查，诊断为慢性支气管炎。慢性阻塞性肺疾病肺功能检查应有异常。

40.C

41.D

溃疡型结肠炎可由于钡剂灌肠、低钾或应用抗胆碱能药物或麻醉剂而诱发中毒性巨结肠，也可能自发发生。

42.C

43.D

该患者无明显局部呼吸道症状，全身中毒症状明显且具有传染性，符合流行性感冒的特点，故选 D。

44.C

有效的治疗必须使血压降至正常范围，即降到 140/90mmHg 以下。

45.B 2021-2022 年浙江省嘉兴市全科医学 (中级) 专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.病毒性心肌炎的临床表现是

- A.寒战，高热，呼吸困难，偶见心律失常
- B.剧烈胸痛，发热，心电图出现 Q 波，ST 段弓背向上抬高
- C.症状、体征无典型表现，主要依据血沉增快帮助诊断
- D.最先有低热，倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常
- E.发热，P-R 间期延长，血清抗"O"滴度增高(1：400)

2.隐性黄疸时，血清总胆红素含量为

- A.1.71 ~ 3.42 μ mol/L

B.5.13 ~ 6.84 μ mol/L

C.8.55 ~ 15.4 μ mol/L

D.17.1 ~ 34.2 μ mol/L

E.73.4 μ mol/L

3.根据上述血气分析结果，本例应属于下列哪项酸碱平衡失调

A.A.呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒+呼吸性碱中毒

C.呼吸性酸中毒代偿

D.呼吸性酸中毒失代偿

E.代谢性碱中毒

4.女性患者，34岁，风湿性心瓣膜病伴心房颤动，长期服地高辛每天0.25mg，近一周出现恶心、呕吐、腹泻，胃口欠佳。两天前出现头晕、心悸、黄视等，曾出现短暂意识不清。查体：平卧位，神清，表情淡漠，心率40次/分，律整，心尖区可闻隆隆样舒张期杂音，双肺检查未发现异常。无双下肢水肿。患者求诊的原因是

A.血容量不足 B.急性胃肠炎 C.洋地黄中毒 D.急性肝炎 E.短暂性脑供血不足

5.流感嗜血杆菌抗菌治疗首选

A. 苯唑西林 B. 去甲万古霉素 C. 第二、三代头孢菌素 D. 亚胺培南 E.

氟康唑

6.男性，60岁。2小时前与人争吵后突发头痛，吐咖啡色液体。查体：BP 190/120mmHg，深昏迷，双侧瞳孔小，四肢瘫、颈有阻力。四肢有阵发性强直出现，诊断为高血压性脑出血。出血部位可能为

A.内囊 B.额叶 C.小脑 D.脑室 E.枕叶

7.以下哪项不是急性一氧化碳中毒的临床表现

A.昏迷 B.口唇黏膜呈樱桃红色 C.抽搐 D.呼吸困难 E.贫血

8.再生障碍性贫血的发病机制中，下列哪项是错误的

A.发病机制未完全明了 B.干细胞存在内在缺陷 C.造血微环境存在缺陷 D.遗传性疾病 E.干细胞损伤

9.与类风湿关节炎比较，风湿性关节炎

A.多累及四肢大关节 B.多无晨僵 C.抗链球菌溶血素“O”升高 D.无关节畸形 E.以上都对

10.对食管癌高发区普查能早期诊断的主要方法是

A.食管拉网做食管脱落细胞检查 B.食管镜 C.食管X线吞钡检查 D.食管下段pH测定 E.食管测压检查

11.蛛网膜下腔出血的脑脊液改变为

- A.脑脊液呈均匀一致血性
- B.脑脊液呈洗肉水样血性
- C.脑脊液呈清亮
- D.脑脊液浑浊
- E.脑脊液黄色，离体不久自动凝固

12.属于抗原虫药的是()。

- A.抗阿米巴及滴虫药
- B.抗线虫病药
- C.抗血吸虫病药
- D.抗血绦虫病药

13.下列与类风湿关节炎活动无关的是

- A.晨僵
- B.类风湿结节
- C.关节畸形
- D.C 反应蛋白增高
- E.血沉增快

14.慢性肺心病急性加重期治疗措施中最重要的是

- A.抗菌药物
- B.解痉平喘药
- C.化痰药
- D.利尿剂
- E.呼吸中枢兴奋剂

15.胃溃疡的腹痛规律

- A.A.无明显规律性
- B.疼痛-排便-加重
- C.疼痛-进食-缓解
- D.疼痛-便意-缓解
- E.进食-疼痛-缓解

16.敌百虫中毒患者洗胃禁用哪种洗胃液

- A.2%碳酸氢钠
- B.1:5000 高锰酸钾
- C.鸡蛋清
- D.温热水
- E.生理盐水

17.关于色素痣的描述，下列哪项是错误的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998141101136006067>